Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL
CURSO DE MESTRADO**

**ESTRESSE TÉRMICO E DESENVOLVIMENTO SEXUAL DE
MACHOS BOVINOS SENEPOL**

Bruna Ferrari

CAMPO GRANDE, MS

2019

Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL
CURSO DE MESTRADO

ESTRESSE TÉRMICO E DESENVOLVIMENTO SEXUAL DE
MACHOS BOVINOS SENEPOL

Bruna Ferrari

Orientadora: Profª Drª Eliane Vianna da Costa e Silva

Dissertação apresentada à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como requisito à obtenção do título de Mestre em Ciência Animal.

Área de concentração: Produção Animal.

CAMPO GRANDE, MS

2019

Certificado de aprovação

Bruna Ferrari

Estresse térmico e desenvolvimento sexual de machos bovinos Senepol

Thermal stress and sexual development of bovine males Senepol

Dissertação apresentada à
Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul, como requisito à obtenção do
título de Mestra em Ciência Animal.

Aprovado(a) em: 29-03-2019

BANCA EXAMINADORA:

Dra. Eliane Vianna da Costa e Silva
Orientadora (UFMS)

Dr. Nivaldo Karvate Junior
(UFG)

Dra. Andrea Alves Egito
(EMBRAPA)

*À Deus, meu melhor amigo.
À minha vó Hedy Bender (in memoriam), que
um dia eu possa me tornar metade da mulher
que a senhora via em mim.*

Dedico!

AGRADECIMENTOS

A Deus, por não ter me desamparado nenhum dia sequer dessa jornada.

À Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em especial aos docentes e funcionários do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal.

À Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES) pela concessão da bolsa.

À FUNDECT, pela concessão de recursos financeiros via PRONEM através do projeto 082/2015.

Ao Grupo GERA-MS, do qual me orgulho em fazer parte.

À Fazenda San Francisco, Miranda/ MS, por disponibilizar as instalações e os animais experimentais.

À Profa. Dra. Eliane Vianna da Costa e Silva, por ter sido uma verdadeira “mãe científica”, obrigada pela orientação, apoio científico e amizade.

À minha família, em especial meus pais Stella Maris Rossetto e Dalvo Ferrari, minha irmã Camila Ferrari de Sá e minhas sobrinhas Emanuella Ferrari de Sá e Beatriz Ferrari de Sá, vocês são meu sustento e razão de cada esforço.

Ao Rodrigo Franco, em resumo: nem me lembro quem eu era antes de você. Obrigada por cada segundo ao meu lado, de amor, amizade e companheirismo e por ter me dado uma segunda família para amar.

À Amora, minha filhota de quatro patas, que pinta meus dias com amor e alegria, independente de quão cinza eles estejam.

Às minhas amigas, Ariadne Mastelaro, Brenda Farias, Thaís Andrade e Thais Rios, o fardo é mais leve quando compartilhado com vocês.

À Maryene Borges, pela amizade improvável e imprescindível durante o mestrado, e pelo auxílio nas coletas de dados.

Ao Matheus Vicente, pelo auxílio e parceria na coleta de dados.

Aos meus colegas e amigos da Embrapa Gado de Corte, Camilla, Caroline e Nivaldo Junior, que mesmo longe, estão sempre presentes me auxiliando e me apoiando.

“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar, o que ninguém ainda pensou, sobre aquilo que todo mundo vê.”

Arthur Schopenhauer

BRUNA FERRARI. Estresse térmico e desenvolvimento sexual de machos bovinos Senepol. 2019. 60 f. Dissertação – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS.

Resumo: O objetivo foi verificar a associação entre estratégias fisiológicas de regulação térmica e a precocidade sexual de tourinhos da raça Senepol. Utilizou-se 51 tourinhos da raça Senepol, com idade e peso médios de 12 meses e 276,5 kg, mantidos em pastagem em Miranda-MS. Os animais foram submetidos à três tentativas de coleta seminal no período de agosto de 2016 a março de 2017, para análise do perfil andrológico e classificação quanto a precocidade. Em cada coleta, também era realizada a biometria testicular completa e pesagem. Durante a segunda coleta, foi realizado um Teste de Capacidade Termolítica, para cálculo do Índice de Tolerância ao Calor (ITC), no qual registrou-se também variáveis fisiológicas e termográficas. O ambiente foi monitorado durante o Teste para determinação do Índice de Temperatura e Umidade (ITU). Procedeu-se uma análise de regressão logística incluindo-se no modelo efeitos fixos características zootécnicas, ITU, ITC e variáveis fisiológicas sobre as classes de precocidade dos animais. Não houve diferença significativa entre as classes de precocidade ($p > 0,05$) para os parâmetros fisiológicos. A classe Superprecocidade obteve maior valor para ganho médio diário de peso. Observou-se uma concordância de 58,3% e variação da probabilidade de Superprecocidade em função da temperatura do dorso de 28,0% e em função da frequência cardíaca, concordância de 53,8% e variação de 25,0%. Valores mais próximos do limiar fisiológico normal indicaram maior probabilidade de Superprecocidade. Tourinhos da raça Senepol que utilizam os mecanismos termorregulatórios de maneira mais eficiente, possuem maior probabilidade de serem Superprecoces, viabilizando a utilização da termotolerância para seleção.

Palavras-chave: Precocidade, reprodução, termografia por infravermelho, termorregulação

BRUNA FERRARI. Thermal stress and sexual development of bovine males Senepol. 2019. 60 f. Dissertation - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Federal University of Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS.

Abstract: The objective was to verify the association between physiological strategies of thermal regulation and the sexual precocity of Senepol young bulls. Fifty-one Senepol bulls were used, with mean age and weight of 12 months and 276.5 kg, kept in pasture in Miranda-MS. The animals were submitted to three attempts of seminal collection from August 2016 to March 2017, for analysis of the andrological profile and classification as to precocity. At each collection, complete testicular biometry and weighing were also performed. During the second collection, a Thermolytic Capacity Test was performed to calculate the Heat Tolerance Index (HTI), in which physiological and thermographic variables were also recorded. The environment was monitored during the Test to determine the Temperature and Humidity Index (THI). A logistic regression analysis was carried out, including in the model fixed effects zootechnical characteristics, THI, HTI and physiological variables on the precocious classes of the animals. There was no significant difference between the precocity classes ($p > 0.05$) for the physiological parameters. The class Superprecoce obtained higher value for average daily gain of weight. There was a concordance of 58.3% and variation of the probability of Superprecocity as a function of the back temperature of 28.0% and heart rate, agreement of 53.8% and variation of 25.0%. Values closer to the normal physiological threshold indicate greater probability of Superprecocity. Senepol breeders that use thermoregulatory mechanisms in a more efficient way, are more likely to be Superprecoces, making possible the use of thermotolerance for selection.

Key words: Infrared thermography, precocity, reproduction, thermoregulation

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Animal experimental da raça Senepol, no município de Miranda, Mato Grosso do Sul. Fonte: GERA-MS	32
Figura 2. Biometria testicular realizada nos animais experimentais da raça Senepol, durante o exame andrológico no município de Miranda, Mato Grosso do Sul. Fonte: GERA-MS.....	34
Figura 3. Esquema de coleta de temperatura retal do Teste de Capacidade Termolítica, realizado nos animais da raça Senepol, no município de Miranda, Mato Grosso do Sul. Fonte: GERA – MS	35
Figura 4. Análise das imagens termográficas obtidas nas regiões da cabeça, dorso e escroto, em tourinhos da raça Senepol, durante o Teste de Capacidade Termolítica, no município de Miranda, Mato Grosso do Sul. Fonte: GERA – MS.....	37
Figura 5. Índice de Temperatura e Umidade a sombra e ao sol, durante os dois dias do Teste de Capacidade Termolítica, realizado em bovinos machos da raça Senepol no município de Miranda, Mato Grosso do Sul, Brasil.....	39
Figura 6. Probabilidade de Superprecocidade em função da termografia do dorso (°C) de bovinos machos Senepol em Miranda-MS.....	43
Figura 7. Probabilidade de Superprecocidade em função da frequência cardíaca (batimento/minuto) de bovinos machos Senepol em Miranda-MS	43

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Índice de Tolerância ao Calor (ITC) e variáveis fisiológicas (média $\pm$ erro padrão), obtidos durante o Teste de Capacidade Termolítica, realizado no verão em machos bovinos Senepol	40
Tabela 2. Coeficiente de Correlação de Pearson (r) entre temperatura retal, temperaturas superficiais e obtidas por termografia em machos bovinos Senepol...	41
Tabela 3. Características zootécnicas (média $\pm$ erro padrão) de acordo com a classificação quanto à precocidade de tourinhos da raça Senepol, obtidos em três coletas realizadas em machos bovinos Senepol.....	42

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO GERAL	11
2 CAPÍTULO 1 – REVISÃO DE LITERATURA	13
2.1 Ambiente térmico	13
2.2 Termoregulação em bovinos	14
2.3 Estresse por calor	17
2.4 Estresse por calor e reprodução de machos bovinos.....	19
2.5 Raça Senepol.....	21
3 REFERÊNCIAS.....	22
4 CAPÍTULO 2 – EFICIÊNCIA TERMORREGULATÓRIA E PRECOCIDADE SEXUAL DE TOURINHOS SENEPOL EM AMBIENTE TROPICAL	30
Introdução	32
Materiais e métodos	33
Resultados	39
Discussão.....	44
Conclusão	48
Referências	48
ANEXO I.....	54
ANEXO II.....	55
ANEXO III.....	59

1 INTRODUÇÃO GERAL

2
3 A rentabilidade econômica de um sistema de produção é dependente da
4 capacidade produtiva e reprodutiva do rebanho. Por esse motivo, as
5 características que aumentam a eficiência reprodutiva, devem ser priorizadas
6 devido seu impacto direto na produtividade, principalmente ao se tratar de touros,
7 que possuem uma distribuição de material genético privilegiada pelo sistema
8 reprodutivo adotado pela maioria dos criadores (Costa e Silva et al., 2015).

9 Uma das características que pode favorecer o acelerar o progresso
10 genético, é a seleção da precocidade sexual, medida por meio da idade à
11 puberdade. A precocidade sexual, reduz o intervalo entre gerações, tornando
12 assim, o manejo mais eficiente (Moraes, 2012).

13 Sabe-se, porém, que a precocidade dos animais é influenciada por fatores
14 ligados à genética, nutrição e ao clima (Fields et al., 1982). No caso de touros
15 criados em ambiente tropical, o principal entrave é o estresse térmico oriundo da
16 influência de fatores microclimáticos típicos dessa região, que afetam de maneira
17 negativa o desenvolvimento sexual dos animais (Costa e Silva, 2004).

18 Uma estratégia para mitigar o impacto do estresse por calor e preservar
19 os bons índices reprodutivos é realizar a seleção de animais mais precoces que
20 também sejam adaptados ao ambiente de criação (Costa Mello, 2014). Isso pode
21 ser obtido, através da utilização de raças taurinas consideradas adaptadas ao
22 clima tropical, como a raça Senepol (Silva et al., 2018).

23 O Brasil possui o maior rebanho Senepol do mundo, com cerca de 90 mil
24 exemplares registrados já nascidos em solo nacional. O principal motivo dessa
25 expansão, é a viabilização da criação de animais taurinos sob condições
26 ambientais consideradas fora de sua zona de conforto térmico, tornando possível
27 a obtenção de sistemas de produção eficientes nos trópicos (Pimenta, 2016;
28 Menezes et al., 2018).

29 Todavia, ainda se faz necessário identificar características que viabilizem
30 a seleção de indivíduos mais adaptados e com boa herdabilidade, para que
31 possam ser adotadas em Programas de Melhoramento Genético (Costa e Silva
32 et al., 2015).

33 Dessa forma foi realizado um estudo com o objetivo de verificar a
34 associação entre as estratégias fisiológicas de regulação térmica e a
35 precocidade sexual de tourinhos da raça Senepol.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 2 CAPÍTULO 1 – REVISÃO DE LITERATURA

68

69 2.1 Ambiente térmico

70

71 A identificação de elementos que afetam a vida produtiva dos animais
72 possibilita maior eficiência no manejo, e um dos principais fatores que
73 influenciam a produção, é o ambiente térmico. Um ambiente é considerado
74 termicamente confortável quando há um balanço adequado entre o calor
75 produzido pelo metabolismo e o que é perdido para o meio ambiente, sem
76 prejudicar a homeostase do animal (Silva, 2000).

77 Entretanto, em situações nas quais esse equilíbrio não pode ser
78 sustentado, o clima pode atuar como um limitante da produtividade, interferindo
79 no crescimento, produção e reprodução, gerando perdas econômicas (Brown-
80 Brandl, 2018).

81 Variáveis ambientais independentes como radiação solar, temperatura do
82 ar, umidade relativa, velocidade do vento e precipitação agem simultaneamente
83 constituindo o clima e afetando direta e indiretamente os animais
84 homeotérmicos, como os bovinos (Collier & Gebremedhim, 2015).

85 Entre elas, a temperatura do ar e a umidade são elementos que influenciam
86 fortemente o conforto térmico dos animais, devido a sua relação com os
87 processos físicos de trocas de calor (Cattelam & Vale, 2013). Quando essas
88 variáveis apresentam valores altos, tornam o ambiente extremamente difícil para
89 a termorregulação dos animais, especialmente se associadas com intensa
90 radiação solar, como é característico do clima tropical que compreende dois
91 terços do território brasileiro (Maireles, 2005).

92 A duração e a intensidade dos elementos climáticos nesse tipo de
93 ambiente, geralmente se encontram acima da faixa termoneutra dos bovinos que
94 é para animais taurinos, entre -1°C e 21°C e para zebuínos entre 10°C e 32°C
95 (Miranda & Freitas, 2009), podendo variar de acordo com: raça, peso, idade,
96 estado fisiológico, nutrição e condição ambiental (Takahashi et al., 2009).

97 Quando os animais se encontram dentro dessa faixa de conforto de
98 temperatura ambiente, a manutenção da temperatura corporal dá-se com a
99 mínima mobilização dos mecanismos termorreguladores, abstendo o animal de
100 entrar em estresse por frio ou calor, o que permite maior eficiência produtiva e

101 reprodutiva (Silva, 2000). Porém, se a temperatura ambiente se eleva ou diminui,
102 além da chamada temperatura crítica (superior ou inferior), o animal perde a
103 capacidade de manter o equilíbrio térmico e fica susceptível a ocorrência da hiper
104 ou hipotermia, podendo levar até a sua morte (Medeiros & Vieira, 1997).

105 Devido a essa acentuada influência do ambiente sob o organismo dos
106 animais homeotérmicos, alguns índices foram desenvolvidos com o intuito de
107 avaliar o ambiente e mensurar o conforto térmico. Os quais utilizam como
108 principais variáveis para cálculo a temperatura do ar e a umidade, (Pezzopane
109 et al., 2019).

110 Dentre eles, o Índice de Temperatura e Umidade (ITU) foi estabelecido
111 originalmente por Thom (1958) para mensurar o conforto térmico de humanos,
112 sendo posteriormente utilizado para animais de produção, principalmente
113 bovinos. Ele é estabelecido a partir da temperatura registrada em termômetros
114 de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido (ponto de orvalho) e classificado
115 como: condição normal quando os valores são iguais ou < que 70, entre 71 e 78
116 a situação é considerada crítica; entre 79 e 83 a situação é de perigo e maiores
117 que 83, condição de emergência (Hahn & Mader, 1997).

118

119 **2.2 Termorregulação em bovinos**

120

121 A termorregulação é uma adaptação evolutiva, sendo sua principal
122 vantagem possibilitar um funcionamento mais eficiente do organismo no meio ao
123 qual este se adaptou, garantindo sua sobrevivência e correto funcionamento das
124 funções metabólicas (Façanha et al., 2013). Ela é o produto da conexão entre
125 ambiente externo e capacidade de resposta interna dos animais homeotérmicos,
126 com o intuito de manter o ambiente interno estável ainda que o externo seja
127 variável (Dantas et al., 2012).

128 A manutenção desse equilíbrio térmico se dá através das trocas de calor
129 realizadas entre animal e ambiente, por meio dos processos físicos de: condução
130 (troca térmica através do contato direto entre duas superfícies), convecção (troca
131 térmica pela movimentação de fluidos), radiação (troca de calor por meio de
132 energia radiante) e evaporação (troca térmica pela passagem das moléculas de
133 água ao ar, sob vapor), sendo as três primeiras trocas sensíveis e a última,
134 latente (Collier & Gebremedhim, 2015).

135 As trocas de calor sensíveis são dependentes de um gradiente térmico
136 entre animal e ambiente. Quando a temperatura do ambiente se iguala ou
137 excede a da superfície corpórea do animal, a perda de calor sensível é nula. Isso
138 torna a evaporação a principal via de termólise em situações de temperaturas
139 adversas (Bridi, 2001).

140 Aproximadamente 30% das perdas de calor ocorrem por meio da
141 evaporação cutânea, quando a faixa de temperatura encontra-se entre 10 e
142 20°C, a eliminação do calor excedente é realizada mediante trocas de calor
143 sensível. Entretanto, com a elevação da temperatura acima dos 30°C, as perdas
144 por condução, convecção e radiação se tornam ineficientes, de maneira que 85%
145 da termólise ocorre por evaporação cutânea e o restante por evaporação
146 respiratória (Maia et al., 2005).

147 A administração desses processos é realizada pelo sistema
148 termorregulador, controlado pelo hipotálamo (Silva & Maia, 2013). As células
149 especializadas termorreceptoras periféricas localizadas na pele dos animais
150 captam as sensações térmicas e informam ao hipotálamo a necessidade de
151 acionamento ou não dos mecanismos termorregulatórios, operando como um
152 termostato fisiológico (Takahashi et al., 2009).

153 Os mecanismos relacionados na aquisição e dissipação de calor podem
154 ser classificados em: comportamentais, autônomos e adaptativos (Silva, 2000).
155 Os comportamentais estão relacionados a alterações do comportamento animal
156 para lidar com a carga térmica do ambiente, como busca por sombra ou lâminas
157 de água, no calor e agrupamento no frio. Os autônomos referem-se a ajustes
158 fisiológicos, como alterações no fluxo sanguíneo, acionamento das glândulas
159 sudoríparas, variações no consumo de água e alimentos, aceleração do ritmo
160 respiratório, variação na posição dos pelos, e outros. Mudanças em seres vivos
161 causadas pelo ambiente como um todo, ao longo do tempo, qualificam os
162 mecanismos adaptativos, como características de pele e pelame, conformação
163 corporal, entre outras (Medeiros & Vieira, 1997; Silva, 2000; Batista, 2012).

164 A sequência de utilização desses recursos é: vasodilatação periférica, início
165 da sudorese, elevação da frequência respiratória, mudança de comportamento,
166 alterações na atividade endócrina; maior consumo de água e por fim, elevação
167 da temperatura corporal (Takahashi et al., 2009).

168 A elevação da frequência cardíaca é uma das respostas mais prontas frente
169 ao aumento da temperatura acima da zona de conforto térmico dos animais. Isso
170 ocorre devido à queda de pressão sanguínea como consequência da
171 vasodilatação periférica, que tem como finalidade facilitar a transferência da
172 energia térmica do interior do corpo para o ambiente, acarretando em incremento
173 do trabalho cardíaco (McManus et al., 2009).

174 Outro processo de troca térmica influenciado pela elevação da frequência
175 cardíaca é a sudação, com o aumento do volume de sangue para a pele, as
176 glândulas sudoríparas são estimuladas, viabilizando a evaporação cutânea
177 (Silva, 2000).

178 O aumento da frequência respiratória é um meio eficaz de termólise através
179 de evaporação, porém, é de alto custo energético e quando utilizada por longos
180 períodos pode resultar em danos ao metabolismo dos animais (Vilela, 2008), até
181 60 movimentos respiratórios por minuto, são considerados valores normais para
182 bovinos adultos (Perissinoto et al., 2009).

183 A temperatura retal é a variável fisiológica mais utilizada para determinar a
184 adaptabilidade dos animais, pois representa a temperatura metabólica e quando
185 fora dos limiares considerados normais (até 39,3°C), aponta ineficácia dos
186 demais mecanismos de termólise (Mota, 1997; Martello et al., 2009).

187 Uma gama de componentes e interações complexas está envolvida na
188 manutenção da homeotermia para evitar o estresse, porém, apesar de ser algo
189 intrínseco aos animais, ela demanda um empenho extra, desviando energia que
190 seria destinada em sua totalidade para a produção, caso o animal estivesse em
191 equilíbrio térmico (Titto, 2006; Brown-Brandl & Jones, 2011).

192 Isso ocorre porque no metabolismo animal, a homeotermia é prioridade,
193 colocando as funções produtivas em segundo plano, entre essas funções menos
194 vitais seriamente afetadas, está a reprodução (Souza & Batista, 2012). Sendo
195 assim, é essencial que os animais utilizem recursos efetivos de termorregulação,
196 do contrário, eles se tornam susceptíveis ao estresse térmico e os danos
197 causados por ele no organismo e consequentemente, na produção e reprodução
198 (Souza et al., 2015).

199

200

201

2.3 Estresse por calor

O estresse pode ser definido como um efeito ambiental sobre um indivíduo que coloca uma sobrecarga sobre os seus sistemas de controle e reduz o seu *fitness*, o que envolve aumento de mortalidade e insucesso no crescimento ou na reprodução (Broom & Johnson, 1993).

As respostas ao estresse são realizadas pelo sistema nervoso autônomo (SNA) e pelo eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal (HHA). O SNA é responsável pela resposta mais imediata ao estressor, sua reação promove liberação de noradrenalina nas terminações dos nervos simpáticos e de adrenalina, pela estimulação simpática das células da medula da glândula adrenal, estas estimulam a função cardíaca, elevam a pressão e a glicose sanguínea (Ulrich-Lai & Herman, 2009).

Em um segundo momento, ocorre a ativação do eixo HHA, no qual o estressor atua via sistema nervoso central, sobre as células neurosecretoras do hipotálamo, que reagem secretando o fator liberador de corticotrofina (CRF). Esse hormônio é transportado até a hipófise e lá gera um aumento da secreção do hormônio adenocorticotrófico (ACTH). O ACTH, por meio da circulação sanguínea, estimula o córtex adrenal a produzir e secretar glicocorticoides, como o cortisol (Encarnação, 1986; Moberg & Mench, 2000).

Os glicocorticoides promovem a mobilização da energia armazenada e intensificam as reações realizadas pelo SNA. A conclusão da resposta ao estresse também é processada por meio deles, através de um sistema de *feedback* negativo, inibindo a atividade do hipotálamo e da hipófise, de tal modo que após um curto período de tempo os níveis séricos voltam a normalidade (Tsigos & Chrousos, 2002).

De maneira geral, o mecanismo de estresse pode ser dividido em três estágios: alarme, resistência e esgotamento. No primeiro estágio (alarme), há o reconhecimento do agente estressor e ativação do SNA e HHA, produzindo e liberando os hormônios do estresse, como adrenalina, noradrenalina e cortisol, que irão desencadear uma série de reações para preparar o organismo para “luta ou fuga”, dentre elas estão: a aceleração do batimento cardíaco, dilatação das pupilas, aumento da sudorese e dos níveis de glicose no sangue e redução das funções menos vitais, como digestão e reprodução (Santos & Castro, 1998).

236 Se o estressor persiste, mas não o suficiente para causar morte, o animal
237 entra no segundo estágio (resistência), no qual tenta reparar os danos causados
238 pela reação de alarme e se adaptar, reduzindo os níveis hormonais. No entanto,
239 se o estresse continua enfraquecendo seu sistema imunológico e findando suas
240 reservas energéticas até sua resistência se tornar muito baixa, tem início o
241 terceiro estágio (esgotamento), podendo ter como resultado final, a morte do
242 animal (Costa et al., 2015).

243 Uma das causas mais comuns de estresse em bovinos criados nos trópicos
244 é a combinação de fatores microclimáticos, como elevadas temperaturas e alta
245 incidência de radiação solar, característicos dessa região, culminando em
246 estresse por calor (Façanha et al., 2013).

247 O estresse por calor compromete o funcionamento normal de atividades
248 fisiológicas e comportamentais levando à redução do consumo alimentar, queda
249 da produção e da qualidade do leite, atraso do cio, diminuição da qualidade do
250 sêmen, entre outros (Hafez & Hafez, 2004; Cattelam & Vale, 2013).

251 O baixo desenvolvimento corporal também pode ser um produto da ação
252 do ambiente sobre o metabolismo dos bovinos, pois durante o estresse, o
253 organismo sofre efeito catabólico e aumento da gliconeogênese, que são
254 estimulados pelos glicocorticosteróides, levando a perda de peso dos animais,
255 em decorrência da utilização de tecidos musculares e gordurosos para obtenção
256 de glicose destinada à produção de energia (Carlson, 2002).

257 Essa situação também é agravada pela redução do pastejo, com objetivo
258 de evitar o incremento calórico e a exposição solar, prejudicando a
259 disponibilidade de energia, principalmente para as funções menos vitais como
260 produção e reprodução, que não são atendidas apropriadamente (Dantas et al.,
261 2012).

262 Todas essas condições tornam o estresse por calor uma importante fonte
263 de perda econômica na pecuária, atingindo a produção em diferentes vertentes
264 e salientando a importância da identificação e utilização de animais adaptados e
265 produtivos, sobretudo na seleção dos reprodutores que serão os formadores do
266 rebanho, em especial de touros, que deixam um maior número de descendentes
267 (Azevedo & Alves, 2009; Costa e Silva et al., 2010).

268
269

2.4 Estresse por calor e reprodução de machos bovinos

270
271

272 Os efeitos do estresse por calor sobre a reprodução ocorrem de duas
273 formas: devido às vicissitudes hormonais que afetam também as funções
274 reprodutivas e devido à ação da hipertermia sobre o metabolismo e tecidos
275 reprodutivos dos bovinos (Azevedo & Alves, 2009).

276 Os hormônios envolvidos na resposta ao estresse térmico podem
277 influenciar a função sexual em três níveis do eixo hipotalâmico-hipofisário-
278 gonadal (HHG). A cascata de eventos tem início no hipotálamo, no qual o CRF
279 inibe a secreção de GnRH (hormônio liberador de gonadotrofina) e,
280 conseqüentemente, na hipófise anterior, reduz a liberação de LH (Hormônio
281 Luteinizante) e de FSH (Hormônio Folículo Estimulante), prejudicando o efeito
282 estimulante das gonadotrofinas sob as gônadas e assim, comprometendo a
283 eficiência reprodutiva (Costa et al., 2015).

284 A puberdade é considerada uma das fases de maior importância para os
285 touros, nesse período ocorrem mudanças endócrinas e espermáticas,
286 concomitantemente, ao crescimento corporal do animal, que irão torná-los aptos
287 à reprodução (Costa e Silva et al., 2013).

288 Os eventos primários responsáveis pelo início da puberdade são oriundos
289 do eixo HHG, no qual ocorrem descargas pulsáteis de LH, que propiciam a
290 diferenciação, crescimento e proliferação das células de Leydig que secretam
291 testosterona e de FSH, que atua nas células de Sertoli, responsáveis pela
292 síntese de diferentes mediadores químicos envolvidos com a espermatogênese
293 (Fernandes & Souza, 2010; Costa Mello et al., 2016).

294 Dessa forma, quaisquer alterações mínimas do sistema neuroendócrino,
295 como as proporcionadas pela ação do estresse por calor, podem afetar a
296 reprodução causando atrasos na puberdade dos animais (Fernandes & Souza,
297 2010). A maior precocidade dos touros aumenta a produtividade do rebanho, ao
298 antecipar a utilização dos animais na reprodução, otimizando o retorno
299 econômico para os reprodutores (Costa e Silva et al., 2013).

300 Além da puberdade, o estresse térmico também age sobre o
301 comportamento sexual dos bovinos, de forma que os animais irão manifestar
302 maior desejo sexual nas horas mais amenas do dia, no início da manhã e fim da
303 tarde (Costa e Silva et al., 2010). Entretanto, os impactos da hipertermia no

304 metabolismo dos touros são mais preocupantes quando se trata do sistema
305 reprodutor dos animais, como a ocorrência da degeneração testicular, uma
306 patologia ocasionada pela elevação da temperatura escrotal, na qual em
307 estágios avançados pode tornar os testículos atrofiados e fibrosos, apresentando
308 falha total da espermatogênese (Bicudo et al., 2007).

309 Além disso, espermatogênese é dependente de um limiar entre 2°C a 6°C
310 abaixo da temperatura corporal para seu correto funcionamento. Touros que não
311 são capazes de manter um gradiente de temperatura escrotal normal
312 apresentam fertilidade reduzida, esse gradiente é de cerca de 4°C, sendo a
313 temperatura média do cordão espermático de 36,9°C e a temperatura da cauda
314 dos epidídimos de 32, 8°C (Souza et al., 2014).

315 A partir da segunda semana de estresse térmico, cresce o número de
316 espermatozóides anormais e a motilidade é reduzida, por períodos prolongados
317 os danos podem ser irreversíveis, principalmente na fase inicial da vida
318 reprodutiva dos touros (Costa e Silva, 2004).

319 Para minimizar o efeito do calor sobre os testículos, os bovinos utilizam
320 duas estratégias importantes: afastar o máximo possível as gônadas da parede
321 abdominal, por meio do relaxamento do músculo cremáster e da túnica dartus; e
322 através da circulação sanguínea, realizando trocas de calor em contracorrente,
323 pelo plexo pampiniforme, reduzindo até 4°C (Fernandes & Souza, 2010). Além
324 disso, a pele do escroto é extremamente mais fina, praticamente livre de gordura
325 subcutânea e com volume por unidade de superfície de glândulas sudoríparas
326 maior que em outras partes do corpo, otimizando a perda de calor por
327 evaporação (Machado Junior, 2006).

328 O formato testicular também pode influenciar na termorregulação. Bovinos
329 com testículos mais longos possuem uma distribuição mais uniforme dos vasos
330 sanguíneos e dos tecidos espermáticos, além de contar com uma superfície de
331 contato maior, facilitando as trocas de calor com o ambiente (Bailey et al., 1996).

332 Sendo assim, os animais mais susceptíveis à ação do estresse térmico,
333 terão seu desenvolvimento sexual prejudicado, como os touros europeus, que
334 são menos adaptados ao clima dos trópicos e sofrem desgaste fisiológico de
335 forma mais rápida e acentuada do que animais zebuínos e adaptados, podendo
336 reduzir sua vida útil no rebanho (Costa e Silva, 2004). Isso se deve ao equívoco
337 cometido, ao selecionar animais altamente produtivos, porém, que no campo não

338 apresentam a performance esperada, devido a interação genótipo-ambiente
339 (Façanha et al., 2013).

340

341 **2.5 Raça Senepol**

342

343 A raça Senepol tem se difundido entre os criadores, embora seu ingresso
344 seja recente no território nacional (ano de 2000). Segundo a Associação
345 Brasileira de Criadores de Bovinos Senepol (ABCB Senepol), o Brasil é o
346 detentor do maior rebanho Senepol do mundo e um dos principais motivos é a
347 busca de genótipos que conciliem bons índices produtivos e adaptação ao clima
348 dos trópicos (Pimenta, 2016).

349 A raça surgiu na ilha caribenha de Saint Croix, nas Ilhas Virgens
350 Americanas em meados do século XX, por meio do cruzamento de animais das
351 raças N'Dama (taurino africano) e Red Poll (taurino britânico), com o intuito de
352 obter um animal que se sobressaísse produtivamente mesmo no ambiente
353 severo da ilha (Okamura, 2015).

354 De fato, os bovinos Senepol possuem uma pluralidade de atributos que
355 indicam adaptação aos trópicos (Paula, 2014), entre elas, destaca-se uma capa
356 de pelame dotada de pelos assentados, curtos, lisos e brilhantes, provenientes
357 de uma mutação no receptor de prolactina, que contribui para maior tolerância
358 ao calor devido (Olson, 2003; Porto-Neto et al., 2018), como observado pela
359 menor temperatura retal e menor impacto na produção, mesmo sob condições
360 de desafio térmico, em animais que possuíam o fenótipo *slick* (Dikmen et al.,
361 2014). Pelos com essas características, facilitam as trocas de calor permitindo
362 maior eficiência na termólise e conseqüentemente, maior adaptação ao
363 ambiente tropical (Silva, 2000; Ribeiro et al., 2008).

364 Outra característica de grande contribuição para a termorregulação, é a
365 peculiaridade da raça quanto às glândulas sudoríparas. A eficiência da sudorese
366 na termólise é dependente do número e morfologia das glândulas, animais
367 Senepol possuem 96% das glândulas do tipo saculiforme, de maior diâmetro e
368 volume, aumentando a capacidade de sudação (Pila, 2011).

369 Em relação à reprodução, machos apresentam o formato testicular do tipo
370 longo oval (Moraes, 2012), muito comum entre bovinos adaptados ao clima
371 tropical, pois proporciona maior superfície de contato, facilitando as trocas

372 térmicas com o ambiente (Bailey et al., 1996). Esses animais também
373 apresentam idade à puberdade inferior a outros taurinos criados sob clima
374 tropical, sugerindo melhor adaptação (Bagu, 2006).

375 Não há dúvidas de que um dos principais obstáculos para o aumento da
376 produtividade nos trópicos, é a busca por uma conciliação satisfatória entre
377 animal e ambiente, para que o cerne da criação animal, que é a produtividade,
378 não seja prejudicado. Uma estratégia que poderia auxiliar nesse impasse, seria
379 a inserção em sistemas de produção de raças consideradas adaptadas, como a
380 Senepol.

381

382

REFERÊNCIAS

383

384 **ABCB Senepol - Associação Brasileira dos Criadores de bovinos Senepol.**

385 Disponível em: <<http://www.senepol.org.br/>>. Acesso em 11 de janeiro de 2019.

386 ALENCAR, M.M. Perspectivas para o melhoramento genético de bovinos de
387 corte no Brasil. In: SIMPÓSIO SOBRE MELHORAMENTO ANIMAL, REUNIÃO
388 ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 41, 2004, Campo
389 Grande. **Anais...** Campo Grande: SBZ, 2004.

390 AZEVEDO, D. M. M. R.; ALVES, A. A. **Bioclimatologia aplicada à produção**
391 **de bovinos leiteiros nos trópicos.** Teresina, Embrapa Meio-Norte, 2009,
392 (Documentos 188).

393 BAGU, E. T.; COOK, S. J.; HONARAMOOZ, A.; ARAVINDAKSHAN, J. P.;
394 HUCHKOWSKY, S.; RAWLINGS, N. C. Changes in serum luteinizing hormone
395 (LH) concentrations in response to luteinizing hormone releasing hormone
396 (LHRH) in bull calves that attained puberty early or late. **Theriogenology**, v. 66,
397 p. 937 – 944, 2006.

398 BAILEY, T. L.; MONKE, D.; HUDSON, R. S.; WOLFE, D. F.; CARSON, R. L.;
399 RIDDELL, M. G. Testicular shape and its relationship to sperm production in
400 mature Holstein bulls. **Theriogenology**, v. 46, p. 881-887, 1996.

401 BATISTA, A. A. F. M. L. **Pele e pelame de bovinos e bubalinos como fatores**
402 **de adaptação ao clima tropical.** 2012. 62 p. Dissertação (Mestrado em
403 Zootecnia) – Instituto de Zootecnia, Universidade Federal Rural do Rio de
404 Janeiro, Seropédica.

- 405 BICUDO, S. D.; SIQUEIRA, J. B.; MEIRA, C. Patologias do sistema reprodutor
406 de touros. **Biológico**, São Paulo, v. 69, n. 2, p. 43-48, 2007.
- 407 BRIDI, A. M. **Adaptação e Aclimação Animal**. 2010. Disponível em
408 <http://www.uel.br/pessoal/ambridi/Bioclimatologia_arquivos/AdaptacaoeAclima
409 [tacaoAnimal.pdf](http://www.uel.br/pessoal/ambridi/Bioclimatologia_arquivos/AdaptacaoeAclima)>. Acesso em 05 de dezembro de 2018.
- 410 BROOM, D. M.; JOHNSON, K. G. **Stress and Animal Welfare**. 1ª ed.,
411 Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1993, 211 p.
- 412 BROWN-BRANDL, T. M.; JONES, D. D. Feedlot cattle susceptibility to heat
413 stress: an animal-specific model. **Transactions of the ASABE**, v. 54, p. 583-
414 598, 2011.
- 415 BROWN-BRANDL, T. M. Understanding heat stress in beef cattle. **Revista**
416 **Brasileira de Zootecnia**, Viçosa, v. 47, 2018.
- 417 CARLSON, N. R. **Fisiologia do Comportamento**. 7ª ed., Barueri, Manole, 2002.
418 699 p.
- 419 CATTELAM, J.; DO VALE, M. M. Estresse térmico em bovinos. **Revista**
420 **Portuguesa de Ciências Veterinárias**, 108, p. 96–102, 2013.
- 421 COLLIER, R. J.; GEBREMEDHIN, K. G. Thermal biology of domestic animals.
422 **Annual Review of Animal Biosciences**, v. 3, p. 513-532, 2015.
- 423 COSTA, D. F.; SOUTO, D. V. O.; ROCHA, E. F.; GUIMARÃES, L. J.; SILVA, M.
424 R.; SOUZA, B. B.; SILVA, G. A. Influência do estresse calórico na fisiologia
425 hormonal de bovinos. **Agropecuária Científica no Semiárido**, v. 11, p. 33 – 38,
426 2015.
- 427 COSTA MELLO, R. R. Puberdade e maturidade sexual em touros bovinos.
428 **ACSA – Agropecuária Científica no Semi-árido**, v. 10, p. 11-28, 2014.
- 429 COSTA MELLO, R. R.; FERREIRA, J. E.; MELLO, M. R. B.; PALHANO, H. B.
430 Influência do manejo na fisiologia reprodutiva do macho bovino. **Arquivos de**
431 **Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar**, v. 19, n. 1, pp. 57-63, 2016.
- 432 COSTA E SILVA, E.V. Estresse e manejo reprodutivo de bovinos de corte:
433 problemas e soluções. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE,
434 4., 2004, Viçosa, MG. **Anais...** Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa,
435 2004. p. 459-484.
- 436 COSTA E SILVA, E. V.; RUEDA, P. M.; CARNEIRO, R. C. P. B.; MACEDO, G.
437 G.; ZÚCCARI, C. E. S. N. Estratégias para avaliar bem-estar animal em animais

- 438 em reprodução. II Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-Estar Animal, Belo
439 Horizonte. **Revista Ciência Veterinária nos Trópicos**, v. 13, p. 20-28, 2010.
- 440 COSTA E SILVA, E. V.; FERREIRA, B. X.; QUEIROZ, V. L. D.; COSTA FILHO,
441 L. C. C.; ZÚCCARI, C. E. S. N. Precocidade sexual de touros a campo em
442 condições tropicais. **Revista Brasileira de Reprodução Animal**, v. 37, p. 97 –
443 104, 2013.
- 444 COSTA E SILVA, E. V.; COSTA FILHO, L. C. C.; SOUZA, C. C.; OLIVEIRA, C.
445 C.; QUEIROZ, V. L. D.; ZUCCARI, C. E. S. N. Seleção de touros para reprodução
446 a campo: novas perspectivas. **Revista Brasileira de Reprodução Animal**, v.
447 39, p. 22-31, 2015.
- 448 DANTAS, M. R. T.; SOUZA JUNIOR, J. B. F.; DOMINGOS, H. G. T.;
449 TORQUATO, J. L.; FILHO, G. F. S.; COSTA, L. L. M. Termoregulação de bovinos
450 em ambiente tropical: uma abordagem com ênfase nas respostas fisiológicas.
451 **PUBVET**, v. 6, 2012.
- 452 DIKMEN, S.; KHAN, F. A.; HUSON, H. J.; SONSTEGARD, T. S.; MOSS, J. I.;
453 DAHL, G. E.; HANSEN, P. J. The SLICK hair locus derived from Senepol cattle
454 confers thermotolerance to intensively managed lactating Holstein cows. **Journal**
455 **of Dairy Science**. v. 97, p. 5508–5520, 2014.
- 456 ENCARNAÇÃO, R. O. **Estresse e produção animal**. Campo Grande, MS,
457 EMBRAPA-CNPCC, 32 p., 1986.
- 458 FAÇANHA, D. A. E.; CHAVES, D. F.; MORAIS, J. H. G.; VASCONCELOS, A. M.;
459 COSTA, W. P.; GUILHERMINO, M. M. Tendências metodológicas para
460 avaliação da adaptabilidade ao ambiente tropical. **Revista Brasileira de Saúde**
461 **e Produção Animal**, v. 14, p. 91-103, 2013.
- 462 FERNANDES, C. E.; SOUZA, M. I. L. **Fisiologia do aparelho reprodutivo no**
463 **touro; Avaliação Clínica e exame de sêmen no touro**. 81 p., Campo Grande,
464 2010.
- 465 FIELDS, M. J.; FHENTGES, J. R.; CORNELISS, K. W. Aspect of the sexual
466 development of Brahman versus Angus bulls in Florida. **Theriogenology**, v. 18,
467 p. 17–31, 1982.
- 468 HAFEZ, E. S. E.; HAFEZ, B. **Reprodução Animal**. Barueri, Manole, 2004. 513
469 p.
- 470 HAHN, G. L.; MADER, T. L. Heat waves in relation to thermoregulation, feeding
471 behavior and mortality of feedlot cattle. Proceedings of the International livestock

- 472 environment symposium. Minneapolis, Minneapolis. **Annals...** St. Joseph:
473 ASAE. p. 563-567, 1997.
- 474 MACHADO JÚNIOR, A. A. N. **Influência da morfologia escrotal sobre a**
475 **termorregulação, a biometria escroto-testicular e o comportamento sexual**
476 **de caprinos nos períodos seco e chuvoso do Estado do Piauí.** 2006, 84 p.
477 DISSERTAÇÃO (Mestrado em Ciência Animal) – Universidade Federal do Piauí,
478 Teresina.
- 479 MAIA, A. S. C.; SILVA, R. G.; BATTISTON LOUREIRO, C. M. Sensible and latent
480 heat loss from the body surface of Holstein cows in a tropical environment.
481 **International Journal of Biometeorology**, v. 50, p. 17-22, 2005.
- 482 MARTELLO, L. S.; SAVASTANO JUNIOR, H.; SILVA, S. L.; BALIEIRO, J. C.
483 C. Alternative body sites for heat stress measurement in milking cows under
484 tropical conditions and their relationship to the thermal discomfort of the
485 animal. **International Journal of Biometeorology**, v. 54, p. 647-652, 2009.
- 486 MCMANUS, C.; PRESCOTT, E.; PALUDO, G. R.; BIANCHINI, E.; LOUVANDINI,
487 H.; MARIANTE, A. S. Heat tolerance in naturalized Brazilian cattle breeds.
488 **Livestock Science**, v. 120, p. 256-264, 2009.
- 489 MEDEIROS, L. F. D.; VIEIRA, D. H. **Bioclimatologia Animal.** Universidade
490 Federal Rural do Rio de Janeiro, 1997.
- 491 MEIRELES, I. P. **Influência do sombreado em parâmetros fisiológicos e**
492 **produtivos de vacas mestiças (holandês x zebu).** 2005, 63 p. Dissertação
493 (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,
494 Itapetinga.
- 495 MENEZES, C. **Sumário de touros Senepol GENEPLUS | EMBRAPA.**
496 Uberlândia, MG. Grupo Publique, 2018.
- 497 MIRANDA, J. E. C.; FREITAS, A. F. **Raças e tipos de cruzamento para a**
498 **produção de leite.** Juiz de Fora, MG, EMBRAPA-CNPGL, 2009.
- 499 MOBERG, G. P.; MENCH, J. A. **The Biology of Animal Stress: basic**
500 **principles and implications for animal welfare.** New York, CABI, 2000, 377 p.
- 501 MORAES, G. P. **Puberdade e maturidade sexual de tourinhos Senepol,**
502 **criados semi-extensivamente na região do Triângulo Mineiro – MG.** 2012.
503 56 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) – Universidade Federal
504 de Minas Gerais, Escola de Veterinária.

- 505 MOTA, L. S. **Adaptação e interação genótipo-ambiente em vacas leiteiras.**
506 1997, 69 p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
507 Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.
- 508 OKAMURA, V. **Estrutura genética da raça Senepol no Brasil por meio de**
509 **análise de pedigree.** 2015, 42 p. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) –
510 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande.
- 511 OLSON, T. A.; LUCENA, C.; CHASE, C. C JR.; HAMMOND, A. C. Evidence of a
512 major gene influencing hair length and heat tolerance in *Bos taurus* cattle.
513 **Journal of Animal Science**, v. 81, p. 80-90, 2003.
- 514 PAULA, D. F. **Senepol: Feito para o Brasil.** Campo Grande: ABCBS, 161 p.,
515 2014.
- 516 PERISSINOTTO, M.; MOURA, D. J.; CRUZ, V. F.; SOUZA, S. R. L.; LIMA, K. A.
517 O.; MENDES, A. S. Conforto térmico de bovinos leiteiros confinados em clima
518 subtropical e mediterrâneo pela análise de parâmetros fisiológicos utilizando a
519 teoria dos conjuntos fuzzy. **Ciência Rural**, v. 39, p. 1492-1498, 2009.
- 520 PEZZOPANE, J. R. M.; NICODEMO, M. L. F.; BOSI, C.; GARCIA, A. R.; LULU,
521 J. Animal thermal comfort indexes in silvopastoral systems with different tree
522 arrangements. **Journal of Thermal Biology**, v. 79, p. 103-111, 2019.
- 523 PILA, J. C. **Avaliação da adaptabilidade de novilhas da raça Senepol ao**
524 **calor pela análise de suas respostas fisiológicas e características das**
525 **glândulas sudoríparas.** 2011, 32 p. Trabalho de Conclusão de Curso
526 (Graduação em Zootecnia) - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias,
527 UNESP, Campus de Jaboticabal, São Paulo.
- 528 PIMENTA, O. S. **Parâmetros fisiológicos e índice de tolerância ao calor em**
529 **novilhos Senepol,** 2016, 43 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) -
530 Universidade Federal de Goiás, Goiânia.
- 531 PORTO-NETO, L. R.; BICKHART, D .M.; LANDAETA-HERNANDEZ, A. J.;
532 UTSUNOMIYA, Y. T.; PAGAN, M.; JIMENEZ, E.; HANSEN, P. J.; DIKMEN, S.;
533 SCHROEDER, S. G.; KIM, E.; SUN, J.; CRESPO, E.; AMATI, N.; COLE, J. B.;
534 NULL, D. J.; GARCIA, J. F.; REVERTER, A.; BARENDSE, W.; SONSTEGARD,
535 T. S. Convergent evolution of slick coat in cattle through truncation mutations in
536 the prolactin receptor. **Frontiers in Genetics**. v. 9, p. 1 – 8, 2018.
- 537 RIBEIRO, A. R. B.; ALENCAR, M. M.; OLIVEIRA, M. C. S. Características do
538 pelame de bovinos Nelore, Angus x Nelore e Senepol x Nelore. In: REUNIÃO

- 539 ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 45, 2008, Lavras, MG.
540 **Anais...**
- 541 SILVA, R. G. **Introdução a Bioclimatologia Animal**. São Paulo: Nobel, 2000,
542 286 p.
- 543 SANTOS, A. M.; CASTRO, J. J. Stress. **Análise Psicológica**, v. 4, p. 675 – 690,
544 1998.
- 545 SILVA, R. G.; MAIA, A. S. C. **Principles of Animal Biometeorology**.
546 Biometeorology, 2013.
- 547 SILVA, A. L.; SATO, G. Y. P.; BORDIN, R. A.; REIS, H. M. G. A raça Senepol
548 como opção para o melhoramento genético em adaptabilidade ao clima tropical.
549 **Tekhne e Logos**, v. 9, p. 16 – 30, 2018.
- 550 SOUZA, B. B.; BATISTA, N. L. Os efeitos do estresse térmico sobre a fisiologia
551 animal. **Agropecuária Científica no Semiárido**, v. 8, p. 6-10, 2012.
- 552 SOUZA, C. D.; CHACUR, M. G. M.; RUEDIGER, F. R.; ANDRADE, I. B.;
553 CARTOCCI, J. S.; BASTOS, G. P.; OBA, E.; RAMOS, A. A. Termorregulação
554 escrotal em touros nelore (*Bos taurus indicus*). **Colloquium Agrariae**, v. 10, p.
555 101-106, 2014.
- 556 SOUZA, C. D.; CHACUR, M.G.M.; RUEDIGER, F.R.; ANDRADE, I.B.;
557 CARTOCCI, J.S.; BASTOS, G.P.; OBA, E.; RAMOS, A.A.; GABRIEL FILHO,
558 L.R.A.; CREMASCO, C.P.; PUTTI, F.F. Influência dos fatores climáticos no
559 sêmen de touros Nelore (*Bos Taurus Indicus*). **Colloquium Agrariae**, v. 11, n.
560 especial, p. 81-87, 2015.
- 561 TAKAHASHI, L. S.; BILLER, J. D.; TAKAHASHI, K. M. **Bioclimatologia**
562 **Zootécnica**. Jaboticabal, 2009, 91 p.
- 563 TITTO, C. G.; TITTO, E. A. L.; VIEIRA, R. V.; GLASER, F. D.; TITTO, R. M.;
564 ABLAS, D. S.; PEREIRA, A. M. F.; LEME, T. M. C.; GATTO, E. G.; RAINERI, C.
565 Tolerância ao calor em bovinos de corte de raças europeias utilizadas em
566 cruzamentos industriais no Brasil. 2006. In: IV Congresso Brasileiro de
567 Biometeorologia: Ribeirão Preto, São Paulo. **Anais...**
- 568 THOM, E. C. Cooling degress: day air-conditioning, heating and ventilating.
569 **Transaction of the American Society of Heating, Refrigeratin and Air**
570 **Conditioning Engineers**, v. 55, p. 65-72, 1958.

571 TSIGOS, C.; CHROUSOS, G. P. Hypothalamic–pituitary–adrenal axis,
572 neuroendocrine factors and stress. **Journal of Psychosomatic Research**, v. 53,
573 p. 865-871, 2002.

574 ULRICH-LAI, Y. M.; HERMAN, J. P. Neural regulation of endocrine and
575 autonomic stress responses. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 10, p. 397 –
576 409, 2009.

577 VILELA, R. A. **Comportamento e termorregulação de vacas holandesas**
578 **lactantes frente a recursos de ventilação e nebulização em estabulação**
579 **livre**. 2008, 88 p. DISSERTAÇÃO (Mestrado em Zootecnia) – Faculdade de
580 Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo.

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604 **4 CAPÍTULO 2 – EFICIÊNCIA TERMORREGULATÓRIA E**
605 **PRECOCIDADE SEXUAL DE TOURINHOS SENEPOL EM AMBIENTE**
606 **TROPICAL** (Redigido conforme as normas da revista *International Journal of*
607 *Biometereology*)

608

609 **Resumo** – O objetivo foi verificar a associação entre estratégias fisiológicas de
610 regulação térmica e a precocidade sexual de tourinhos da raça Senepol. Utilizou-
611 se 51 tourinhos da raça Senepol, com idade e peso médios de 12 meses e 276,5
612 kg, mantidos em pastagem em Miranda-MS. Os animais foram submetidos à três
613 tentativas de coleta seminal no período de agosto de 2016 a março de 2017,
614 para análise do perfil andrológico e classificação quanto a precocidade. Em cada
615 coleta, também era realizada a biometria testicular completa e pesagem. Durante
616 a segunda coleta, foi realizado um Teste de Capacidade Termolítica, para cálculo
617 do Índice de Tolerância ao Calor (ITC), no qual registrou-se também variáveis
618 fisiológicas e termográficas. O ambiente foi monitorado durante o Teste para
619 determinação do Índice de Temperatura e Umidade (ITU). Procedeu-se uma
620 análise de regressão logística incluindo-se no modelo efeitos fixos
621 características zootécnicas, ITU, ITC e variáveis fisiológicas sobre as classes de
622 precocidade dos animais. Não houve diferença significativa entre as classes de
623 precocidade ($p>0,05$) para os parâmetros fisiológicos. A classe Superprecoce
624 obteve maior valor para ganho médio diário de peso. Observou-se uma
625 concordância de 58,3% e variação da probabilidade de Superprecocidade em
626 função da temperatura do dorso de 28,0% e em função da frequência cardíaca,
627 concordância de 53,8% e variação de 25,0%. Valores mais próximos do limiar
628 fisiológico normal indicam maior probabilidade de Superprecocidade. Tourinhos
629 da raça Senepol que utilizam os mecanismos termorregulatórios de maneira
630 mais eficiente, possuem maior probabilidade de serem Superprecoces,
631 viabilizando a utilização da termotolerância para seleção.

632

633 Palavras-chave: Estresse por calor, puberdade, reprodução, termografia por
634 infravermelho, termorregulação

635

636

637 **EFFICIENCY THERMOREGULATORY AND SEXUAL PRECOCITY OF**
638 **SENEPOL YOUNG BULLS IN TROPICAL ENVIRONMENT**

639

640 **Abstract** – The objective was to verify the association between physiological
641 strategies of thermal regulation and the sexual precocity of Senepol young bulls.
642 Fifty-one Senepol bulls were used, with mean age and weight of 12 months and
643 276.5 kg, kept in pasture in Miranda-MS. The animals were submitted to three
644 attempts of seminal collection from August 2016 to March 2017, for analysis of
645 the andrological profile and classification as to precocity. At each collection,
646 complete testicular biometry and weighing were also performed. During the
647 second collection, a Thermolytic Capacity Test was performed to calculate the
648 Heat Tolerance Index (HTI), in which physiological and thermographic variables
649 were also recorded. The environment was monitored during the Test to determine
650 the Temperature and Humidity Index (THI). A logistic regression analysis was
651 carried out, including in the model fixed effects zootechnical characteristics, THI,
652 HTI and physiological variables on the precocious classes of the animals. There
653 was no significant difference between the precocity classes ($p > 0.05$) for the
654 physiological parameters. The class Superprecoce obtained higher value for
655 average daily gain of weight. There was a concordance of 58.3% and variation of
656 the probability of Superprecocity as a function of the back temperature of 28.0%
657 and heart rate, agreement of 53.8% and variation of 25.0%. Values closer to the
658 normal physiological threshold indicate greater probability of Superprecocity.
659 Senepol breeders that use thermoregulatory mechanisms in a more efficient way,
660 are more likely to be Superprecoces, making possible the use of thermotolerance
661 for selection.

662

663 Key words: Heat stress, infrared thermography, puberty, reproduction,
664 thermoregulation

665

666

667

668

669

670

INTRODUÇÃO

671

672

673 A rentabilidade econômica de um sistema de produção é dependente da
674 capacidade produtiva e reprodutiva do rebanho. Por esse motivo, as
675 características que aumentam a eficiência reprodutiva, devem ser priorizadas
676 devido seu impacto direto na produtividade, principalmente ao se tratar de touros,
677 que possuem uma distribuição de material genético privilegiada pelo sistema
678 reprodutivo adotado pela maioria dos criadores (Costa e Silva et al. 2015).

679 Uma das características que pode favorecer o aumento do progresso
680 genético é a idade à puberdade, ela é um indicativo de precocidade sexual, que
681 permite identificar e utilizar animais mais precoces, reduzindo o intervalo entre
682 gerações, tornando assim, o manejo mais eficiente (Moraes 2012).

683 Sabe-se, porém, que a precocidade dos animais é influenciada por fatores
684 ligados à genética, nutrição e ao clima (Fields et al. 1982). No caso de touros
685 criados em ambiente tropical, o principal entrave é o estresse térmico oriundo da
686 influência de fatores microclimáticos típicos dessa região, que afetam de maneira
687 negativa o desenvolvimento sexual dos animais (Costa e Silva 2004).

688 Uma estratégia para mitigar o impacto do estresse por calor e preservar
689 os bons índices reprodutivos é realizar a seleção de animais mais precoces que
690 também sejam adaptados ao ambiente de criação (Costa Mello 2014). Isso pode
691 ser obtido, através da utilização de raças taurinas consideradas adaptadas ao
692 clima tropical, como a Raça Senepol (Silva et al. 2018).

693 O Brasil possui o maior rebanho Senepol do mundo, com cerca de 90 mil
694 exemplares registrados já nascidos em solo nacional. O principal motivo dessa
695 expansão, é a viabilização da criação de animais taurinos sob condições
696 ambientais consideradas fora de sua zona de conforto térmico, tornando possível
697 a obtenção de sistemas de produção eficientes nos trópicos (Pimenta, 2016;
698 Menezes et al., 2018).

699 Todavia, ainda se faz necessário identificar características que viabilizem
700 a seleção de indivíduos mais adaptados e com boa herdabilidade, para que
701 possam ser adotadas em Programas de Melhoramento Genético (Costa e Silva
702 et al. 2015).

703 Dessa forma foi realizado um estudo com o objetivo de verificar a
704 associação entre as estratégias fisiológicas de regulação térmica e a
705 precocidade sexual de tourinhos da raça Senepol.

706

707

MATERIAL E MÉTODOS

708

709 Caracterização da área de estudo

710

711 O experimento foi realizado em uma propriedade rural na região de
712 Miranda, Mato Grosso do Sul, Brasil (20° 05' 10" S e 56° 36' 75" W). O clima é
713 do tipo Aw (tropical quente e úmido), segundo classificação de Köppen (Kottek
714 et al. 2006), com temperatura média anual de 26°C e precipitação pluviométrica
715 de 1.182 mm³.

716

717 Animais experimentais e manejo

718

719 Foram utilizados 51 machos bovinos Senepol, com idade inicial média de
720 11 ± 0,3 meses de idade e 276, 5 ± 41,0 kg de peso vivo. Os animais foram
721 alocados em uma área de pastagem formada por *Brachiaria brizantha* cv.
722 Marandu, *Brachiaria decumbens* cv. Basilisk e *Panicum maximum* cv. Tanzânia
723 e mantidos sob as mesmas condições de manejo sanitário e nutricional, e
724 recebendo fornecimento de água e sal mineral *ad libitum*. Todos os
725 procedimentos realizados durante o experimento foram aprovados pela
726 Comissão de Ética para o Uso de Animais (CEUA), da Universidade Federal de
727 Mato Grosso do Sul, sob o protocolo número 649/2014.

735

Figura 1. Animal experimental da raça Senepol, no município de Miranda,
736 Mato Grosso do Sul. Fonte: GERA-MS.

737

738 Características zootécnicas

739

740 Os animais utilizados neste estudo estavam participando de uma Prova
741 de Avaliação de Desempenho da raça Senepol (PADS), realizada pela
742 Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos Senepol (ABCB SENEPOL) em
743 parceria ao Programa Geneplus Embrapa. A PADS é uma prova zootécnica, na
744 qual são avaliadas características relacionadas a crescimento, à eficiência
745 alimentar, à conformação e à fertilidade, para posterior utilização dessas
746 informações no Programa de Melhoramento Genético Senepol (PMGS)
747 (Menezes et al. 2017).

748 Dessa forma, os animais eram pesados mensalmente e por meio do
749 controle zootécnico obtivemos os dados de peso, para cálculo de peso inicial (Pi;
750 Kg), peso à puberdade (Pp; Kg) e ganho médio diário de peso (Pgmd; Kg).

751

752 Exame andrológico

753

754 Para a avaliação do perfil andrológico e classificação de puberdade, os
755 animais foram submetidos a três tentativas de coleta seminal nos meses de
756 agosto, janeiro e março. O método utilizado foi eletroejaculação com análise
757 quantitativa e qualitativa do ejaculado de acordo com a metodologia sugerida
758 pelo CBRA (2013).

759 A cada coleta, os tourinhos eram considerados púberes se atingissem
760 10% de motilidade espermática e 50 milhões de espermatozoides totais no
761 ejaculado. Sendo então classificados quanto a precocidade sexual em três
762 classes: Superprecoces até 13 meses, Precoces entre 13 e 15 meses, e Tardios
763 acima de 15 meses de idade.

764 A biometria testicular completa foi realizada, registrando-se o perímetro
765 escrotal (cm) com fita métrica e calculado o volume testicular (mm^3) (Bailey et al.
766 1998), considerando os formatos longos/ovais, a partir da largura e comprimento,
767 obtidos pelo paquímetro (Figura 2) (Bailey et al. 1996).

768

769

770

771

772

773

774

Figura 2. Biometria testicular realizada nos animais experimentais da raça Senepol, durante o exame andrológico no município de Miranda, Mato Grosso do Sul. Fonte: GERA-MS

775

776

777

778

779

Durante a tentativa de coleta seminal do mês de janeiro, (período que compreende o alto verão na região), os animais também foram submetidos a um Teste de Capacidade Termolítica, que consiste em avaliar a capacidade do animal em perder calor e recompor a temperatura corporal normal após o término de uma exposição solar.

780

781

782

Para a avaliação, foram formados dois lotes (sendo um lote com 21 e outro com 30 animais), devido a capacidade de suporte da área sombreada, totalizando dois dias de avaliação.

783

784

785

786

787

788

Os animais foram trazidos do pasto às 8:00 horas e mantidos à sombra, proporcionada por uma tela de polipropileno (tipo sombrite), com 70% de retenção de luz disposta sob uma parte do mangueiro. Nesta área sombreada os animais permaneciam por duas horas, para estabilização de seu metabolismo, sendo ao fim desse período tomada a primeira avaliação de temperatura retal (TR1).

789

790

791

792

Posteriormente os animais foram expostos a plena incidência solar, por uma hora e em seguida retornavam à sombra por mais duas horas, para ao término, ser obtida a segunda avaliação de temperatura retal (TR2).

793 **Figura 3.** Esquema de coleta de temperatura retal do Teste de Capacidade
 794 Termolítica, realizado nos animais da raça Senepol, no município de Miranda,
 795 Mato Grosso do Sul. Fonte: GERA – MS

796

797 A TR foi obtida com uso de um termômetro clínico digital (modelo Digi-
 798 temp, marca Kruuse) em contato com a mucosa retal do animal e mantido até
 799 que fosse emitido um sinal sonoro, indicando a estabilização da temperatura.

800 A diferença entre as temperaturas retais obtidas antes da exposição e
 801 após a exposição solar, aplicadas à equação, resulta no Índice de Tolerância ao
 802 Calor (ITC), que é expresso em uma escala de 0 a 10, considera-se mais
 803 adaptado ao ambiente, o animal que apresentar o valor de ITC mais próximo a
 804 10 (Baccari Junior 1986), sendo obtido pela seguinte equação:

805

$$806 \quad (ITC) = 10 - (TR2 - TR1)$$

807

808 Onde: TR1 corresponde a temperatura retal (TR; °C) antes da exposição
 809 solar; TR2 corresponde a TR após a exposição solar;

810

811 **Parâmetros fisiológicos**

812

813 Durante o Teste de Capacidade Termolítica, também foram aferidas as
 814 seguintes variáveis fisiológicas: frequência cardíaca (FC; batimentos/
 815 minuto) e temperatura superficial (TS; °C).
 816

817 A FC foi obtida por auscultação dos batimentos cardíacos, durante 15
818 segundos, utilizando um estetoscópio localizado em correspondência ao 4^o
819 intervalo intercostal no lado direito do animal, evitando que os processos
820 peristálticos do rúmen alterassem o procedimento. O valor obtido foi multiplicado
821 por quatro, totalizando-se 60 segundos e expressa em batimentos/minuto. A FR
822 foi realizada por observação direta dos movimentos do flanco durante 15
823 segundos, multiplicada por quatro, expressa em movimentos /minuto (Smith
824 1993).

825 A TS foi avaliada em três diferentes pontos, sendo eles: cabeça (TScab;
826 °C), dorso (TSdor; °C) e escroto (TSesc; °C), utilizando um pirômetro
827 (termômetro digital infravermelho com mira a laser, modelo 890 portátil, marca
828 Instrutherm) e uma câmera termográfica profissional Thermal Imager (Testo
829 880®), com resolução de 360 x 240 (número de pixels: 76.800), lente com 7.5
830 mm de comprimento focal (campo de visão 32°x 23°; f/0.84) com precisão de ±
831 0,1°C, intervalo de espectro infravermelho de 7 a 13 µm.

832 Na coleta da temperatura por meio da termografia, foi estabelecida a
833 distância entre a câmera de: 1,0 m para a cabeça e dorso e 0,5 m para o escroto.
834 As imagens obtidas foram analisadas pelo software da própria câmera (Testo
835 IRSoft Software), com a escala definida na opção de paleta frio/quente,
836 temperatura ajustada de acordo com a temperatura ambiente e índice de
837 emissividade de 0,98 (Figura 4) (Kunc et al. 2007; Lees 2016).

838 Foi considerada na avaliação da imagem da cabeça um traçado em
839 círculo para a obtenção da temperatura máxima, na região orbitária incluindo o
840 globo ocular, a pele ao redor da cavidade ocular e a glândula lacrimal. Esta
841 região foi definida devido a sensibilidade às variações de temperatura
842 associadas ao estresse térmico (Schaefer et al. 2007).

843 Para análise da imagem termográfica do dorso, foi utilizado um traçado
844 retangular na porção superior do flanco e obtido a temperatura máxima. A análise
845 da imagem da região escrotal foi realizada utilizando traçados retangulares para
846 obtenção da temperatura máxima, posicionados nas porções apical (TIVescA)
847 equatorial (TIVescE) e basal (TIVescB), compreendendo ambos os testículos e
848 calculado a média da temperatura máxima das três porções.

849

850

851 **Figura 4.** Análise das imagens termográficas obtidas nas regiões da cabeça,
 852 dorso e escroto, em tourinhos da raça Senepol, durante o Teste de
 853 Capacidade Termolítica, no município de Miranda, Mato Grosso do Sul. Fonte:
 854 GERA – MS.

855

856 Durante todo o período de avaliação, os animais não tiveram acesso a
 857 água e comida, de forma a evitar interferência na mensuração das variáveis
 858 fisiológicas.

859

860 Avaliações microclimáticas e Índice de Temperatura e Umidade

861

862 O microclima foi avaliado concomitantemente ao Teste de Capacidade
 863 Termolítica realizado no mês de janeiro. Foram obtidos os registros de
 864 temperatura de bulbo seco (°C), temperatura do ponto de orvalho (°C), umidade
 865 relativa do ar (%), com os equipamentos alocados a 1,5 m de altura da superfície
 866 do solo (Karvatte et al. 2016), utilizando o modelo de abrigo meteorológico
 867 proposto por Trumbo et al. (2012), com o uso de um termohigrômetro digital com
 868 data logger, programados para registro a cada dez minutos, inseridos em canos
 869 de PVC adaptados, a pleno sol e na sombra do curral de manejo dos animais.

870 Para caracterizar o ambiente térmico foram calculados, para cada período
 871 e horário de avaliação, o Índice de Temperatura e Umidade (ITU), de Thom
 872 (1958):

873

$$\text{ITU} = t + 0,36. \text{tpo} + 41,2$$

874

875 Onde: t corresponde a temperatura de bulbo seco (°C); tpo: temperatura
 876 do ponto de orvalho (°C);

877 O ambiente foi classificado segundo Hahn & Mader (1997), no qual
 878 valores de $\text{ITU} \leq 70$ são indicadores de um ambiente não estressante; entre 71

879 e 78 são críticos; de 79 a 83 a situação de perigo; e acima de 83, situação de
880 emergência.

881

882 Análise estatística

883

884 Foi realizada análise de regressão logística incluindo-se no modelo os
885 efeitos fixos características zootécnicas, índice de conforto térmico, variáveis
886 fisiológicas e ITC sobre as classes de precocidade dos animais. A correlação de
887 Pearson foi realizada para mensurar a associação da temperatura retal com as
888 temperaturas superficiais e termografia, utilizando o programa estatístico SAS,
889 versão 9.2 (2009). Para caracterização das características reprodutivas,
890 zootécnicas e fisiológicas entre as classes de precocidade foram calculadas por
891 média e desvio padrão e comparadas por teste de t de student, em nível de 5%
892 de significância, através do programa SAS 9.2 (2009).

893

894

RESULTADOS

895

896 *Variáveis ambientais*

897

898 A variação do ITU (ao sol e sombra) durante os dois dias do ITC, está
899 apresentado na figura 5. O menor valor de ITU registrado no primeiro dia, foi
900 encontrado às 8h00 (79 à sombra) e o maior às 16h00 (90 ao sol). No segundo
901 dia, o menor valor foi obtido às 8h00 (79 à sombra) e o maior entre às 15h00 e
902 17h00 (93 ao sol).

903

904 **Figura 5.** Índice de Temperatura e Umidade a sombra e ao sol, durante os dois
 905 dias do Teste de Capacidade Termolítica, realizado em bovinos machos da raça
 906 Senepol no município de Miranda, Mato Grosso do Sul, Brasil.

907

908 *Variáveis fisiológicas*

909

910 As médias de cada classe e a média geral para as variáveis fisiológicas
 911 e ITC estão apresentadas na Tabela 1.

912

913 Não houve influência das variáveis fisiológicas e do ITC obtidos sobre as
 914 classes de precocidade ($p > 0,05$). Apenas TSdor ($37,42 \pm 0,11$ °C), TIVdor ($39,33$
 915 $\pm 0,12$ °C) e FC ($98,90 \pm 2,83$ bat/min), apresentaram valores acima da
 916 normalidade para bovinos, sendo de até 35 °C para o pelame da região do dorso
 (Martello et al. 2004), e entre 60 a 80 batimentos/minuto para a FC.

917

918

919

920

921

922

923 **Tabela 1.** Índice de Tolerância ao Calor (ITC) e variáveis fisiológicas (média ±
 924 erro padrão), obtidos durante o Teste de Capacidade Termolítica, realizado no
 925 verão em machos bovinos Senepol.

	Classificação de Precocidade			
	<i>Superprecoce</i> (n=9)	<i>Precoce</i> (n=18)	<i>Tardio</i> (n=24)	<i>Geral</i> (n=51)
TIVcab	39,97 ± 0,15	40,14 ± 0,12	40,15 ± 0,09	40,11 ± 0,07
TIVdor	39,13 ± 0,24	39,20 ± 0,20	39,50 ± 0,17	39,33 ± 0,12
TIVescA	38,16 ± 0,20	38,25 ± 0,23	38,50 ± 0,13	38,35 ± 0,10
TIVescE	37,02 ± 0,20	36,99 ± 0,23	37,14 ± 0,11	37,07 ± 0,10
TIVescB	36,37 ± 0,23	36,44 ± 0,26	36,31 ± 0,14	36,36 ± 0,12
TIVescMd	37,18 ± 0,17	37,24 ± 0,22	37,32 ± 0,11	37,27 ± 0,09
TScab	37,49 ± 0,25	37,58 ± 0,14	37,66 ± 0,12	37,60 ± 0,08
TSdor	37,50 ± 0,22	37,21 ± 0,24	37,54 ± 0,14	37,42 ± 0,11
TSesc	35,05 ± 0,28	35,09 ± 0,25	35,24 ± 0,13	35,16 ± 0,11
FR	49,33 ± 3,77	51,76 ± 3,23	48,48 ± 1,87	49,73 ± 1,54
FC	91,11 ± 7,90	97,88 ± 5,11	102,40 ± 3,65	98,90 ± 2,83
TR	39,14 ± 0,09	39,29 ± 0,16	39,32 ± 0,08	39,24 ± 0,07
ITC	9,57 ± 0,13	9,89 ± 0,23	9,68 ± 0,12	9,73 ± 0,09

926 TIVcab= termografia da cabeça; TIVdor= termografia do dorso; TIVescA= termografia do escroto
 927 na porção apical; TIVescE= termografia do escroto na porção equatorial; TIVescB= termografia
 928 do escroto na porção basal; TIVescMd= termografia média das três porções do escroto; TScab=
 929 temperatura superficial da cabeça; TSdor= temperatura superficial do dorso; TSesc= temperatura
 930 superficial do escroto; FR= frequência respiratória (movimento/minuto); FC= frequência cardíaca
 931 (batimentos/minuto); e TR= temperatura retal; ITC= índice de temperatura e conforto térmico.

932

933 Foram observadas correlações altas com associação positiva entre
 934 TIVcab e a TR; TIV e TS da região do dorso. Para as porções do escroto, entre
 935 TIVescA e TIVescE; e TIVescE e TIVescB. As três porções avaliadas também
 936 apresentaram correlações positivas e altas com a TIVescMd. A TSesc obteve
 937 correlação alta e positiva com TIVescE e B, além de TIVescMd (Tabela 2).

938 As médias de cada classe de precocidade e a média geral para as
 939 características zootécnicas estão apresentadas na Tabela 3.

940 **Tabela 2.** Coeficiente de Correlação de Pearson (r) entre temperatura retal, temperaturas superficiais e
 941 obtidas por termografia em machos bovinos Senepol.

	Variáveis									
	TIVcab	TIVdor	TIVescA	TIVescE	TIVescB	TIVescMd	TScab	TSdor	TSesc	TR
TIVcab	1									
TIVdor	0,4489*	1								
TIVescA	0,2818*	0,1404	1							
TIVescE	0,5040*	0,2970*	0,7083*	1						
TIVescB	0,5548*	0,3309*	0,4198*	0,8008*	1					
TIVescMd	0,5165*	0,2890*	0,8088*	0,9527*	0,8548*	1				
TScab	0,2631	0,4920*	-0,1407	-0,0204	0,1711	0,0117	1			
TSdor	0,2915*	0,7328*	-0,0094	0,1885	0,3197*	0,1948	0,6066*	1		
TSesc	0,5412*	0,3724*	0,5550*	0,8782*	0,7858*	0,8472*	0,1081	0,2889*	1	
TR	0,7235*	0,3666*	0,3354*	0,4341*	0,4340*	0,4603	0,1584	0,3085*	0,4939*	1

942 *Nível de significância $p < 0,05$. TIVcab= termografia da cabeça em °C; TIVdor= termografia do dorso em °C; TIVescA= termografia do escroto na
 943 porção apical em °C; TIVescE= termografia do escroto na porção equatorial em °C; TIVescB= termografia do escroto na porção basal em °C;
 944 TIVescMd= termografia média das três porções do escroto em °C; TScab= temperatura superficial da cabeça em °C; TSdor= temperatura
 945 superficial do dorso em °C; TSesc= temperatura superficial do escroto em °C; TR= temperatura retal em °C.

946 Em relação às características zootécnicas, foram observadas diferenças
 947 significativas ($p < 0,05$) entre as classificações por precocidade em decorrência
 948 de: peso a puberdade (Pp; Kg), ganho médio diário de peso (Pgmd; Kg) e
 949 perímetro escrotal a puberdade (PEp; cm).

950 A classe Superprecoce apresentou maior Pgmd ($0,621 \pm 0,03$ Kg), não
 951 diferindo estatisticamente da classe Precoce, para esta variável ($0,601 \pm 0,02$),
 952 a qual também apresentou maior Pp ($408,71 \pm 7,80$ Kg) e Pep ($32,89 \pm 0,49$ cm).
 953 A classe Tardio, diferiu estatisticamente da Superprecoce apenas para Pgmd
 954 ($0,525 \pm 0,03$ Kg), entretanto em relação a classe Precoce, ela foi diferente tanto
 955 para Pp, quanto para PEp.

956

957 **Tabela 3.** Características zootécnicas (média $\pm$ erro padrão) de acordo com a
 958 classificação quanto à precocidade de tourinhos da raça Senepol, obtidos em
 959 três coletas realizadas em machos bovinos Senepol.

	Classificação de Precocidade			
	<i>Superprecoce</i> (n=9)	<i>Precoce</i> (n=18)	<i>Tardio</i> (n=24)	<i>Geral</i> (n=51)
IP	349,56 $\pm$ 4,71 ^c	421,53 $\pm$ 3,53 ^b	521,00 $\pm$ 6,70 ^a	449,13 $\pm$ 10,55
IPm	11,65 $\pm$ 0,16 ^c	14,05 $\pm$ 0,12 ^b	17,37 $\pm$ 0,22 ^a	14,97 $\pm$ 0,35
Pi	269,22 $\pm$ 15,22 ^a	292,47 $\pm$ 7,62 ^a	268,28 $\pm$ 8,67 ^a	276,50 $\pm$ 5,74
Pp	375,33 $\pm$ 14,86 ^b	408,71 $\pm$ 7,80 ^a	379,16 $\pm$ 9,33 ^b	389,55 $\pm$ 6,04
Pgmd	0,621 $\pm$ 0,03 ^a	0,601 $\pm$ 0,02 ^{ab}	0,525 $\pm$ 0,03 ^b	0,567 $\pm$ 0,01
PEi	25,40 $\pm$ 1,04 ^a	26,41 $\pm$ 0,56 ^a	24,68 $\pm$ 0,63 ^a	25,38 $\pm$ 0,40
PEp	29,67 $\pm$ 0,85 ^b	32,89 $\pm$ 0,49 ^a	30,96 $\pm$ 0,59 ^b	31,43 $\pm$ 0,39
PEgmd	0,036 $\pm$ 0,003 ^a	0,036 $\pm$ 0,002 ^a	0,031 $\pm$ 0,002 ^a	0,033 $\pm$ 0,001

960 *Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem estatisticamente a um nível de 5%, pelo
 961 teste de t. IP= idade a puberdade em dias; IPm= idade a puberdade em meses; Pi =peso inicial
 962 em Kg; Pp= peso a puberdade em Kg; Pgmd= ganho médio diário de peso em Kg; PEi= perímetro
 963 escrotal inicial em cm; PEp= perímetro escrotal a puberdade em cm; e PEGmd= ganho médio
 964 diário em cm de perímetro escrotal.

965

966 A análise de regressão logística mostrou que as variáveis que
 967 apresentaram maior concordância com o modelo foram: TIVdor (58,3%) (Figura
 968 3); FC (53,8%) (Figura 4); PEp (49,5%) e TSesc (48,4%). O modelo apresentou
 969 96,6% de concordância da equação com os dados observados, ou seja, o
 970 modelo estimado possui boa aderência.

971

972

Figura 6. Probabilidade de Superprecocidade em função da termografia do dorso (°C) de bovinos machos Senepol em Miranda-MS.

973

974

975

976

Figura 7. Probabilidade de Superprecocidade em função da frequência cardíaca (batimento/minuto) de bovinos machos Senepol em Miranda-MS.

977

978

979

DISCUSSÃO

980

981

Ambiente

982

983

984

Ambientes com ITU <70 são considerados termicamente confortáveis, sem prejuízo da homeostase (Martello et al. 2004). Entretanto, de acordo com os valores de ITU encontrados em ambos os dias do Teste de Capacidade

985

986 Termolítica, os animais estavam submetidos a condição de estresse térmico por
987 calor considerado de perigo (79 a 83) à emergência (>83) (Baêta e Souza 2010),
988 sendo necessária a ativação de mecanismos termorreguladores.

989

990 *Variáveis fisiológicas*

991

992 Os valores obtidos para TSdor ($37,42 \pm 0,11$ °C), TIVdor ($39,33 \pm 0,12$ °C)
993 e FC ($98,90 \pm 2,83$ bat/min), indicavam necessidade de ativação dos
994 mecanismos de termólise (Collier et al. 2006; Feitosa et al. 2008).

995 A FC é o primeiro mecanismo acionado para dissipação do calor, seguido
996 da sudorese, que embora não tenha sido avaliada neste estudo, sabe-se que os
997 animais da raça Senepol possuem 96% das glândulas sudoríparas do tipo
998 saculiforme, o que os torna eficientes na evaporação cutânea (McManus et al.
999 2009; Takahashi et al. 2009; Pila 2011).

1000 Visto que a FR é o terceiro mecanismo utilizado pelos bovinos para evitar
1001 o estresse térmico e nesse trabalho não apresentou valores elevados ($49,73 \pm$
1002 $1,54$ mov/min), acima do considerado normal de até 60 movimentos por minuto
1003 (Perissinoto et al. 2009), pode se inferir que apenas com as duas primeiras
1004 estratégias de termorregulação (FC e sudorese), os animais conseguiram
1005 manter sua homeostase. Resultados semelhantes foram encontrados por
1006 Pimenta (2016) ao avaliar parâmetros fisiológicos e ITC de novilhos Senepol.

1007 A TR obtida neste estudo ($39,24 \pm 0,07$ °C) reitera essa afirmativa,
1008 sobretudo por ser o principal indicativo de adaptabilidade fisiológica a ambientes
1009 quentes, na qual quando acima da normalidade ($39,3$ °C) aponta perda da
1010 eficácia dos demais mecanismos de termólise (Mota 1997), ou seja, a TR
1011 evidência que os animais não estavam em estresse térmico.

1012 Na interpretação do ITC, quanto mais próximo a 10, mais adaptado o
1013 animal está ao ambiente (Baccari Junior 1986), portanto a média das classes
1014 ($9,73 \pm 0,09$) indica que esses animais estavam bem adaptados à condição
1015 ambiental avaliada, corroborando com os resultados encontrados de TR,
1016 principalmente pelos valores de ITU acima dos ideais ao qual os animais
1017 estavam submetidos.

1018 Os dados de termografia obtidos das diferentes regiões do escroto
1019 (TIVescA; TIVescE; TIVescB e TIVescMd) e de temperatura superficial (TSesc)

1020 também sugerem uma eficiência na termorregulação escrotal, uma vez que
1021 existe um perfil decrescente de temperatura, variando cerca de 2°C e 2 a 6°C
1022 abaixo da temperatura corpórea, respectivamente (Garcia 2004; Kastellic 2014;
1023 Romanello et al. 2018). As correlações observadas entre a TIVesc e TSesc,
1024 sugerem que avaliação dessa região pode ser realizada por meio do pirômetro
1025 de mira a laser, sendo este mais viável economicamente.

1026 A TIVcab apresentou correlação alta e positiva com a TR, isso é devido a
1027 região do globo ocular apresentar maior sensibilidade as variações de
1028 termorregulação (Schaefer et al. 2007), como observado em um estudo com
1029 bubalinos mantidos sob clima tropical, no qual observou que a mesma variava
1030 de acordo com a TR (Silva et al. 2017), semelhante aos resultados encontrados
1031 nesse estudo.

1032 Diferenças na IP são encontradas quando comparamos animais zebuínos
1033 e taurinos (Fields et al. 1982). Fatores ligados a genética, a nutrição e ao clima
1034 podem influenciar a precocidade dos animais. Animais zebuínos são mais tardios
1035 que taurinos criados sob clima tropical e estes mais tardios que taurinos sob
1036 clima temperado (Costa Mello 2014). Neste estudo, os animais apresentaram
1037 IPm médio aos 14,9 meses e Pp de 389,5 Kg, valores semelhantes aos
1038 encontrados na mesma região de Miranda-MS com tourinhos Senepol, por Silva
1039 et al. (2018).

1040 O valor médio de PEp ($31,43 \pm 0,39$ cm) deste estudo, se encontra próximo
1041 ao observado por outros autores ao avaliar puberdade em touros Senepol
1042 (Wildeus 1993; Faria et al. 2017; Silva et al. 2018). Os animais Superprecoces e
1043 Tardios não apresentaram diferenças significativas ($p > 0,05$) quanto a Pp e PEp,
1044 possivelmente devido ao baixo desenvolvimento corporal dos animais Tardios, o
1045 que também pode ser observado pelos valores de Pgm, que diferiram entre as
1046 classes, na qual a classe Tardio, obteve os menores ganhos ($0,525 \pm 0,03$ Kg).

1047 Correlações altas e favoráveis são observadas entre PE e peso corporal,
1048 características estas que por sua vez são fatores que influenciam a IP (Siqueira
1049 et al. 2013). Os animais Superprecoces apresentaram maior Pgm ($0,621 \pm 0,03$
1050 Kg), isso pode ser um reflexo de uma resposta mais eficiente à ação do calor
1051 sobre o seu metabolismo, na qual a demanda de energia utilizada para manter
1052 a homeostase é menor, permitindo maior enfoque na produção.

1053 A análise de regressão logística demonstrou que três das variáveis
1054 analisadas (TIVdor; FC e TSesc) que contribuíram com maior intensidade para
1055 a probabilidade de Superprecocidade, são variáveis fisiológicas e estão
1056 diretamente ligadas a termorregulação dos bovinos. Embora não tenham sido
1057 encontradas diferenças significativas pelo teste de t de student ($p>0,05$) entre as
1058 classes para essas variáveis, observa-se que a classe Superprecoce apresentou
1059 os menores valores para todas.

1060 Houve uma variação de aproximadamente 28% da probabilidade de
1061 Superprecocidade em função da TIVdor, na qual quanto mais próxima a
1062 temperatura se encontrava da zona de normalidade, maior a chance dos animais
1063 serem Superprecoces. A análise da Superprecocidade em função da FC
1064 demonstrou um padrão semelhante com cerca de 25% de variação.

1065 Os dados obtidos pela análise de regressão logística ratificam a
1066 importância dos mecanismos termorregulatórios, como a FC para o metabolismo
1067 dos tourinhos Senepol.

1068 Bovinos menos adaptados ao clima tropical ficam sujeitos as ações do
1069 estresse térmico sobre seu organismo (Silva & Maia 2013). Uma das
1070 consequências diretas do estresse é a elevação dos níveis de cortisol,
1071 ocasionando redução da liberação de LH e FSH e conseqüentemente na
1072 produção de testosterona (Maffei 2009; Costa Mello et al. 2016), a qual participa
1073 diretamente do desenvolvimento corpóreo e sexual, interferindo na precocidade
1074 (Silva et al. 1993).

1075 Embora a raça Senepol seja adaptada aos trópicos, é possível realizar
1076 seleção, devido aos diferentes níveis de adaptabilidade possivelmente oriundos
1077 de diferentes linhagens. No entanto, ainda é necessário a validação de técnicas
1078 confiáveis que abordem a tolerância ao calor. O ITC é uma ferramenta para a
1079 identificação de animais mais tolerantes, entretanto, depende muito tempo de
1080 manejo e depende diretamente das condições ambientais, o que inviabiliza sua
1081 massificação ou inclusão em programas de melhoramento genético.

1082 Tourinhos da raça Senepol que utilizaram de maneira mais eficiente os
1083 mecanismos termorregulatórios de dissipação de calor, ou seja, são mais
1084 adaptados ao clima dos trópicos, possuíam maior probabilidade de
1085 apresentarem Superprecocidade. A característica de termotolerância deve
1086 receber atenção para seleção em ambiente tropical, devido sua influência sob

1087 características de interesse econômico, como idade à puberdade, que afetam
1088 diretamente a rentabilidade do rebanho.

1089

1090

CONCLUSÃO

1091

1092 Estratégias fisiológicas de regulação térmica apresentaram associação
1093 com a precocidade sexual de tourinhos da raça Senepol. Os animais avaliados
1094 neste trabalho apresentaram boa adaptação ao clima tropical. Medidas como
1095 temperatura do dorso por termografia por infravermelho, frequência cardíaca e
1096 temperatura de superfície escrotal podem auxiliar a seleção de animais mais
1097 precoces.

1098

1099

REFERÊNCIAS

1100

1101 ABCB - Associação brasileira dos criadores de bovinos senepol.
1102 <http://www.senepol.org.br>. Acessado em 11 de janeiro de 2019

1103 Baccari Júnior F, Polastre R, Fré CA, Assis PS (1986) Um novo índice de
1104 tolerância ao calor para bubalinos: correlação com o ganho de peso. In: Reunião
1105 Anual Da Sociedade Brasileira De Zootecnia, Campo Grande, MS. Anais...

1106 Baêta FC, Souza CF (2010) Ambiência em edificações rurais: Conforto animal.
1107 EDUFV, Viçosa

1108 Bailey TL, Monke D, Hudson RS, Wolfe DF, Carson RL, Riddell MG (1996)
1109 Testicular shape and its relationship to sperm production in mature Holstein bulls.
1110 *Theriogenology*, 46:881-887 doi:10.1016/s0093-691x(96)00245-2

1111 Bailey TL, Hudson TS, Powe TA (1998) Caliper and Ultrasonographic
1112 measurements of bovines' testicles and mathematical formula for determining
1113 testicular volume and weight in vivo. *Theriogenology*, 49:581-594
1114 doi:10.1016/s0093-691x(98)00009-0

1115 CBRA - Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (2013) Manual para exame
1116 andrológico e avaliação do sêmen animal, Belo Horizonte

- 1117 Collier RJ, Dahl GE, VanBaale MJ (2006) Major advances associated with
1118 environmental effects on dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 89:1244-
1119 1253 doi:10.3168/jds.s0022-0302(06)72193-2
- 1120 Costa e Silva EV (2004) Estresse e Manejo reprodutivo de bovinos de corte:
1121 problemas e soluções. IV Simpósio de produção de gado de corte, Viçosa, 459-
1122 484
- 1123 Costa e Silva EV, Costa Filho LCC, Souza CC, Oliveira CC, Queiroz VLD, Zuccari
1124 CESN (2015) Seleção de touros para reprodução a campo: novas perspectivas.
1125 *Revista Brasileira de Reprodução Animal*, 39:22-31
- 1126 Costa Mello RR (2014) Puberdade e maturidade sexual em touros bovinos.
1127 *ACSA – Agropecuária Científica no Semi-árido*, 10:11-28 doi 10.30969/acsa.v10
1128 i3.571
- 1129 Costa Mello RR, Ferreira JE, Mello MRB, Palhano HB (2016) Influência do
1130 manejo na fisiologia reprodutiva do macho bovino. *Arquivos de Ciências
1131 Veterinárias e Zoologia da UNIPAR*, 19:57 – 63 doi:10.25110/arqvet.v19i1.2016.
1132 5792
- 1133 Faria ACF, Assumpção TI, Silva NAM, Santos RM (2017) Avaliação do perímetro
1134 escrotal e características seminais de touros Senepol, de acordo com a idade.
1135 *Ciência Animal*, 27:3–14
- 1136 Feitosa FLF (2008) *Semiologia Veterinária: a arte do diagnóstico*. Roca, São
1137 Paulo
- 1138 Fields MJ, Fhentges JR, Corneliss KW (1982) Aspect of the sexual development
1139 of Brahman versus Angus bulls in Florida. *Theriogenology*, 18:17–31 doi:
1140 10.1016/0093-691X(82)90045-0
- 1141 Garcia AR (2004) Efeitos do estresse térmico testicular e do uso da
1142 somatotropina recombinante bovina nas características seminais, integridade de
1143 membranas, função mitocondrial e estrutura da cromatina de espermatozoides
1144 de touros Simental (*Bos taurus taurus*). Tese, Universidade de São Paulo

- 1145 Hahn GL, Mader TL (1997) Heat waves in relation to thermoregulation, feeding
1146 behavior and mortality of feedlot cattle. In: Proceedings of 5th International
1147 Livestock Environment Symposium, Vol I. ASAE SP01-97. ASAE, Minneapolis,
1148 Minn., pp 563–571
- 1149 Hahn GL, Parkhurst AM, Gaughan JB (1997) Cattle respiration rate as a function
1150 of ambient temperature. Transactions of American Society of Agricultural
1151 Engineering, 40:97-121
- 1152 Karvate Jr N, Klosowski ES, Almeida RG, Mesquita EE, Oliveira CC, Alves FV
1153 (2016) Shading effect on microclimate and thermal comfort indexes in integrated
1154 crop-livestock-forest systems in the Brazilian Midwest. International Journal of
1155 Biometeorology, 60:1-9
- 1156 Kastelic JP (2014) Understanding and evaluating bovine
1157 testes, Theriogenology, 81:18-23 doi:10.1016/j.theriogenology.2013.09.001
- 1158 Kottek M, Grieser J, Beck C, Rudolf B, Rubel F (2006) World map of the Köppen-
1159 Geiger climate classification updated. Meteorologische Zeitschrift, 15:259–263
1160 doi:10.1127/0941-2948/2006/0130
- 1161 Kunc P, Knížková I, Prikryl M, Maloun J (2007) Infrared thermography as a tool
1162 to study the milking process: a review. Agricultura Tropica et Subtropica, 40:29-
1163 32
- 1164 Lees AM (2016) Biological Responses of Feedlot Cattle to Heat Load. 259 f.
1165 Tese, School of Agriculture and Food Sciences, University of Queensland
- 1166 Maffei WE (2009) Reatividade animal. Revista Brasileira de Zootecnia, 38:81–92
1167 doi:10.1590/S1516-35982009001300010
- 1168 Martello LS, Júnior HS, Silva SL, Titto EAL (2004) Respostas fisiológicas e
1169 produtivas de vacas holandesas em lactação submetidas a diferentes ambientes.
1170 Revista Brasileira de Zootecnia, 33:181-191 doi:10.1590/S1516-
1171 35982004000100022

- 1172 McMannus C, Prescott E, Paludo GR, Bianchini E, Louvandini H, Mariante AS
1173 (2009) Heat tolerance in naturalized Brazilian cattle breeds. *Livestock Science*,
1174 120:256-264 doi:10.1016/j.livsci.2008.07.014
- 1175 Menezes GRO (2017) Sumário de touros Senepol GENEPLUS | EMBRAPA,
1176 Uberlândia
- 1177 Menezes C (2018) Sumário de touros Senepol GENEPLUS | EMBRAPA,
1178 Uberlândia
- 1179 Moraes GP (2012) Puberdade e maturidade sexual de tourinhos Senepol,
1180 criados semi-extensivamente na região do Triângulo Mineiro – MG. 56 f.
1181 Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) – Universidade Federal de
1182 Minas Gerais
- 1183 Mota LS (1997) Adaptação e interação genótipo-ambiente em vacas leiteiras. 69
1184 f. Tese (Doutorado em Ciências), Universidade de São Paulo
- 1185 Perissinotto M, Moura DJ, Cruz VF, Souza SRL, Lima KAO, Mendes AS (2009)
1186 Conforto térmico de bovinos leiteiros confinados em clima subtropical e
1187 mediterrâneo pela análise de parâmetros fisiológicos utilizando a teoria dos
1188 conjuntos fuzzy. *Ciência Rural*, 39:1492-1498 doi:10.1590/S0103-
1189 84782009005000094
- 1190 Pila JC (2011) Avaliação da adaptabilidade de novilhas da raça Senepol ao calor
1191 pela análise de suas respostas fisiológicas e características das glândulas
1192 sudoríparas. 32 f. Dissertação, UNESP
- 1193 Pimenta OS (2016) Parâmetros fisiológicos e índice de tolerância ao calor em
1194 novilhos Senepol. 60 f. Dissertação, Universidade Federal de Goiás
- 1195 Romanello N, de Brito Lourenço Junior J, Barioni Junior W, Brandão FZ,
1196 Marcondes CR, Pezzopane JRM, de Andrade Pantoja MH, Botta D, Giro A,
1197 Moura ABB, do Nascimento Barreto A, Garcia AR (2018) Thermoregulatory
1198 responses and reproductive traits in composite beef bulls raised in a tropical
1199 climate. *International Journal of Biometeorology*, 62:1575-1586 doi:
1200 10.1007/s00484-018-1557-8

- 1201 Schaefer AL, Cook NJ, Church JS, Basarab J, Perry B, Miller C, Tong AKW
1202 (2007) The use of infrared thermography as a nearly indicator of bovine
1203 respiratory disease complex in calves. *Research in Veterinary Science*, 83:376–
1204 384 doi:10.1016/j.rvsc.2007.01.008
- 1205 Silva AEDF, Dode MAN, Unanian MM (1993) Capacidade reprodutiva do touro
1206 de corte: funções, anormalidades e fatores que a influenciam. EMBRAPA-
1207 CNPCG, Campo Grande
- 1208 Silva LKX, Sousa JS, Silva AOA, Lourenço Júnior JB, Faturi C, Martorano LG,
1209 Franco IM, Pantoja MHA, Barros DV, Garcia AR (2017) Testicular
1210 thermoregulation, scrotal surface temperature patterns and semen quality of
1211 water buffalo bulls reared in a tropical climate, *Andrologia*, 50(2):1-10 doi:
1212 10.1111/and.12836
- 1213 Silva AL, Sato GYP, Bordin RA, Reis HMG (2018) A raça Senepol como opção
1214 para o melhoramento genético em adaptabilidade ao clima tropical, *Tekhné e*
1215 *Logos*, 50:16–30
- 1216 Silva MMD, Buss CE, Faria FJC, Costa DS (2018) Puberdade e maturidade
1217 sexual em touros Senepol. In: 55ª Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia,
1218 Goiânia
- 1219 Silva RG, Campos Maia AS (2013) *Principles of Animal Biometeorology*.
1220 Springer, New York
- 1221 Siqueira JB, Guimarães JD, Pinho RO (2013) Relação entre perímetro escrotal
1222 e características produtivas e reprodutivas em bovinos de corte: uma revisão.
1223 *Revista Brasileira de Reprodução Animal*, 37:3–13
- 1224 Smith BP (1993) *Tratado de medicina veterinária interna de grandes animais:*
1225 *moléstias de equinos, bovinos, avinos e caprinos*. Manole, São Paulo
- 1226 Takahashi LS, Biller JD, Takahashi KM (2009) *Bioclimatologia Zootécnica*.
1227 Jaboticabal, 91 p

- 1228 Trumbo BA, Wise LM, Hudy M (2012) Influence of protective shielding devices
1229 on recorded air temperature accuracy for a rugged outdoor thermal sensor used
1230 in climate change modeling. *National Environment Science*, 3(1):42-50
- 1231 Thom EC (1958) Cooling degress: day air-conditioning, heating and ventilating.
1232 *Transaction of the American Society of Heating, Refrigeratin and Air Conditioning*
1233 *Engineers*, 55:65-72
- 1234 Wildeus S (1993) Age-related changes in scrotal circumference, testis size and
1235 sperm reserves in bulls of the tropically adapted Senepol breed. *Animal*
1236 *Reproductive Science*, 32(3-4):185–195 doi:10.1016/0378-4320(93)90090-E

1237 ANEXO I

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA/UFMS

C E R T I F I C A D O

Certificamos que o Protocolo nº 649/2014 da Pesquisadora **Eliane Vianna da Costa e Silva**, referente ao projeto de pesquisa "Aspectos Biológicos, Produtivos e Reprodutivos de Termotolerância em Diferentes Grupamentos Genéticos Bovinos", está de acordo com os princípios éticos adotados pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), com a legislação vigente e demais disposições da ética em investigação que envolvem diretamente os animais e foi aprovado pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS/CEUA/UFMS, em reunião ordinária do dia 15 de dezembro de 2014.

Mária Araújo Teixeira
Coordenadora da CEUA/UFMS

Campo Grande, 15 de dezembro de 2014.

Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA
<http://www.propp.ufms.br/ceua>
ceua.2000@gmail.com
fone (67) 3345-7186

1238

1239

1240

1241 ANEXO II

1242

1243 **INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY**

1244

1245 **FOLHA DE ROSTO**

1246 A página de título deve incluir:

- 1247 • O nome do(s) autor(es)
- 1248 • Um título conciso e informativo
- 1249 • A(s) afiliação(ões) do(s) autor(es)
- 1250 • O endereço de e-mail e o(s) número(s) de telefone do autor
- 1251 correspondente

1252 **Resumo**

1253 Por favor, forneça um resumo de 150 a 250 palavras. O resumo não deve conter
1254 abreviações indefinidas ou referências não especificadas.

1255 **Palavras-chave**

1256 Por favor, forneça 4 a 6 palavras-chave que podem ser usadas para fins de
1257 indexação.

1258 **TEXTO**

1259 **Formatação de texto**

- 1260 • Os manuscritos devem ser enviados no Word.
- 1261 • Use uma fonte normal e simples (por exemplo, Times Roman de 10
- 1262 pontos ou Arial de 12 pontos) para o texto.
- 1263 • Use itálico para ênfase.
- 1264 • Use a função de numeração automática de páginas para numerar as
- 1265 páginas.
- 1266 • Use paradas de tabulação ou outros comandos para recuos, não a barra
- 1267 de espaço.
- 1268 • Use a função de tabela, não planilhas, para criar tabelas.
- 1269 • Salve seu arquivo no formato docx (Word 2007 ou superior) ou no formato
- 1270 doc (versões mais antigas do Word).

1271

1272 Cabeçalhos

1273 Por favor, não use mais do que três níveis de títulos exibidos.

1274 Abreviaturas

1275 Abreviaturas devem ser definidas na primeira menção e usadas
1276 consistentemente a partir de então.

1277 Notas de rodapé

1278 Notas de rodapé podem ser usadas para fornecer informações adicionais, que
1279 podem incluir a citação de uma referência incluída na lista de referências. Eles
1280 não devem consistir apenas em uma citação de referência e nunca devem incluir
1281 os detalhes bibliográficos de uma referência. Eles também não devem conter
1282 figuras ou tabelas.

1283 Notas de rodapé para o texto são numeradas consecutivamente; aqueles para
1284 tabelas devem ser indicados por letras minúsculas sobrescritas (ou asteriscos
1285 para valores de significância e outros dados estatísticos). Notas de rodapé para
1286 o título ou os autores do artigo não recebem símbolos de referência.

1287 Sempre use notas de rodapé em vez de notas de fim.

1288 Agradecimentos

1289 Agradecimentos de pessoas, subsídios, fundos, etc. devem ser colocados em
1290 uma seção separada na página de título. Os nomes das organizações de
1291 financiamento devem ser escritos por extenso.

1292 Anotações importantes:

1293 As linhas devem ser numeradas

1294 Corpo do texto deve ser de 1,5 ou duplo espaçamento

1295 ESTRUTURA**1296 Introdução**

1297 A introdução deve indicar o objetivo da investigação e fornecer uma breve e
1298 sucinta revisão da literatura pertinente.

1299 Materiais e métodos

1300 Esta seção deve seguir a Introdução e fornecer informações suficientes para
1301 permitir a repetição do trabalho experimental.

1302 Resultados

1303 Esta seção deve descrever o resultado do estudo. Os dados devem ser
1304 apresentados da forma mais concisa possível, se apropriado na forma de tabelas
1305 ou figuras, embora tabelas muito grandes devam ser evitadas.

1306 Discussão

1307 A discussão deve ser uma interpretação dos resultados e sua significância com
1308 referência ao trabalho de outros autores.

1309 Conclusões (opcional)

1310 Os autores podem fornecer um breve resumo dos resultados e suas implicações
1311 e instruções para pesquisas futuras.

1312 Agradecimentos (opcional)

1313 Estes devem ser tão breves quanto possível. Qualquer concessão que requeira
1314 reconhecimento deve ser mencionada. Os nomes das organizações de
1315 financiamento devem ser escritos por extenso.

1316 Referências

1317 Estes devem incluir apenas fontes que foram citadas diretamente no manuscrito,
1318 e devem ser listadas em ordem alfabética pelo último sobrenome (sobrenome)
1319 do primeiro autor. Estes não devem ser numerados. Por favor, veja instruções
1320 específicas sobre formatação abaixo.

1321 Citação

1322 Cite referências no texto por nome e ano entre parênteses. Alguns exemplos:

1323 A pesquisa de negociação abrange muitas disciplinas (Thompson, 1990).

1324 Este resultado foi posteriormente contradito por Becker e Seligman (1996).

1325 Este efeito tem sido amplamente estudado (Abbott 1991; Barakat et al. 1995a,
1326 b; Kelso e Smith 1998; Medvec et al. 1999, 2000).

1327 Lista de referência

1328 A lista de referências deve incluir apenas trabalhos que são citados no texto e
1329 que foram publicados ou aceitos para publicação. Comunicações pessoais e
1330 obras inéditas só devem ser mencionadas no texto. Não use notas de rodapé ou
1331 notas de fim como substituto de uma lista de referências.

1332 As entradas da lista de referências devem ser alfabetizadas pelos sobrenomes
1333 do primeiro autor de cada trabalho. Encomende publicações multi-autor do
1334 mesmo primeiro autor alfabeticamente em relação ao segundo, terceiro, etc.
1335 autor. Publicações de exatamente o (s) mesmo (s) autor (es) devem ser
1336 ordenadas cronologicamente.

1337 Artigo de jornal

1338 Gamelin FX, Baquet G, Berthoin S, Thevenet D, Nourry C, Nottin S, Bosquet L.
1339 (2009) Efeito do treinamento intermitente de alta intensidade na variabilidade da

1340 frequência cardíaca em crianças pré-púberes. Eur J Appl Physiol 105: 731-738.
1341 <https://doi.org/10.1007/s00421-008-0955-8>

1342 Idealmente, os nomes de todos os autores devem ser fornecidos, mas o uso de
1343 “et al” em longas listas de autores também será aceito:

1344 Smith J, Jr Jones M, Houghton L et al (1999) Futuro do seguro de saúde. N Engl
1345 J Med 965: 325-329

1346 **Artigo por DOI**

1347 Slifka MK, Whitton JL (2000) Implicações clínicas da produção desregulada de
1348 citocinas. J Mol Med. <https://doi.org/10.1007/s001090000086>

1349 **Livro**

1350 South J, Blass B (2001) O futuro da genômica moderna. Blackwell, Londres

1351 **Capítulo de livro**

1352 Brown B, Aaron M (2001) A política da natureza. In: Smith J (ed) O surgimento
1353 da moderna genômica, 3rd edn. Wiley, Nova York, pp 230-257

1354 **Documento on-line**

1355 Cartwright J (2007) Grandes estrelas têm tempo também. IOP Publishing
1356 PhysicsWeb. <http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1>. Acessado em 26 de
1357 junho de 2007

1358 **Dissertação**

1359 Trent JW (1975) Insuficiência renal aguda experimental. Dissertação,
1360 Universidade da Califórnia

1361 Sempre use a abreviação padrão do nome de um periódico de acordo com a lista
1362 de abreviações de palavras de título do ISSN, consulte

1363 **TABELAS**

1364 Todas as tabelas devem ser numeradas usando algarismos arábicos.

1365 As tabelas devem sempre ser citadas em texto em ordem numérica consecutiva.

1366 Para cada tabela, forneça uma legenda da tabela (título) explicando os
1367 componentes da tabela.

1368 Identifique qualquer material publicado anteriormente, fornecendo a fonte
1369 original na forma de uma referência no final da legenda da tabela.

1370 As notas de rodapé das tabelas devem ser indicadas por letras minúsculas
1371 sobrescritas (ou asteriscos para valores de significância e outros dados
1372 estatísticos) e incluídas abaixo do corpo da tabela.

1373

1374 ANEXO III

1375

1376

1377 Figura 1 – Coleta seminal. Fonte GERA – MS.

1378

1379

1380 Figura 2 – Área sombreada utilizada durante o Teste de Capacidade Termolítica.

1381 Fonte: GERA – MS.

1382

1383 Figura 3 – Área de exposição ao sol utilizada durante o Teste de Capacidade
1384 Termolítica. Fonte: GERA – MS.

1385

1386

1387 Figura 5 – Coleta das imagens termográficas Fonte: GERA – MS.

1388

1389

1390 Figura 6 – Abrigo meteorológico posicionado à sombra. Fonte: GERA – MS.