**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS
CURSO DE DOUTORADO**

**CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, CLÍNICA E
PATOLÓGICA DAS PRINCIPAIS DOENÇAS DE BOVINOS
DE MATO GROSSO DO SUL**

RAYANE CHITOLINA PUPIN

**CAMPO GRANDE – MS
2019**

RAYANE CHITOLINA PUPIN

**CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, CLÍNICA E
PATOLÓGICA DAS PRINCIPAIS DOENÇAS DE BOVINOS
DE MATO GROSSO DO SUL**

*Epidemiological, clinical and pathological aspects of the main cattle
diseases diagnosed in Mato Grosso do Sul*

RAYANE CHITOLINA PUPIN

Orientador: Danilo Carloto Gomes

Monografia de Exame de Qualificação
apresentada à Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, como requisito à
obtenção do título de Doutor em Ciências
Veterinárias.

Área de concentração: Medicina
Veterinária.

**CAMPO GRANDE – MS
2019**

Ata de Defesa de Tese
Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias
Doutorado

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às oito horas, na Sala de Reunião da FAMEZ, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, reuniu-se a Banca Examinadora composta pelos membros: Danilo Carloto Gomes (UFMS), Marcelo Augusto de Araujo (UFMS), Ricardo Antonio Amaral de Lemos (UFMS), Saulo Petinatti Pavarini (UFRGS) e Tessie Beck Martins (UFMS), sob a presidência do primeiro, para julgar o trabalho da aluna: **RAYANE CHITOLINA PUPIN**, CPF 02482645166, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, Curso de Doutorado, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, apresentado sob o título "**CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, CLÍNICA E PATOLÓGICA DAS PRINCIPAIS DOENÇAS DE BOVINOS DO MATO GROSSO DO SUL**" e orientação de Danilo Carloto Gomes. O presidente da Banca Examinadora declarou abertos os trabalhos e agradeceu a presença de todos os Membros. A seguir, concedeu a palavra à aluna que expôs sua Tese. Terminada a exposição, os senhores membros da Banca Examinadora iniciaram as arguições. Terminadas as arguições, o presidente da Banca Examinadora fez suas considerações. A seguir, a Banca Examinadora reuniu-se para avaliação, e após, emitiu Parecer expreso conforme segue:

EXAMINADOR	ASSINATURA	AVALIAÇÃO
Dr. Danilo Carloto Gomes		Aprovada
Dr. Carlos Alberto do Nascimento Ramos (Suplente)	_____	_____
Dr. Claudio Severo Lombardo de Barros (Suplente)	_____	_____
Dr. Marcelo Augusto de Araujo		Aprovada
Dr. Ricardo Antonio Amaral de Lemos		APROVADA
Dr. Saulo Petinatti Pavarini (Externo)		APROVADA
Dra. Tessie Beck Martins		APROVADA

RESULTADO FINAL:

Aprovação Aprovação com revisão Reprovação

OBSERVAÇÕES:

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou a sessão encerrada e agradeceu a todos pela presença.

Assinaturas:

Presidente da Banca Examinadora

Aluna

AGRADECIMENTOS

A Deus por toda a força e coragem concedidas durante essa caminhada.

Aos meus pais, Elizete e Osmar, por sempre terem me dado todo suporte e toda base para que fosse possível seguir nessa jornada e de forma direta e indireta terem me apoiado ao longo de todo o período.

Ao meu marido Fernando, pela paciência e amor nesses anos.

Aos professores do Laboratório de Anatomia Patológica, Ricardo Lemos, Tessie Martins e, em especial, Danilo Gomes, orientador que me acolheu, me deu suporte e além de tudo amizade para conclusão desse trabalho.

A todos os membros do laboratório, residentes, estagiários, técnicos, por toda a colaboração.

SUMÁRIO

RESUMO	viii
ABSTRACT	ix
CAPÍTULO 1	
1. INTRODUÇÃO	10
2. OBJETIVOS	11
3. REVISÃO DE LITERATURA	11
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	15
CAPÍTULO 2 – Doenças de bovinos diagnosticadas em Mato Grosso do Sul em 24 anos (1995-2018)	
Resumo	21
Abstract	21
Introdução	21
Materiais e Métodos	22
Resultados e Discussão	22
Conclusões	30
Referências Bibliográficas	30
CAPÍTULO 3 – Retrospective study of epidemiological, clinical and pathological findings of bovine babesiosis in Mato Grosso do Sul, Brazil (1995-2017)	
Resumo	34
Abstract	35
Introdução	35
Materiais e Métodos	37
Resultados	41
Discussão	45
Referências Bibliográficas	51
CAPÍTULO 4 – Photosensitization in cattle caused by spontaneous and experimentally ingestion of <i>Stryphnodendron fissuratum</i>	
Resumo	55
Abstract	56

Introdução	58
Materiais e Métodos	58
Resultados	61
Discussão	64
Conclusões	66
Referências Bibliográficas	67
CONSIDERAÇÕES FINAIS	70
ANEXOS	
Projeto Aprovado	72
Autorizações Legais	85

LISTA DE TABELAS

Capítulo 2 - Doenças de bovinos diagnosticadas em Mato Grosso do Sul em 24 anos (1995-2018)

Quadro 1.	Doenças inflamatórias e parasitárias de bovinos diagnosticadas no LAP-UFMS* entre janeiro de 1995 e dezembro de 2018.....	24
Quadro 2.	Doenças tóxicas e toxi-infecções de bovinos diagnosticadas no LAP-UFMS* entre janeiro de 1995 e dezembro de 2018.....	27
Quadro 3.	Doenças de bovinos causadas por agentes físicos diagnosticadas no LAP-UFMS* entre janeiro de 1995 e dezembro de 2018.....	28
Quadro 4.	Doenças metabólicas e nutricionais de bovinos diagnosticadas no LAP-UFMS* entre janeiro de 1995 e dezembro de 2018.....	28
Quadro 5.	Malformações congênitas de bovinos diagnosticadas no LAP-UFMS* entre janeiro de 1995 e dezembro de 2018.....	29
Quadro 6.	Neoplasmas e lesões tumoriformes de bovinos diagnosticados no LAP-UFMS* entre janeiro de 1995 e dezembro de 2018.....	29
Quadro 7.	Outras enfermidades de bovinos diagnosticadas no LAP-UFMS* entre janeiro de 1995 e dezembro de 2018.....	30

Capítulo 3 - Retrospective study of epidemiological, clinical and pathological findings of bovine babesiosis in Mato Grosso do Sul, Brazil (1995-2017)

Table 1.	Number of outbreaks of babesiosis diagnosed by the Anatomic Pathology Laboratory, School of Veterinary Medicine and Animal Science from 1995 to 2017 in the state of Mato Grosso do Sul in central-western Brazil.....	42
Table 2.	Number of outbreaks of babesiosis diagnosed by the Anatomic Pathology Laboratory, School of Veterinary Medicine and Animal Science (Campo Grande, state of Mato Grosso do Sul, Brazil) from 1995 to 2017 and clinical signs.....	45
Table 3.	Number of outbreaks of babesiosis diagnosed by the Anatomic Pathology Laboratory, School of Veterinary Medicine and Animal	45

Science (Campo Grande, state of Mato Grosso do Sul, Brazil) from 1995 to 2017 and necropsy findings.....

Capítulo 4 - Photosensitization in cattle caused by spontaneous and experimentally ingestion of *Stryphnodendron fissuratum*

Tabela 1.	Intoxicação experimental por <i>Stryphnodendron fissuratum</i> em bezerros. Delineamento experimental – dose diária, período de administração (dias), início dos sinais clínicos e evolução.....	60
Tabela 2.	Intoxicação espontânea por <i>Stryphnodendron fissuratum</i> em bovinos. Níveis séricos de GGT, AST, ureia e creatinina dos três animais necropsiados (Bovinos 1, 2 e 3) e dos três animais que sobreviveram a fase aguda e desenvolveram fotodermatite (Bovinos 4, 5 e 6).....	63
Tabela 3.	Intoxicação experimental por <i>Stryphnodendron fissuratum</i> em bezerros. Níveis séricos de GGT, AST, ureia e creatinina.....	64

LISTA DE FIGURAS

Capítulo 2 - Doenças de bovinos diagnosticadas em Mato Grosso do Sul em 24 anos (1995-2018)

Figura 1.	Classificação das causas de morte de bovinos diagnosticadas entre janeiro de 1995 e dezembro de 2018 em Mato Grosso do Sul no LAP-UFMS*	23
Figura 2.	Total de necropsias de bovinos e número de casos de raiva bovina diagnosticados no LAP-UFMS* entre janeiro de 1995 e dezembro de 2018.....	25

Capítulo 3 - Retrospective study of epidemiological, clinical and pathological findings of bovine babesiosis in Mato Grosso do Sul, Brazil (1995-2017)

Figure 1.	Macroscopic lesions of bovine babesiosis. (A,B) – jaundice; (C) – enlarged and yellow liver; (D) – enlarged spleen; (E) – dark brown kidney; (F) – dark urine.....	38
Figure 2.	Cytological findings and microscopic lesions of bovine babesiosis. (A) liver – marked centrilobular vacuolation and biliary stasis, HE; (B) kidney – acute tubular necrosis and deposition of orange pigment, HE; (C) – <i>Babesia bigemina</i> , blood smear panoptic staining; (D) – <i>B. bovis</i> , blood smear panoptic staining.	39

Figure 3.	Cerebral babesiosis. (A-B) pink discoloration of brain gray matter; (C) stasis of erythrocytes parasitized by <i>B. bovis</i> in capillary of brain, cytology preparation of brain and panoptic staining	40
Figure 4.	Number of outbreaks of babesiosis diagnosed by Anatomic Pathology Laboratory, School of Veterinary Medicine and Animal Science (Campo Grande, state of Mato Grosso do Sul, central-western Brazil) from January 1995 until December 2017 according to the month of babesiosis diagnosis.	43
Figure 5.	Number of outbreaks of babesiosis diagnosed by Anatomic Pathology Laboratory, School of Veterinary Medicine and Animal Science (Campo Grande, state of Mato Grosso do Sul, central-western Brazil) from January 1995 until December 2017 according to the age of the animals affected	44

Capítulo 4 - Photosensitization in cattle caused by spontaneous and experimentally ingestion of *Stryphnodendron fissuratum*

Figura 1.	Intoxicação espontânea e experimental por <i>Stryphnodendron fissuratum</i> . (A) – bezerro Nelore com lesões de fotodermatite na barbela, flanco e lateral do tórax após ingestão espontânea dos frutos de <i>S. fissuratum</i> . (B) – intoxicação experimental por <i>S. fissuratum</i> . No rim há tumefacão e necrose de células epiteliais tubulares e acúmulo de material proteináceo no lúmen tubular. (C) – intoxicação espontânea por <i>S. fissuratum</i> . Fígado com hepatócitos tumefeitos e moderada retenção biliar. (D-E) – árvore e frutos de <i>S. fissuratum</i>	62
-----------	--	----

RESUMO

1 **PUPIN, R.C. Caracterização epidemiológica, clínica e patológica das principais doenças de**
2 **bovinos de Mato Grosso do Sul. 2019. Tese de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em**
3 **Ciências Veterinárias. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal**
4 **de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, 2019.**

5
6 A cadeia produtiva da carne é um importante segmento da economia nacional constituindo-se em
7 uma das principais fontes de produtos de exportação no Brasil. A garantia do estado sanitário das
8 cadeias produtivas é um dos principais desafios e o conhecimento das enfermidades que afetam os
9 bovinos é de extrema importância para que se alcance o máximo potencial de criação. O objetivo
10 desta tese é determinar as principais causas de mortalidade de bovinos diagnosticadas em Mato
11 Grosso do Sul pelo Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal de Mato Grosso
12 do Sul (LAP-UFMS). Artigo 1 – o objetivo foi determinar a frequência e aspectos clínicos, patológicos
13 e epidemiológicos das principais doenças de bovinos diagnosticadas em Mato Grosso do Sul. Foram
14 revisados os laudos do LAP-UFMS das necropsias de bovinos realizadas pela equipe do laboratório
15 ou por veterinários externos, no período entre janeiro de 1995 e dezembro de 2018. Foram avaliados
16 5083 protocolos dos quais 2734 (53,79%) tiveram diagnóstico inconclusivo. Dos 2349 casos
17 conclusivos, aproximadamente 65% se enquadram como doenças inflamatórias e parasitárias. O
18 segundo grupo com mais casos foi de doenças tóxicas e toxi-infecções seguido por doenças
19 degenerativas, doenças causadas por agentes físicos, neoplasias e lesões tumoriformes, distúrbios
20 metabólicos e nutricionais e malformações congênitas. Os principais diagnósticos foram raiva,
21 meningoencefalite não supurativa de causa indeterminada, polioencefalomalacia,
22 meningoencefalite por herpesvírus bovino e botulismo. O grande número de inconclusivos foi
23 associado ao não encaminhamento de fragmentos de todos os órgãos assim como não envio de
24 dados sobre epidemiologia, sinais clínicos e achados macroscópicos. Artigo 2 – teve como objetivo
25 descrever os aspectos epidemiológicos, clínicos e patológicos dos casos de babesiose bovina
26 diagnosticados entre janeiro de 1995 e dezembro de 2017 no estado de Mato Grosso do Sul. Foi
27 realizado estudo retrospectivo avaliando-se os protocolos de necropsia realizadas ou não por
28 membros do LAP-UFMS para seleção dos casos confirmados e sugestivos de babesiose. O
29 diagnóstico foi considerado como confirmado quando, além dos achados macroscópicos e
30 microscópicos, houve identificação do agente etiológico, e foram sugestivos quando esta última não
31 ocorreu. Foram avaliados 33 surtos envolvendo um total de 41 bovinos dos quais 27 foram
32 confirmados (21 casos de babesiose cerebral) e 14 sugestivos. O agente mais comumente
33 identificado foi *Babesia bovis*, no entanto, não foi possível afirmar se isso deve-se a predominância
34 desta espécie no estado ou se está relacionado a maior patogenicidade desta em comparação *B.*
35 *bigemina*. Foram acometidos bovinos de todas as idades, inclusive bovinos acima de 12 meses, o
36 que não é esperado em regiões endêmicas, e isso provavelmente está relacionado ao rompimento
37 da estabilidade enzoótica. Bovinos de raças zebuínas, que predominam na área de estudo, foram
38 afetados na maioria dos casos, no entanto essas predominam na área de estudo. Não houve
39 diferença estatística significativa entre a ocorrência de casos em bovinos zebuínos e não-zebuínos.
40 Artigo 3 – descreve casos de fotossensibilização hepatógena associado ao consumo de frutos de
41 *Stryphnodendron fissuratum*, uma árvore nativa do cerrado, popularmente conhecida como
42 “rosquinha”. No surto natural adoeceram 52 bovinos de um lote de 160 dos quais dois bezerros e
43 14 vacas morreram. Clinicamente havia depressão, ataxia, incoordenação, diminuição de
44 sensibilidade da cauda e do ânus, decúbito e morte em até três dias. Um bovino que morreu e os
45 36 que se recuperaram desenvolveram fotodermatite. Os achados de necropsia consistiam de
46 estado corporal ruim, rins pálidos, fígado com padrão evidente e conteúdo ruminal ressecado.
47 Microscopicamente, degeneração e necrose do epitélio tubular renal com acúmulo de material
48 proteináceo no lúmen; no fígado, vacuolização de hepatócitos e retenção biliar moderada.
49 Experimentalmente, reproduziu-se a intoxicação em dois bezerros de nove meses utilizando-se
50 doses de 1g/kg PV durante 13 dias e 2g/kg PV durante 10 dias, sendo que nessa dose o animal
51 desenvolveu sinais clínicos mais graves e foi eutanasiado *in extremis*. As lesões macroscópicas e
52 microscópicas eram semelhantes as dos bovinos do surto espontâneo. As lesões hepáticas
53 permitem considerar que a fotossensibilização tem origem hepatógena e ocorre nos animais que se
54 recuperam da fase aguda da doença caracterizada principalmente pela lesão renal.

55
56 Palavras-chave: doenças de bovinos, epidemiologia, intoxicação por plantas, levantamento,
57 necropsia
58

ABSTRACT

PUPIN, R.C. Epidemiological, clinical and pathological aspects of the main cattle diseases diagnosed in Mato Grosso do Sul. 2019. Tese de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, 2019.

The meat production chain is an important segment of the national economy constituting one of the main sources of export products in Brazil. Any factor that may restrict trade of animal products will result in economic loss. The guarantee of the sanitary state of the productive chains is one of the main challenges, being the knowledge of the diseases that affect the cattle of extreme importance in order to reach the maximum potential of creation. The objective of this thesis was the accomplishment of a retrospective and prospective study about bovine diseases diagnosed in Mato Grosso do Sul by the Anatomic Pathology Laboratory of UFMS to know the main causes of mortality in the region. Article 1 – the objective of this was to determine the frequency and clinical, pathological and epidemiological aspects of the main diseases of bovine diagnosed in Mato Grosso do Sul. The records of bovine necropsies performed between January 1995 and December 2018 by members of the Anatomic Pathology Laboratory at the Federal University of Mato Grosso do Sul, or by veterinary practitioners in the field were reviewed. A total of 5083 protocols were evaluated, of which 2734 (53,79%) had an inconclusive diagnosis. Of the 2349 conclusive cases, almost 65% were classified as inflammatory and parasitic diseases. The second group with the highest number of cases was toxic diseases and toxi-infections followed by degenerative diseases, caused by physical agents, neoplasias and tumoriform lesions, metabolic / nutritional disorder and congenital malformations. The main diagnoses were rabies, nonsuppurative meningoencephalitis of unknown cause, polioencephalomalacia, necrotizing meningoencephalitis caused by bovine herpesvirus and botulism. The large number of inconclusives was associated with not sending of fragments of all organs as well as not sending data on epidemiology, clinical signs and macroscopic findings. Article 2 - aimed to describe the epidemiological, clinical and pathological aspects of the cases of bovine babesiosis diagnosed between January 1995 and December 2017 in the state of Mato Grosso do Sul. A retrospective study was carried out evaluating the necropsy protocols performed or not by LAP-UFMS members for the selection of confirmed and suggestive cases of babesiosis. It was considered as confirmed when, added to the macro and microscopic findings, there was identification of the etiological agent, and suggestive when the latter did not occur. Thirty-three outbreaks involving a total of 41 animals were evaluated, of which 27 were confirmed (21 of which were cerebral babesiosis) and 14 were suggestive. The most commonly identified agent was *Babesia bovis*; however, it was not possible to know if this is due to the predominance of this species in the state or whether it is related to its higher pathogenicity in comparison to *B. bigemina*. Bovines of all ages, including cattle over 12 months of age, which is not expected in endemic regions, were affected and this is probably related to the breakdown of enzootic stability. Zebu breeds were affected in most cases however, they predominate in the study area. There was no statistically significant difference between the occurrence of cases in zebu and non-zebu animals. Clinical signs, macroscopic and microscopic findings were similar to those previously described. Article 3 - describes cases of hepatogenic photosensitization associated with the ingestion of *Stryphnodendron fissuratum* pods, a native tree of the cerrado, popularly known as "rosquinha". In the natural outbreak, 52 cattle from a lot of 160 were affected, of which two calves and 14 cows died. Clinically there was depression, ataxia, incoordination, decreased sensitivity of the tail and anus, decubitus and death within up to three days. One animal that died and the 36 that recovered developed photodermatitis. Necropsy findings consisted of poor body condition, pale kidneys, liver with evident pattern and dried ruminal content. Microscopically, degeneration and necrosis of the renal tubular epithelium with accumulation of proteinaceous material in the lumen; in the liver, hepatocyte vacuolization and moderate biliary retention. Experimentally, the poisoning was reproduced in two 9-month-old calves using doses of 1g/kg BW during 13 days and 2g/kg BW during 10 days; with the last dose, the animal developed more severe clinical signs and was euthanized *in extremis*. Gross and microscopic lesions were similar to those of spontaneous outbreaks. Hepatic lesions allow us to consider that photosensitization is of hepatogenous origin and occurs in animals that recovered from the acute phase of the disease characterized mainly by renal lesion.

Keywords: cattle diseases, epidemiology, plant poisoning, surveys, necropsy

118 **CAPÍTULO 1**

119

120 **INTRODUÇÃO**

121 No ano de 2017, o Brasil possuía o segundo maior efetivo de bovinos no
122 mundo com aproximadamente 226 milhões de cabeças, atrás apenas da Índia, e
123 foi o maior exportador de carne bovina nesse mesmo ano (USDA, 2018). Desse
124 total, 34,4% - aproximadamente 75 milhões de bovinos - estão na região Centro-
125 Oeste e o estado de Mato Grosso do Sul possui o 4º maior rebanho bovino do país,
126 atrás de Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás (IBGE, 2017). Isso confere ao estado
127 situação semelhante ao de Iowa, Estados Unidos da América, em que a economia
128 depende grandemente da indústria pecuária (Schulz et al., 2018).

129 A cadeia produtiva da carne é um importante segmento da economia
130 nacional constituindo-se em uma das principais fontes de produtos de exportação
131 do país. Qualquer fator que possa restringir o comércio de produtos de origem
132 animal vai resultar em prejuízo econômico (Schulz et al., 2018). Para a manutenção
133 do cenário de crescimento do agronegócio no Brasil, a garantia do estado sanitário
134 das cadeias produtivas é um dos principais desafios. Dessa forma, o conhecimento
135 das enfermidades que afetam os bovinos é de extrema importância para que se
136 alcance o potencial máximo de criação (Lucena et al., 2010).

137 Estima-se que aproximadamente 5% do rebanho bovino brasileiro morra
138 anualmente por diferentes causas (Pessoa et al., 2013). O conhecimento sobre a
139 ocorrência das enfermidades e os seus efeitos são necessários para designar
140 tratamento e programas preventivos (Church e Radostits, 1981). Assim, para que
141 se desenvolvam medidas para evitar ou minimizar os prejuízos causados por elas
142 é necessário determinar a epidemiologia de cada uma delas. O diagnóstico rápido
143 e preciso das doenças é a maneira mais segura para evitar sua disseminação,
144 assim como o conhecimento da epidemiologia é o único meio eficiente de evitar a
145 introdução de doenças em uma região anteriormente livre (Barros et al., 2006).

146 Estudos retrospectivos sobre as principais enfermidades diagnosticadas na
147 área de abrangência dos laboratórios de diagnóstico veterinário já foram realizados
148 em diversos estados do Brasil (Sanchez et al., 2000; Galiza et al., 2010; Lucena et
149 al., 2010; Rissi et al., 2010; Ribas et al., 2013; Schild et al., 2013; Mello et al., 2017;
150 Rondelli et al., 2017; Terra et al., 2018) e representam uma importante fonte de

151 informação tanto para os veterinários de campo como para os órgãos de defesa
152 sanitária estaduais.

153

154 **OBJETIVOS**

155 **Objetivos gerais:** realizar estudo retrospectivo e prospectivo das amostras de
156 bovinos oriundos de Mato Grosso do Sul avaliados pelos membros do Laboratório
157 de Anatomia Patológica, identificando as principais enfermidades diagnosticadas
158 assim como suas características epidemiológicas, clínicas e patológicas.

159

160 **Objetivos específicos:**

161 (1) Realizar estudo retrospectivo das amostras de bovinos avaliadas entre
162 janeiro de 1995 e dezembro de 2016;

163 (2) Realizar estudo prospectivo das amostras de bovinos avaliadas entre janeiro
164 de 2017 e dezembro de 2018;

165 (3) Estratificação das enfermidades de acordo com a etiologia;

166 (4) Identificação das principais enfermidades diagnosticadas e características
167 epidemiológicas, clínicas e patológicas destas, com fim de auxiliar na
168 realização de diagnósticos sobretudo por veterinários a campo;

169 (5) Descrever os aspectos epidemiológicos, clínicos e patológicos da babesiose
170 bovina no Mato Grosso do Sul; e

171 (6) Descrever um surto de intoxicação de bovinos por *Stryphnodendron*
172 *fissuratum*.

173

174 **REVISÃO DE LITERATURA**

175 Os laboratórios de diagnóstico veterinário (LDVs) dedicam-se ao estudo das
176 doenças dos animais no que se refere a epidemiologia, causas determinantes das
177 mesmas, características e do seu controle. A rotina de trabalho destes laboratórios
178 contribui para a proteção da saúde humana e animal, pois permite diagnóstico,
179 estabelecimento de medidas de tratamento e prevenção de enfermidades, além de
180 auxiliar na vigilância sanitária do rebanho (Schulz et al., 2018).

181 Isto se torna possível através do exame de animais ainda vivos, cadáveres
182 completos ou parte destes, com o uso de técnicas especiais para identificar agentes
183 causadores ou substâncias envolvidas no desenvolvimento das doenças (Costa et

184 al., 2009). A realização da necropsia detalhada provê a melhor informação para
185 estabelecer a causa da morte dos bovinos (McConnel et al., 2009) e apesar de, por
186 muitas vezes, ser a única forma de se concluir um diagnóstico, ela é negligenciada
187 em várias situações (Peixoto e Barros, 1998). Esse fato é exemplificado em
188 estudos realizados em confinamentos (Church e Radostits, 1981; Loneragan et al.,
189 2001) e em fazendas de criação extensiva no Canadá (Waldner et al., 2009). Nos
190 confinamentos, os primeiros autores observaram que a grande maioria dos
191 proprietários utiliza o serviço veterinário para realização de necropsia de apenas
192 20% dos bovinos que morrem, e o segundo grupo descreveu que apesar de um
193 leve aumento no número de animais necropsiados entre determinado período de
194 tempo, é improvável que exames *post mortem* tenham sido realizados em todos os
195 bovinos que morreram, de forma que pode haver um desvio na descrição da
196 frequência com que as enfermidades ocorrem. Já na criação extensiva (Waldner et
197 al., 2009), mesmo a avaliação tendo sido isenta de custos com serviço veterinário
198 e envio de amostras para laboratórios de diagnóstico, apenas 59% dos animais que
199 morreram foram necropsiados. A importância da necropsia é reforçada mediante
200 demonstração de que, em apenas 55% dos casos de mortalidade acompanhados
201 numa propriedade leiteira, a percepção do produtor/responsável pelo animal a
202 respeito da morte do indivíduo estava correta. Esse número é reduzido para 41%
203 se forem excluídas as mortes relacionadas a traumas e desordens locomotoras, e
204 se consideradas apenas as vacas que morrem de forma não assistida esse número
205 é somente 37% (McConnel et al., 2009). Isso ocorre pelo fato de que as vacas que
206 são eutanasiadas normalmente o são devido a problemas diagnosticados mais
207 facilmente como úlcera de sola, laminite, artrite, osteomielite, artrose, outros
208 distúrbios de locomoção, ou também problemas relacionados ao parto como
209 laceração e prolapso vaginal (Thomsen et al., 2012).

210 A atuação dos LDVs baseada na coleta e análise de dados de forma
211 padronizada e sistematizada permite a elaboração de material de divulgação
212 destinado, principalmente, aos médicos veterinários de campo, visto que esses
213 fornecem importante orientação sobre as principais enfermidades que ocorrem na
214 sua área de atuação (Almeida et al., 2006; Lucena et al., 2010; Rissi et al., 2010;
215 Rondelli et al., 2017). O conhecimento sobre a prevalência das diferentes doenças
216 que afetam o rebanho bovino de uma região é fundamental para que esses
217 profissionais tenham em mãos uma lista de diagnósticos diferenciais a ser

218 considerada frente à determinada manifestação clínica, laboratorial ou
219 anatomopatológica (Lucena et al., 2010). Apesar de não existirem muitas variações
220 nas doenças observadas nas áreas de abrangência de cada laboratório de
221 diagnóstico (Rissi et al., 2010), características epidemiológicas podem variar
222 bastante entre as regiões. Ocorrem também diferenças entre as causas de
223 mortalidade nas diferentes regiões devido ao sistema de criação predominante
224 naquele local (Rondelli et al., 2017; Santos et al., 2018).

225 Esse modo de atuação dos LDVs permite a realização de estudos
226 retrospectivos, uma importante fonte de publicações científicas (Sanches et al.,
227 2000; Rodrigues et al., 2005; Almeida et al., 2006; Pedroso et al., 2007; Ramos et
228 al., 2008; Sant'ana et al., 2009; Galiza et al., 2010; Lucena et al., 2010; Rissi et al.,
229 2010; Lucena et al., 2011; Marcolongo-Pereira et al., 2011; Pedroso et al., 2012;
230 Assis-Brasil et al., 2013; Ribas et al., 2013; Andrade et al., 2014; Souza et al., 2015;
231 Mello et al., 2017; Oliveira et al., 2017; Reis et al., 2017; Rondelli et al., 2017; Blume
232 et al., 2018; Heckler et al., 2018; Santos et al., 2018; Terra et al., 2018). Através
233 desses estudos é possível: (1) agrupar dados clínicos, laboratoriais e patológicos;
234 (2) definir a prevalência de uma enfermidade em diferentes categorias de animais;
235 (3) modificar diagnósticos incorretos e conceitos errôneos (Fighera, 2008).

236 Os LDVs constituem também uma parte essencial para o estabelecimento
237 de um sistema eficiente de vigilância epidemiológica que é essencial para a
238 manutenção e expansão do mercado consumidor dos produtos de origem animal,
239 além da importância na saúde pública. O trabalho dos laboratórios torna-se ainda
240 mais crucial quando ocorrem doenças que causam barreiras ao comércio (Schulz
241 et al., 2018). Um dos principais exemplos disso foi a notificação de casos atípicos
242 e esporádicos de encefalopatia espongiforme bovina (BSE) no estado de Paraná
243 em 2010 (Brasil, 2012) e em Mato Grosso (Brasil, 2014). A comunicação frequente
244 com veterinários locais também permite aos LDVs a realização de vigilância
245 epidemiológica ativa a respeito de casos de intoxicação por plantas (Rissi et al.,
246 2007) assim como de outras enfermidades. Além disso, a eficiência da
247 produtividade na bovinocultura está diretamente relacionada à sanidade do
248 rebanho, visto que além da morte de animais, há queda na produtividade de
249 animais doentes (Rondelli et al., 2017).

250 A falta de informação de veterinários e produtores rurais conduz a dúvidas
251 frente ao diagnóstico de intoxicação por plantas (Rissi et al., 2007) e da mesma

252 forma isso pode ocorrer com outras enfermidades de bovinos, ressaltando a
253 importância de veiculação de informações aos indivíduos relacionados à atividade
254 pecuária (Schild et al., 2013). O não encaminhamento de amostras aos LDVs
255 quando ocorrem surtos ou mortes isoladas em animais de produção resulta em
256 opiniões divergentes e muitas vezes não fundamentadas que acabam atrasando o
257 diagnóstico correto e aumentando os prejuízos (Peixoto e Barros, 1998). Dessa
258 forma, recomenda-se maior busca por serviços veterinários para esclarecimento
259 das causas de mortalidade para desenvolvimento dos mais adequados programas
260 preventivos e terapêuticos (Church e Radostits, 1981).

261 A associação entre a epidemiologia, sinais clínicos, achados de necropsia e
262 histopatológicos demonstrou ser eficiente no diagnóstico de enfermidades com
263 sintomatologia nervosa (Lemos, 2005). No entanto, apesar da importância da
264 realização de diagnóstico pelos laboratórios, o período de tempo entre o
265 aparecimento dos primeiros casos clínicos e a realização do diagnóstico pode
266 resultar em enormes prejuízos devido ao adoecimento e morte de novos animais.
267 Por isso é de extrema importância que os veterinários de campo, baseados na
268 epidemiologia, sinais clínicos e achados de necropsia, sejam capazes de elaborar
269 uma lista de possíveis diagnósticos que permita tratar novo doentes e adotar
270 medidas de profilaxia para que novos animais não adoeçam.

271 Embora exista grande quantidade de conhecimento produzido nos LDVs,
272 muitas vezes esse não é transferido aos demais profissionais externos aos grandes
273 centros acadêmicos (Lemos, 2004). Considerando esse aspecto ressalta-se a
274 importância da confecção de material que contenha informações que possam
275 auxiliar a elaboração de diagnóstico presuntivo de forma rápida e eficiente até que
276 seja possível a realização do diagnóstico final.

277 Especificamente em Mato Grosso do Sul, a ação dos LDVs foi fundamental
278 para a determinação das condições de ocorrência de diversas doenças
279 responsáveis por perdas econômicas para a pecuária do estado, permitindo o
280 estabelecimento de medidas eficientes para o controle. Podem ser citadas doenças
281 infecciosas como raiva (Langorh et al., 2003), meningoencefalite por herpesvírus
282 bovino tipo 5 (Salvador et al., 1998), diarreia viral bovina (Ferreira et al., 2008; Pinto
283 et al., 2013), carbúnculo sintomático (Heckler et al., 2018), febre catarral maligna
284 (Lemos et al., 2005), dermatofilose (Bacha et al., 2014); parasitárias como
285 tripanossomíase (Paiva et al., 2000), tóxicas (Brum et al., 2002; Carvalho et al.,

286 2006; Carvalho et al., 2013; Carvalho et al., 2014; Souza et al., 2015; Faccin et al.,
287 2016), metabólicas como a polioencefalomalacia (Nakazato et al., 2000) e casos
288 de mortalidade por hipotermia associadas a variações climáticas bruscas (Santos
289 et al., 2012).

290 Os estudos retrospectivos também permitem identificar e corrigir falhas nos
291 procedimentos de diagnóstico empregados visando aumento da eficácia
292 diagnóstica. Como exemplo dessa situação pode-se citar o estudo que identifica
293 possíveis falhas no diagnóstico da raiva quando determinadas partes anatômicas
294 do sistema nervoso central não são encaminhadas ao laboratório (Bingham e
295 Merwe, 2002). Outro exemplo são as doenças entéricas, particularmente as
296 diarreias neonatais. O diagnóstico desta condição é complexo e inclui diversos
297 fatores como o número de partículas infecciosas, ocorrência de doenças
298 concomitantes e a virulência do agente. Dessa forma, o diagnóstico fundamenta-
299 se na interpretação dos resultados laboratoriais (isolamento de patógenos)
300 associada aos sinais clínicos, dados epidemiológicos e achado macroscópicos e
301 microscópicos. A necropsia e a histopatologia podem ser determinantes para o
302 estabelecimento do diagnóstico através da identificação de lesões causadas pelo
303 agente isolado (Blanchard, 2012). Além disso, através da necropsia são obtidas
304 informações adicionais a respeito daquele indivíduo e estas podem ser usadas
305 pelos produtores como meio de identificar possíveis falhas que estão ocorrendo no
306 sistema de criação (Thomsen et al., 2012).

307 Essas observações são particularmente importantes, pois em estudos
308 retrospectivos realizados em diferentes LDVs do Brasil demonstram o grande
309 número de diagnósticos inconclusivos (Lucena et al., 2010; Ribas et al., 2013;
310 Rondelli et al., 2017). Dentre as principais falhas apontadas nesses estudos estão
311 tecidos ou cadáveres em mau estado de conservação (autólise), falta de dados
312 epidemiológicos, envio de tecidos insuficientes para exame, não observação de
313 lesões macroscópicas e a interpretação errônea de características anatômicas,
314 achados incidentais e alterações *post mortem* (Lucena et al., 2010; Ribas et al.,
315 2013; Rondelli et al., 2017).

316

317 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

318 Almeida, M.B.; Tortelli, F.P.; Riet-Correa, B.; Ferreira, J.L.M.; Soares, M.P.; Farias,
319 N.A.R.; Riet-Correa, F.; Schild, A.L. Tristeza parasitária bovina na região sul do Rio

- 320 Grande do Sul: estudo retrospectivo de 1978-2005. **Pesq Vet Bras.**, v.26, n.4,
321 p.237-242, 2006.
- 322 Andrade, J.S.L.; Azevedo, S.S.; Peconick, A.P.; Pereira, S.M.; Barçante, J.M.P.;
323 Vilar, A.L.T.; Silva, M.L.C.R. Estudo retrospectivo da raiva no Estado da Paraíba,
324 Brasil, 2004 a 2011. **Braz J Vet Res Anim Sci.**, v.51, n.3, p.212-219, 2014.
- 325 Assis-Brasil, N.D.; Marcolongo-Pereira, C.; Hinnah, F.L.; Ladeira, S.R.L.; Sallis,
326 E.S.V.I Grecco, F.B.; Schild, A.L. Enfermidades diagnosticadas em bezerros na
327 região Sul do Rio Grande do Sul. **Pesq Vet Bras.**, v.33, n.4, p.423-430, 2013.
- 328 Bacha, F.B.; Faccin, T.C.; Lima, S.C.; Leal, C.R.B.; Lemos R.A.A. Dermatofilose em
329 bezerros da raça Nelore no Mato Grosso do Sul. **Semina: Ciênc Agrár.**, v.35, n.4,
330 p.1947-1954, 2014.
- 331 Barros, C.S.L.; Driemeier, D.; Dutra, I.S.; Lemos, R.A.A. **Doenças do sistema**
332 **nervoso de bovinos no Brasil.** 1ª Ed., São Paulo, Coleção Vallée, 2006. 207p.
- 333 Bingham, J.; Merwe, M.V. Distribution of rabies antigen in infected brain material:
334 determining the reliability of different regions of the brain for rabies fluorescent
335 antibody test. **J Virol Methods.**, v.101, p.85-94, 2002.
- 336 Blanchard, P.C. Diagnostics of Dairy and Beef Cattle Diarrhea. **Vet Clin Food**
337 **Anim.**, v.28, p.443-464, 2012.
- 338 Blume, G.R.; Silva, L.F.; Borges, J.R.J.; Nakazato, L.; Terra, J.P.; Rabelo, R.E.;
339 Vulcani, V.A.S.; Santa'ana, F.J.F. Caracterização etiológica, epidemiológica e
340 clínico-patológica da meningoencefalite por herpesvírus bovino em bovinos no
341 Estado de Goiás. **Pesq Vet Bras.**, v.38, n.5, p.902-912, 2018.
- 342 **Brasil**, 2012. Acessado em 31/01/2017. Disponível em:
343 <http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2012/12/nota-oficial>
- 344 **Brasil**, 2014. Acessado em 31/01/2017. Disponível em:
345 [http://www.agricultura.gov.br/animal/noticias/2014/05/entenda-o-caso-de-eeb-no-](http://www.agricultura.gov.br/animal/noticias/2014/05/entenda-o-caso-de-eeb-no-mato-grosso)
346 [mato-grosso](http://www.agricultura.gov.br/animal/noticias/2014/05/entenda-o-caso-de-eeb-no-mato-grosso)
- 347 Brum, K.B.; Purisco, E.; Lemos, R.A.A.; Riet-Correa, F. Intoxicação por *Vernonia*
348 *rubricaulis* em bovinos no Mato Grosso do Sul. **Pesq Vet Bras.**, v.22, n.3, p.119-
349 128, 2002.
- 350 Carvalho, N.M.; Alonso, L.A.; Cunha, T.G.; Ravedutti, J.; Barros, C.S.L.; Lemos,
351 R.A.A. Intoxicação de bovinos por *Tetrapteryx multiglandulosa* (Malpighiaceae) em
352 Mato Grosso do Sul. **Pesq Vet Bras.**, v.26, n.3, p.139-146, 2006.
- 353 Carvalho, N.M.; Bacha, F.B.; Santos, A.C.; Carvalho, A.Q.; Faccin, T.C.; Pott, A.;
354 Lemos, R.A.A. Spontaneous and experimental intoxication of cattle by *Simarouba*
355 *versicolor* A. St.- Hill (Simaroubaceae). **Toxicon.**, v.64, p.55-59, 2013.
- 356 Carvalho, A.Q.; Carvalho, N.M.; Vieira, G.P.; Santos, A.C.; Franco, G.L.; Pott, A.;
357 Barros, C.S.L.; Lemos, R.A.A. Intoxicação espontânea por *Senna obtusifolia* em
358 bovinos no Pantanal Sul-Matogrossense. **Pesq Vet Bras.**, v.34, n.2, p.147-152,
359 2014.
- 360 Church, T.L.; Radostits, O.M. A retrospective survey of disease of feedlot cattle in
361 Alberta. **Can Vet J.**, v.22, n.2, p.27-30, 1981.
- 362 Costa V.M.M., Simões S.V.D., Riet-Correa F. Doenças parasitárias em ruminantes
363 no semi-árido brasileiro. **Pesq Vet Bras.**, v.29, n.7, p. 563-568, 2009.

- 364 Faccin, T.C.; Kommers, G.D.; Galiza, G.J.N.; Pupin, R.C.; Madureira, R.C.; Lemos,
365 R.A.A. Chronic liver disease in cattle associated with ingestion of *Brachiaria* spp.
366 **Ciênc Rural**, v. 46, n.11, p.2036-2042, 2016.
- 367 Ferreira, L.C.L.; Flores, E.F.; Driemeier, D.; Melo, O.; Lemos, R.A.A. Doença das
368 mucosas associada à dermatite generalizada em bovinos, Mato Grosso do Sul.
369 **Pesq Vet Bras.**, v.28, n.6, p.285-292, 2008.
- 370 Figuera, R.A. **Causas de morte e razão para eutanásia em cães**. 2008. 168p.
371 Tese (Doutorado em Patologia Veterinária) – Centro de Ciências Rurais,
372 Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria.
- 373 Galiza, G.J.N.; Silva, M.L.C.R.; Dantas, A.F.M.; Simões, S.V.D.; Riet-Correa, F.
374 Doenças do sistema nervoso de bovinos no semiárido nordestino. **Pesq Vet Bras.**,
375 v.30, n.3, p.267-276, 2010.
- 376 Heckler, R.F.; Lemos, R.A.A.; Gomes, D.C.; Dutra, I.S.; Silva, R.O.S.; Lobato,
377 F.C.F.; Ramos, C.A.N.; Brumatti, R.C. Blackleg in cattle in the state Mato Grosso
378 do Sul, Brazil: 59 cases. **Pesq Vet Bras.**, v.38, n.1, p.6-14, 2018.
- 379 **IBGE** – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Efetivo dos rebanhos, por tipo
380 de rebanho, segundo o Brasil, as Grandes Regiões e as Unidades da Federação.
381 2017. Disponível em
382 <https://sidra.ibge.gov.br/geratabela?name=Tabela%201.xlsx&format=xlsx&medidas=true&query=t/3939/g/2/v/all/p/2017/c79/all/l/p%2Bv,c79,t>. Acesso em 07/03/2019
383 às 15:44.
384
- 385 Langorh, I.M.; Irigoyen, L.F.; Lemos, R.A.A.; Barros, C.S.L. Aspectos
386 epidemiológicos, clínicos e distribuição das lesões histológicas no encéfalo de
387 bovinos com raiva. **Ciênc Rural**, v.33, n.1, p.125-131, 2003.
- 388 Lemos, R.A.A. (Org.). **Botulismo, Meningoencefalite por Herpesvírus Bovino**
389 **tipo 5, Polioencefalomalacia, Raiva**. Série Qualificação Rural. 1ª ed. Campo
390 Grande, Editora UFMS, v.1, 86 p., 2004.
- 391 Lemos, R.A.A. **Enfermidades do sistema nervoso de bovinos de corte das**
392 **regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil**. 2005. 150p. Tese (Doutorado em
393 Medicina Veterinária Preventiva) - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária,
394 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Jaboticabal, São Paulo.
- 395 Lemos, R.A.A.; Rech, R.R.; Guimarães, E.B.; Kadri, A.; Dutra, I.S. Febre catarral
396 maligna em bovinos do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. **Ciênc Rural**, v.35, n.
397 4, p.932- 934, 2005.
- 398 Loneragan, G.H.; Dargatz, D.A.; Morley, P.S.; Smith, M.A. Trends in mortality ratios
399 among cattle in US feedlots. **J Am Vet Med A.**, v.219, p.1122-1127, 2001.
- 400 Lucena, R.B.; Pierezan, F.; Kommers, G.D.; Irigoyen, L.F.; Figuera, R.A.; Barros,
401 C.S.L. Doenças de bovinos no Sul do Brasil: 6706 casos. **Pesq Vet Bras.**, v.30,
402 n.5, p.428-434, 2010.
- 403 Lucena, R.B.; Rissi, D.R.; Kommers, K.D.; Pierezan, F.; Oliveira-Filho, J.C.;
404 Macêdo, J.T.S.A.; Flores, M.M.; Barros, C.S.L. A retrospective study of 586 tumors
405 in brazilian cattle. **J Comp Path.**, v.145, p.20-24, 2011.
- 406 Marcolongo-Pereira, C.; Sallis, E.S.V.; Grecco, F.B.; Raffi, M.B.; Soares, M.P.;
407 Schild, A.L. Raiva em bovinos na Região Sul do Rio Grande do Sul: epidemiologia
408 e diagnóstico imuno-histoquímico. **Pesq Vet Bras.**, v.32, n.4, p.331-335, 2011.

- 409 McConnel, C.S.; Garry, F.B.; Lombard, J.E.; Kidd, J.A.; Hill, A.E.; Gould, D.H. A
410 necropsy-based descriptive study of dairy cow deaths on a Colorado dairy. **J Dairy**
411 **Sci.**, v.92, n.5, p.1954-1962, 2009.
- 412 Mello, L.S.; Bianchi, M.V.; Bandinelli, M.B.; Sonne, L.; Driemeier, D.; Pavarini, S.P.
413 Causas de morte em vacas leiteiras no Rio Grande do Sul. **Pesq Vet Bras.**, v.37,
414 n.9, p.916-920, 2017.
- 415 Nakazato, L.; Lemos, R.A.A.; Riet-Correa, F. Polioencefalomalacia em bovinos nos
416 estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. **Pesq Vet Bras.**, v.20, n.3, p.119-125,
417 2000.
- 418 Oliveira, P.A.; Ruas, J.L.; Riet-Correa, F.; Coelho, A.C.B.; Santos, B.L.;
419 Marcolongo-Pereira, C.; Sallis, E.S.V.; Schild, A.L. Doenças parasitárias em
420 bovinos e ovinos no sul do Brasil: frequência e estimativa de perdas econômicas.
421 **Pesq Vet Bras.**, v.37, n.8, p.797-801, 2017.
- 422 Paiva, F.; Lemos, R.A.A.; Nakazato, L.; Mori, A.E.; Brum, K.B.; Bernardo, K.C.
423 *Trypanosoma vivax* em bovinos no Pantanal do estado do Mato Grosso do Sul,
424 Brasil: I – Acompanhamento clínico, laboratorial e anatomopatológico de rebanhos
425 infectados. **Rev Bras Parasitol Vet.**, v.9, n.2, p.135-141, 2000.
- 426 Pedroso, P.M.O.; Leal, J.S.; Dalto, A.G.C.; Oliveira, L.G.S.; Driemeier, D. Raiva em
427 bovinos diagnosticados no Setor de Patologia Veterinária da UFRGS, Porto Alegre,
428 RS, Brasil no período de 2002 a 2007. **Acta Scient Vet.**, v.40, n.1, p.1015-1020,
429 2012.
- 430 Pedroso, P.M.O.; Pescador, C.A.; Oliveira, E.C.; Sonne, L.; Bandarra, P.M.;
431 Raymundo, D.L.; Driemeier, D. Intoxicações naturais por plantas em ruminantes
432 diagnosticadas no Setor de Patologia Veterinária da UFRGS no período de 1996-
433 2005. **Acta Scient Vet.**, v.35, n.2, p.213-218, 2007.
- 434 Peixoto, P.V.; Barros, C.S.L. A importância da necropsia em medicina veterinária.
435 **Pesq Vet Bras.** v.18, n.3-4, p.132-134, 1998
- 436 Pessoa, C.R.M.; Medeiros, R.M.T.; Riet-Correa, F. Importância econômica,
437 epidemiologia e controle das intoxicações por plantas no Brasil. **Pesq Vet Bras.**,
438 v.33, n.6, p.752-758, 2013.
- 439 Pinto, A.P.; Santos, B.S.; Ribas, N.L.K.S.; Bacha, F.B.; Carvalho, N.M.; Driemeier,
440 D.; Antoniassi, N.A.B.; Lemos, R.A.A. Nonsuppurative myocarditis associated with
441 bovine viral diarrhoea virus infection in calves in the state of Mato Grosso do Sul,
442 Brazil. **Acta Scient Vet.**, v.41, p.1113, 2013.
- 443 Ramos, A.T.; Souza, A.B.; Norte, D.M.; Ferreira, J.L.M.; Fernandes, C.G. Tumores
444 em animais de produção: aspectos comparativos. **Ciênc Rural**, v.38, n.1, p.148-
445 154, 2008.
- 446 Reis, M.O.; Slaviero, M.; Lorenzetti, M.P.; Cruz, R.A.S.; Guimarães, L.L.B.; Pavarini,
447 S.P.; Driemeier, D.; Sonne, L. Neoplasmas bovinos diagnosticados no Setor de
448 Patologia Veterinária da UFRGS, Porto Alegre (2005-2014). **Pesq Vet Bras.**, v.37,
449 n.2, p.105-109, 2017.
- 450 Ribas, N.L.K.S.; Souza, R.I.C.; Santos, A.C.; Valençola, R.A.; Gouveia, A.F.;
451 Castro, M.B.; Mori, A.E.; Lemos, R.A.A. Doenças do sistema nervoso de bovinos
452 no Mato Grosso do Sul: 1082 casos. **Pesq Vet Bras.**, v.33, n.10, p.1183-1194,
453 2013.

- 454 Rissi, D.R.; Rech, R.R.; Pierezan, F.; Gabriel, A.L.; Trost, M.E.; Brum, J.S.;
455 Kommers, G.D.; Barros, C.S.L. Intoxicações por plantas e micotoxinas
456 associadas a plantas em bovinos no Rio Grande do Sul: 461 casos. **Pesq Vet**
457 **Bras.**, v.27, n.7, p.261-268, 2007.
- 458 Rissi, D.R.; Pierezan, F.; Oliveira-Filho, J.C.; Lucena, R.B.; Carmo, P.M.S.; Barros,
459 C.S.L. Abordagem diagnóstica das principais doenças do sistema nervoso de
460 ruminantes e equinos no Brasil. **Pesq Vet Bras.**, v.30, n.11, p.958-967, 2010.
- 461 Rodrigues, A.; Rech, R.R.; Barros, R.R.; Figuera, R.A.; Barros, C.S.L. Babesiose
462 cerebral em bovinos: 20 casos. **Ciênc Rural**, v.35, n.1, p.121-125, 2005.
- 463 Rondelli, L.A.S.; Silva, G.S.; Bezerra, K.S.; Rondelli, A.L.H.; Lima, S.R.; Furlan,
464 F.H.; Pescador, C.A.; Colodel, E.M. Doenças de bovinos em Mato Grosso
465 diagnosticadas no Laboratório de Patologia Veterinária da UFMS (2005-2014).
466 **Pesq Vet Bras.** v.37, n.5, p.432-440, 2017.
- 467 Salvador, S.C.; Lemos, R.A.A.; Riet-Correa, F.; Roehe, P.M.; Osório, A.L.A.R.
468 Meningoencefalite em bovinos causada por herpesvírus bovino-5 no Mato Grosso
469 do Sul e São Paulo. **Pesq Vet Bras.**, v.18, n.2, p.75-82, 1998.
- 470 Sanches, A.W.D.; Langohr, I.M.; Stigger, A.L.; Barros, C.S.L. Doenças do sistema
471 nervoso central em bovinos no Sul do Brasil. **Pesq Vet Bras.**, v.20, n.3, p.113-118,
472 2000.
- 473 Sant'ana, F.J.F.; Rissi, D.R.; Lucena, R.B.; Lemos, R.A.A.; Nogueira, A.P.A.;
474 Barros, C.S.L. Polioencefalomalacia em bovinos: epidemiologia, sinais clínicos e
475 distribuição das lesões no encéfalo. **Pesq Vet Bras.**, v.29, n.7, p.487-497, 2009.
- 476 Santos, B.S.; Pinto, A.P.; Aniz, A.C.M.; Almeida, A.P.M.G.; Franco, G.L.;
477 Guimarães, E.B.; Lemos, R.A.A. Mortalidade de bovinos zebuínos por hipotermia
478 em Mato Grosso do Sul. **Pesq Vet Bras.**, v.32, n.3, p.204-210, 2012.
- 479 Santos, B.L.; Estima-Silva, P.; Coelho, A.C.B.; Oliveira, P.A.; Soares, M.P.; Sallis,
480 E.S.V.; Bruhn, F.R.P.; Schild, A.L. Doenças do sistema nervoso central de bezerros
481 no sul do Rio Grande do Sul: uma contribuição ao diagnóstico diferencial. **Pesq Vet**
482 **Bras.**, v.38, n.4, p.685-691, 2018.
- 483 Schild, A.L.; Pereira, C.M.; Fiss, L.; Santos, B.L.; Coelho, A.C.B.; Sallis, E.S.V.
484 Doenças diagnosticadas pelo laboratório regional de diagnóstico no ano 2012. In:
485 Ladeira, S.R.L.; Ruas, J.L.; Soares, M.P.; Schild, A.L. **Boletim do laboratório**
486 **regional de diagnóstico**, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, n.35, 64p.,
487 2013.
- 488 Schulz, L.L.; Hayes, D.J.; Holtkamp, D.J.; Swenson, D.A. Economic impact of
489 university veterinary diagnostic laboratories: A case study. **Prev Vet Med.**, v.151,
490 p.5-12, 2018.
- 491 Souza, R.I.C.; Santos, A.C.; Ribas, N.L.K.S.; Colodel, E.M.; Leal, P.V.; Pupin, R.C.;
492 Carvalho, N.M.; Lemos, R.A.A. Doenças tóxicas de bovinos em Mato Grosso do
493 Sul. **Semina: Ciênc Agrár.**, v.36, n.3, p.1355-1368, 2015.
- 494 Terra, J.P.; Blume, G.R.; Rabelo, R.E.; Medeiros, J.T.; Rocha, C.G.N.; Chagas, I.N.;
495 Aguiar, M.S.; Sant'ana, F.J.F. Neurological diseases of cattle in the state of Goiás,
496 Brazil (2010-2017). **Pesq Vet Bras.**, v.38, n.9, p.1752-1760, 2018.
- 497 Thomsen, P.T.; Dahl-Pedersen, K.; Jensen, H.E. Necropsy as a means to gain
498 additional information about cases of dairy cow deaths. **J Dairy Sci.**, v.95, n.10,

499 5798-5803, 2012.

500 **USDA** – United State Department of Agriculture. Livestock and poultry: world
501 markets and trade. 2018. Disponível em
502 https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://apps.fas.usda.gov/PSDOnline/Circulars/2018/06/Livestock_poultry.pdf. Acesso em 21/06/2018 as 08:44.

504 Waldner, C.L.; Kennedy, R.I.; Rosengren, L.; Clark, E.G. A field study of culling and
505 mortality in beef cows from western Canada. **Can Vet J.**, v.50, p.491-499, 2009.

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528 **CAPÍTULO 2 – Doenças de bovinos diagnosticadas em 24 anos**
 529 **(1995-2018) em Mato Grosso do Sul**

530 Artigo a ser submetido na Revista Pesquisa Veterinária Brasileira. Normatizado
 531 segundo periódico Pesquisa Veterinária Brasileira
 532 http://pvb.com.br/instrucoes_aos_autores_14.1.2019.pdf

533

534 **ABSTRACT.-** A retrospective and prospective study of bovine samples evaluated at the Laboratório de
 535 Anatomia Patológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (LAP-UFMS) was carried out. From
 536 January 1995 to December 2018, samples from 5083 necropsies were analyzed and of those, 77.67%
 537 were performed by members outside the laboratory. Conclusive diagnoses were obtained in 46.21% of
 538 the protocols (2349 cases) and of these, approximately 65% were classified as inflammatory or parasitic
 539 diseases, with rabies being the most diagnosed disease. There were a large number of protocols in which
 540 the diagnosis was of non-suppurative encephalitis/meningoencephalitis of unknown cause, being the
 541 two main differentials rabies and bovine herpesvirus-5 meningoencephalitis; that is, the number of
 542 cases of rabies may be even greater. Afterwards, toxic diseases and toxi-infections were the second most
 543 prevalent group and cases of botulism were equivalent to 41%. The other categories corresponded to
 544 about 20% of the total diagnoses and were distributed in decreasing order in: degenerative diseases
 545 (9.79%), caused by physical agents (3.87%), other diseases (2.13%), neoplasias and tumoriform lesions
 546 (1.79%), metabolic or nutritional disorders (1.75%) and malformations (0.64%). The large number of
 547 inconclusive diagnoses is mainly associated with non-representative samples of all organs for
 548 evaluation, autolysis and absence of epidemiological and clinical-pathological information, since almost
 549 90% of these cases corresponded to materials sent by external members to the laboratory.

550

551 INDEX TERMS: retrospective study, cattle diseases, survey, pathology, epidemiology, causes of death

552

553 **RESUMO.-** Realizou-se um estudo retrospectivo e prospectivo das amostras de bovinos avaliadas no
 554 Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (LAP-UFMS) no
 555 período de janeiro de 1995 a dezembro de 2018. Foram analisadas amostras de 5083 necropsias das
 556 quais 77,67% foram realizadas por membros externos ao laboratório. Diagnósticos conclusivos foram
 557 obtidos em 46,21% dos protocolos (2349 casos) e destes, aproximadamente 65% foram classificados
 558 como doenças inflamatórias ou parasitárias sendo a raiva a enfermidade com maior número de
 559 diagnósticos. Houve grande número de protocolos em que o diagnóstico foi de
 560 encefalites/meningoencefalites não supurativas de causa não determinada sendo os dois principais
 561 diferenciais nesses casos a raiva e a meningoencefalite por herpesvírus bovino-5; ou seja, o número de
 562 casos de raiva pode ser ainda maior. Em seguida, doenças tóxicas e toxi-infecções foram o segundo grupo
 563 mais prevalente e os casos de botulismo equivaleram a 41%. As demais categorias corresponderam a
 564 cerca de 20% do total de diagnósticos e distribuíram-se de forma decrescente em: doenças
 565 degenerativas (9,79%), causadas por agentes físicos (3,87%), outras enfermidades (2,13%), neoplasias
 566 e lesões tumoriformes (1,79%), distúrbios metabólicos ou nutricionais (1,75%) e malformações
 567 (0,64%). O grande número de diagnósticos inconclusivos é associado, principalmente, ao não
 568 encaminhamento de fragmentos de todos os órgãos para avaliação, mau acondicionamento das
 569 amostras e ausência de informações epidemiológicas e clínico-patológicas visto que quase 90% desses
 570 casos correspondiam a material encaminhado por membros externos ao laboratório.

571

572 TERMOS DE INDEXAÇÃO: estudo retrospectivo, doenças de bovinos, levantamento, patologia,
 573 epidemiologia, causas de morte

574

575

INTRODUÇÃO

576 A cadeia produtiva da carne é um importante segmento da economia brasileira por ser uma das
 577 principais fontes de produtos de exportação do país. Dessa forma, qualquer fator que possa restringir o
 578 comércio de produtos de origem animal vai resultar em prejuízo econômico (Schulz et al. 2018). Para a
 579 manutenção do cenário de crescimento do agronegócio no Brasil, a garantia do estado sanitário das

580 cadeias produtivas é um dos principais desafios, e o conhecimento das enfermidades que afetam os
581 bovinos de extrema importância para que se alcance o máximo potencial de criação (Lucena et al. 2010).

582 O conhecimento sobre a prevalência das diferentes doenças que afetam o rebanho bovino de
583 uma região é fundamental para que médicos veterinários possam ter em mãos uma lista de diagnósticos
584 diferenciais a ser considerada frente à determinada manifestação clínica, laboratorial ou
585 anatomopatológica (Lucena et al. 2010). Apesar de não existirem muitas variações nas doenças
586 observadas nas áreas de abrangência de cada laboratório de diagnóstico (Rissi et al. 2010),
587 características epidemiológicas podem variar bastante entre as regiões. Ocorrem também, diferenças
588 entre as causas de mortalidade nas diferentes regiões devido ao sistema de criação predominante
589 naquele local (Mello et al. 2017, Rondelli et al. 2017, Santos et al. 2018).

590 Em Mato Grosso do Sul, embora existam estudos abordando doenças de bovinos diagnosticadas
591 no estado (Salvador et al. 1998, Nakazato et al. 2000, Paiva et al. 2000, Brum et al. 2002, Lemos et al.
592 2005, Carvalho et al. 2006, Ferreira et al. 2008, Santos et al. 2012, Carvalho et al. 2013, Pinto et al. 2013,
593 Ribas et al. 2013, Bacha et al. 2014, Carvalho et al. 2014, Souza et al. 2015, Faccin et al. 2016, Heckler et
594 al. 2018, Guizelini et al. 2019, Pupin et al. 2019) não há uma compilação de dados sobre as principais
595 enfermidades que acometem esta espécie. O objetivo do presente trabalho foi determinar a frequência
596 e aspectos epidemiológicos das principais doenças de bovinos diagnosticadas em Mato Grosso do Sul
597 através de estudo retrospectivo dos laudos referentes a amostras de bovinos elaborados entre janeiro
598 de 1995 e dezembro de 2018.

600 MATERIAL E MÉTODOS

601 Foram revisados os laudos do Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal de Mato
602 Grosso do Sul (LAP-UFMS) para seleção dos protocolos de necropsias de bovinos realizadas por
603 membros do LAP-UFMS (aqui identificadas como “N”) ou por veterinários externos (identificadas como
604 “R”) que posteriormente encaminharam amostras para avaliação histológica, entre janeiro de 1995 e
605 dezembro de 2018. Foram excluídos da contagem: (1) amostras provenientes de bovinos sadios que
606 foram encaminhados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) entre os anos de
607 2001 e 2007 para controle de Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE), (2) amostras de experimentos,
608 (3) aqueles provenientes de outros estados que não o Mato Grosso do Sul, (4) aqueles em que foram
609 diagnosticadas condições que não estavam associadas à morte dos bovinos e (5) laudos referentes a
610 amostras coletadas em frigoríficos.

611 Os diagnósticos foram considerados como inconclusivos quando não havia lesões
612 macroscópicas e/ou microscópicas que pudessem ser associadas aos sinais clínicos e à morte dos
613 animais. Os casos com diagnóstico conclusivo foram agrupados semelhantemente ao descrito por
614 Rondelli et al. (2017) em: doenças inflamatórias e parasitárias, tóxicas e toxi-infecções, causadas por
615 agentes físicos, distúrbios metabólicos ou nutricionais, processos degenerativos, malformações,
616 neoplasias e lesões tumoriformes e outras enfermidades.

617 O diagnóstico de botulismo foi realizado com base na existência de sinais clínicos compatíveis
618 associados à epidemiologia e ausência de lesões macroscópicas e microscópicas nos casos em que a
619 necropsia foi realizada pela equipe do LAP-UFMS, ou através da detecção da toxina botulínica neste
620 indivíduo ou em outro do mesmo surto.

621 As principais enfermidades diagnosticadas foram discutidas individualmente.

623 RESULTADOS E DISCUSSÃO

624 Foram incluídos nesse estudo 5083 laudos referentes às necropsias de bovinos das quais 3948
625 foram realizadas por membros externos ao laboratório (77,67%) e 1135 por membros do LAP-FAMEZ
626 (22,33%). Dessas, 2734 tiveram diagnóstico inconclusivo (53,79%) sendo 2459 amostras de necropsias
627 realizadas por veterinários externos ao laboratório (89,94%) e 275 necropsias feitas por membros do
628 LAP. Diagnósticos conclusivos foram obtidos em 46,21% dos protocolos, os quais correspondem ao total
629 de 2349 diagnósticos. A estratificação destes está demonstrada na Figura 1.

630 Fig.1. Classificação das causas de morte de bovinos diagnosticadas entre janeiro de 1995 e dezembro de
631 2018 em Mato Grosso do Sul no LAP-UFMS*.

632

*LAP-UFMS = Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

A porcentagem de diagnósticos inconclusivos foi superior à descrita em estudos no Rio Grande do Sul, em que o valor variou de 14,2 a 37,1% (Lucena et al. 2010, Schild et al. 2013, Mello et al. 2017), e semelhante ao observado no estado de Mato Grosso (Rondelli et al. 2017). Desses casos, quase 90% correspondem a amostras encaminhadas por veterinários externos ao laboratório e são associadas à falta de dados clínicos e epidemiológicos, ao não envio de fragmentos de todos os órgãos para avaliação e também ao mau acondicionamento do material, aspectos semelhantes aos descritos por outros autores (Lemos 2005, Lucena et al. 2010, Rissi et al. 2010, Ribas et al. 2013, Rondelli et al. 2017).

Observou-se uma diminuição gradual ao longo dos anos no número de necropsias realizadas e de amostras encaminhadas ao laboratório, o que já foi mencionado na literatura em relação a um laboratório de diagnóstico oficial de Minas Gerais (Oliveira et al. 2012), no entanto, os autores não descreveram possíveis causas para isso. Esse aspecto demonstra que, apesar de muitas vezes a necropsia ser a única forma de concluir um diagnóstico, por muitas vezes ela é negligenciada (Peixoto & Barros 1998). Um fator que pode contribuir para isso é a impressão que os produtores têm de que os custos associados à investigação *post mortem* são muito altos em comparação aos benefícios. Desse modo, a solicitação de necropsia é mais frequente quando ocorre morte de animais de alto valor comercial, quando o número de mortes é considerado anormal, em investigações de seguros pecuários ou quando há envolvimento judicial (Watson et al. 2008, Waldner et al. 2009), sendo mais comum o envio de fragmentos de vísceras ou amostras para análises clínicas, o que é menos oneroso que o transporte de cadáveres (Watson et al. 2008). Além de tudo, há influência da distância até a propriedade, o que já foi descrito em estudo realizado com rebanhos leiteiros na Suécia (Svensson et al. 2006), e na Inglaterra e País de Gales (Watson et al. 2008) como a principal causa descrita por produtores para o não envio de animais para a necropsia.

Doenças inflamatórias e parasitárias foram as principais causas de morte no presente estudo semelhantemente ao descrito em outros levantamentos no país (Lucena et al. 2010, Assis-Brasil et al. 2013, Mello et al. 2017, Rondelli et al. 2017). As enfermidades desta categoria estão descritas no Quadro 1.

663
664
665**Quadro 1 - Doenças inflamatórias e parasitárias de bovinos diagnosticadas no LAP-UFMS* entre janeiro de 1995 e dezembro de 2018**

Nome da doença/condição	N ^a	%	Nome da doença/condição	N ^a	%
Raiva	489	32,09	Miocardite de causa indeterminada	3	0,2
Meningoencefalite não supurativa de causa indeterminada	319	20,93	Endocardite	3	0,2
Meningoencefalite por herpesvírus bovino	147	9,65	Enterite parasitária	3	0,2
Septicemia	85	5,58	Leptospirose	3	0,2
Tristeza parasitária bovina	84	5,51	Pericardite	3	0,2
Carbúnculo sintomático	57	3,74	Pleurite + pericardite	3	0,2
Pneumonia bacteriana	54	3,54	Pneumonia verminótica	3	0,2
Outras pneumonias	31	2,03	Anemia e hipoproteinemia por carrapatos	2	0,13
Peritonite	24	1,57	Diarreia viral bovina	2	0,13
Osteomielite	21	1,38	Mastite	2	0,13
Babesiose cerebral	21	1,38	Pneumonia fúngica	2	0,13
Salmonelose	18	1,18	Listeriose (sugestivo)	2	0,13
Febre catarral maligna	16	1,05	Abomasite fibrinonecrótica	1	0,07
Enterite de causa não determinada	16	1,05	Abscesso cervical	1	0,07
Abscessos cerebrais	14	0,92	Compressão da traqueia por abscesso	1	0,07
Hemoncose	12	0,79	Edema maligno	1	0,07
Meningoencefalite bacteriana	10	0,66	Infecção fúngica generalizada	1	0,07
Colibacilose entérica	9	0,59	Meningoencefalite por <i>Histophilus somni</i>	1	0,07
Cistite	8	0,52	Meningoencefalite mista	1	0,07
Abscessos hepáticos	7	0,46	Miosite necrossupurativa séptica	1	0,07
Eimeriose	5	0,33	Osteomalácia séptica	1	0,07
Estomatite/esofagite de causa indeterminada	5	0,33	Otite abscedativa	1	0,07
Abscesso de hipófise	5	0,33	Parasitismo por <i>Trichostrongylus</i> sp.	1	0,07
Tuberculose	5	0,33	Pielonefrite e uretrite	1	0,07
Dermatofilose	4	0,26	Pneumonia por BRSV ^b	1	0,07
Meningoencefalite eosinofílica	4	0,26	Rinotraqueíte infecciosa bovina (sugestivo)	1	0,07
Rinite de causa indeterminada	4	0,26	Sugestivo de tripanossomíase	1	0,07
Anaplasmose + salmonelose	4	0,26	TOTAL	1524	100

666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682*LAP-UFMS = Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. ^aN = número de amostras.^bBRSV = vírus respiratório sincicial bovino.

A raiva foi a enfermidade mais frequentemente diagnosticada, semelhante ao descrito em estudos realizados em outros estados do país (Galiza et al. 2010, Rondelli et al. 2017, Terra et al. 2018) e correspondeu a 9,62% dos casos em relação ao total de materiais de necropsias avaliados (realizadas ou não pela equipe do LAP); esse valor é de 20,82% quando consideram-se apenas os casos em que houve diagnóstico conclusivo, e representa aproximadamente 32,09% das doenças inflamatórias e parasitárias. O número é bastante superior ao descrito em estudos realizados no Rio Grande do Sul (Lucena et al. 2010, Schild et al. 2013), nos quais esta correspondeu a 4,67% e 3,67%, respectivamente, dos casos com diagnóstico conclusivo. No Rio Grande do Sul, a principal causa de morte de bovinos foi a intoxicação por *Senecio* spp., que equivaleu a 11,47% dos casos conclusivos (Lucena et al. 2010).

O número de diagnósticos de raiva pode ser bem maior no presente estudo visto que o segundo diagnóstico mais frequente nesta categoria – meningites/meningoencefalites não supurativas de causa não determinada – equivale a 319 casos, e os dois principais diagnósticos diferenciais considerados são raiva e meningoencefalite por herpesvírus tipo 5 (Rondelli et al. 2017). Entre esses diagnósticos, 295 foram baseados em amostras encaminhadas por veterinários externos ao laboratório e em apenas 37

683 destes foram encaminhados fragmentos de cérebro, cerebelo e medula. O não encaminhamento de
 684 encéfalo e medula espinhal para avaliação diminui as chances de diagnóstico de raiva, pois a distribuição
 685 das lesões e a quantidade de antígeno variam em cada região (Bingham & van der Merwe 2002, Bassuino
 686 et al. 2016). O envio de fragmentos de medula espinhal, cerebelo e tronco encefálico, principalmente em
 687 animais que foram eutanasiados, é fundamental para realização do diagnóstico, uma vez que há maior
 688 risco de falsos negativos quando apenas os hemisférios cerebrais são avaliados (Lemos 2005). Além da
 689 medula, envio do complexo GRH (gânglio trigêmeo, *rete mirabile* e hipófise) aumenta a chance de
 690 diagnóstico pois mais de 78% dos bovinos com raiva apresentam ganglioneurite linfoplasmocítica com
 691 ou sem corpúsculos de inclusão (Lima et al. 2005, Rech et al. 2006, Marcolongo-Pereira et al. 2011).
 692 Observou-se redução no número desses diagnósticos (meningoencefalite não supurativa de causa não
 693 determinada) a partir do ano de 2004 e isso provavelmente está associado à publicação pelo Ministério
 694 da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do manual sobre os procedimentos para diagnóstico das
 695 doenças do sistema nervoso central de bovinos (Barros & Figueiredo 2003).

696 Levantamento anteriormente realizado envolvendo doenças neurológicas de bovinos em Mato
 697 Grosso do Sul (Ribas et al. 2013) sugeriu a existência de ciclicidade na ocorrência da enfermidade
 698 durante o período de 2008 a 2012. No entanto, ao avaliar a doença entre 1995 e 2018 observou-se
 699 aumento gradual no número de diagnósticos entre 1995 e 2002, o que foi associado ao aumento no
 700 número de amostras de bovinos avaliadas seguido de diminuição com pequenas oscilações nos anos
 701 subsequentes até 2018, como demonstrado na Figura 2. Semelhantemente ao descrito em um estudo no
 702 Paraná (Dognani et al. 2016), a ocorrência da enfermidade é variável entre os anos, mas a existência de
 703 ciclicidade é questionável e em tal estudo foi considerada de 18 anos, mas não foram esclarecidos os
 704 motivos para isso. Em contrapartida, deve-se considerar que o número de casos diagnosticados não
 705 reflete a ocorrência real dos casos de raiva bovina no estado, já que além dos casos de subnotificação
 706 que ocorrem em todo o país (Dognani et al. 2016, Mello et al. 2019), no presente estudo foram
 707 consideradas apenas as amostras encaminhadas para avaliação histopatológica neste laboratório.

708 Os bovinos diagnosticados com raiva tinham idade entre 30 dias e 16 anos, e maior número de
 709 casos ocorreu nos bezerros de até um ano (35,99%) seguido de bovinos entre 13 e 24 meses (26,17%),
 710 o que é semelhante ao descrito em um estudo realizado na Paraíba (Lima et al. 2005). Tais autores
 711 atribuem a maior ocorrência de casos nessas categorias de idade devido à menor imunidade nos animais
 712 mais jovens, o que pode ser pela não realização do reforço vacinal 30 a 40 dias após a primeira dose ou
 713 pelo atraso na primo-vacinação (recomenda-se a realização da mesma no terceiro ou quarto mês de
 714 vida).

715
 716 Fig. 2. Total de necropsias de bovinos e número de casos de raiva bovina diagnosticados no LAP-UFMS*
 717 entre janeiro de 1995 e dezembro de 2018.

*LAP-UFMS = Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

718
 719
 720
 721
 722

Meningoencefalite por herpesvírus bovino aparece em seguida nessa categoria com 147 casos. Mais de 70% dos animais afetados tinha entre 12 e 24 meses (104), o que corrobora com o descrito na

723 literatura, em que os casos são mais comuns em bovinos jovens (Colodel et al. 2002, Elias et al. 2004,
724 Halfen & Riet-Correa 2007, Galiza et al. 2010, Rissi & Barros 2013, Cagnini et al. 2017, Middleton 2017,
725 Blume et al. 2018). A morbidade é baixa e não ultrapassou 11%. Na grande maioria dos casos não foram
726 informadas situações que pudessem estar associadas a estresse e consequente reativação viral (Halfen
727 & Riet-Correa 2007) como por exemplo desmame, castração, vacinação/vermifugação, mudança de
728 pasto/alimentação e transporte (Rissi et al. 2010, Santos et al. 2018), mas nos casos em que essa
729 informação era descrita, o principal fator mencionado foi o transporte e consequente mistura de animais
730 (13 casos). Outra possibilidade é de que esses casos fossem associados à infecção primária pelo vírus e
731 não pela reativação (Lemos 2005).

732 Achatamento e amarelamento das circunvoluções cerebrais, amolecimento e áreas
733 avermelhadas gelatinosas no cérebro foram descritos em apenas 41% dos casos e são semelhantes aos
734 descritos na literatura (Elias et al. 2004, Rissi et al. 2010, Rissi & Barros 2013, Blume et al. 2018).
735 Observou-se nesse estudo que, em grande número de protocolos, não foi informada nenhuma alteração
736 macroscópica (44), ou em que não foram descritas alterações no encéfalo (50). Dessas amostras, 88%
737 correspondem a necropsias realizadas por veterinários externos ao laboratório, o que contribui para o
738 baixo número de casos com alterações macroscópicas descritas, visto que lesões mais agudas podem ser
739 facilmente negligenciadas (Rissi et al. 2007); além disso, nos casos em que o encéfalo está amolecido,
740 artefatos durante a coleta são mais propensos de ocorrerem e serem interpretados como não lesão.

741 Septicemia foi o sexto diagnóstico mais frequente (85; 3,62% dos casos conclusivos) e
742 aproximadamente 93% dos casos (79) ocorreram em bezerros com idade inferior a 12 meses. Dentro
743 dessa categoria, 44 casos foram em bezerros com até 30 dias de idade, 28 em animais entre 31 e 180
744 dias e apenas cinco naqueles com idade entre seis a 12 meses, demonstrando que esses casos tendem a
745 ocorrer com maior frequência em bezerros jovens. Apenas cinco animais adultos foram acometidos; em
746 dois animais foi possível identificar a fonte da infecção primária – uma vaca tinha mastite grave e a
747 novilha Nelore desenvolveu metrite pós-parto e consequente septicemia. Em um protocolo não foi
748 informada a idade.

749 A realização de cultura constava apenas em 12 dos 85 protocolos e nesses, as bactérias
750 identificadas foram *Escherichia coli* (5), *Pseudomonas* sp. (3), *Streptococcus* sp. (1), *Corynebacterium* sp.
751 (1), *Acinetobacter* sp. (1) e *Trueperella pyogenes* (1). Apesar da baixa porcentagem de exames realizados,
752 os resultados nesses são semelhantes aos descritos na literatura, que descrevem as bactérias gram
753 negativas, especialmente *E. coli*, como os patógenos mais comumente associados a septicemia bacteriana
754 em bezerros (Fecteau & George 2004, Dore & Smith 2017). Quando surtos de septicemia e meningite são
755 descritos em uma propriedade, devem ser investigados fatores de risco ou problemas de manejo como
756 fornecimento de colostro contaminado, cura incorreta do umbigo, superlotação ou ambiente com baixa
757 higiene (Dore & Smith 2017).

758 Os casos de tristeza parasitária bovina constituíram a sétima enfermidade mais frequente
759 equivalendo a 3,58% das causas de morte de bovinos. Esse número é inferior ao descrito no sul do Rio
760 Grande do Sul (Almeida et al. 2006) o que já é esperado para essa doença visto que a região Centro-Oeste
761 é caracterizada por estabilidade enzoótica enquanto a primeira possui instabilidade (Farias 2007). Os
762 casos acometeram bovinos de dois dias de idade até 11 anos e o maior número de zebuínos foi afetado
763 em comparação aos taurinos e cruzamentos, mas isto provavelmente está relacionado a maior
764 predominância de *Bos taurus indicus* nos rebanhos criados em MS visto que não tem sido observada
765 diferença de suscetibilidade entre as espécies (Jonsson et al. 2008). Os aspectos epidemiológicos e
766 clínico-patológicos da babesiose bovina em MS foram abordados em um artigo prévio (Pupin et al.
767 2019).

768 O segundo grupo com maior número de diagnósticos foi o de doenças tóxicas e toxi-infecções
769 correspondendo a 356 diagnósticos. Neste grupo, 41,01% (146) são de botulismo. O diagnóstico foi
770 realizado de forma semelhante ao que é realizado em outros estados do país (Galiza et al. 2010, Schild
771 et al. 2013, Rondelli et al. 2017, Terra et al. 2018). O outro critério de diagnóstico utilizado - detecção da
772 toxina botulínica – não foi utilizado em outros levantamentos prévios (Galiza et al. 2010, Schild et al.
773 2013, Rondelli et al. 2017, Terra et al. 2018). Os diagnósticos desta categoria estão discriminados no
774 Quadro 2. Semelhantemente ao descrito no estado de Mato Grosso (Rondelli et al. 2017), botulismo é a
775 principal doença tóxica diagnosticada, diferentemente do que se descreve no Rio Grande do Sul, onde as
776 intoxicações por plantas são as principais causas tóxicas de morte de bovinos (Lucena et al. 2010, Schild
777 et al. 2013, Santos et al. 2019). A morbidade variou de 0,08% a 64,70%.

778 Os casos ocorreram em formas isoladas e como surtos afetando entre 14 e 1100 bovinos. Foram
779 acompanhados onze surtos, dos quais foram analisadas amostras de 50 bovinos. Dois surtos ocorreram
780 em confinamentos – um associado ao consumo de feno mofado (Soares et al. 2018a) e o outro à ingestão
781 de milho Reidratado contaminado (Guizelini et al. 2019) - e nove em criações extensivas – sete associados

782 a osteofagia e dois a ingestão de água contaminada. Os demais casos de botulismo acometeram, segundo
 783 informações epidemiológicas, entre um e 50 bovinos mas como foi avaliada amostra de apenas um
 784 animal em cada ocorrência, esses não foram agrupados como surtos. A maioria ocorreu em
 785 propriedades de criação extensiva, nas quais havia carcaças e ossos no pasto. Isto corrobora com a
 786 literatura (Lemos 2005, Rondelli et al. 2017) que descreve que nesse tipo de criação, a maioria dos casos
 787 são relacionados à osteofagia, e difere do observado por Galiza et al. (2010) no Nordeste do Brasil, onde
 788 os surtos foram associados, principalmente, à ingestão de cama de frango.

790 **Quadro 2 - Doenças tóxicas e toxi-infecções de bovinos diagnosticadas no LAP-UFMS* entre**
 791 **janeiro de 1995 e dezembro de 2018**
 792

Diagnóstico	Número de casos	%
Botulismo	146	41,01
Intoxicação por <i>Vernonia</i> sp.	53	14,89
Intoxicação por <i>Senna</i> sp.	28	7,87
Fibrose hepática de causa tóxica	23	6,46
Intoxicação por <i>Brachiaria</i> sp.	19	5,34
Tétano	15	4,21
Intoxicação por <i>Amorimia</i> sp.	11	3,09
Nefrose tóxica com cristais de causa não determinada	10	2,81
Nefrose tóxica de causa não determinada	8	2,25
Fotossensibilização de causa não determinada	6	1,69
Intoxicação por <i>Enterolobium contortisiliquum</i>	6	1,69
Intoxicação por polpa cítrica	5	1,4
Intoxicação por sal	4	1,12
Intoxicação por chumbo	4	1,12
Intoxicação por <i>Stryphnodendron fissuratum</i>	4	1,12
Intoxicação por ureia	3	0,84
Intoxicação por abamectina	3	0,84
Intoxicação por amitraz	2	0,56
Intoxicação por mandioca brava (<i>Manihot esculenta</i>)	2	0,56
Intoxicação por <i>Solanum malacoxylon</i>	2	0,56
Intoxicação por <i>Crotalaria</i> sp.	1	0,28
Intoxicação por terramicina	1	0,28
TOTAL	356	100

793 *LAP-UFMS = Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
 794

795 Intoxicação por *Vernonia* sp. representou 2,26% e foi a principal enfermidade tóxica associada
 796 à ingestão de plantas. Do total, 29 casos já foram previamente descritos (Brum et al. 2002). Os casos
 797 restantes ocorreram em animais acima de um ano de idade, e em sete propriedades na forma de surto,
 798 afetando de 17 a 200 animais. Dados epidemiológicos e informações sobre impacto econômico causado
 799 por essa intoxicação já foram descritos (Soares et al. 2018b).

800 As doenças degenerativas compreendem o terceiro grupo de diagnósticos mais frequentes e
 801 foram diagnosticadas apenas duas enfermidades: polioencefalomalacia (205 casos) e necrose muscular
 802 de causa não determinada (25).

803 A polioencefalomalacia foi a principal doença degenerativa, semelhante ao descrito em outras
 804 regiões do Brasil (Lucena et al. 2010, Rondelli et al. 2017), representou mais de 89% dos casos dessa
 805 categoria, e foi o terceiro diagnóstico mais prevalente, correspondendo a 8,73% dos diagnósticos
 806 conclusivos, número bastante superior ao descrito no sul do Rio Grande do Sul (Lucena et al. 2010, Schild
 807 et al. 2013). A morbidade em geral é baixa variando de 0,016 a 23% nos protocolos em que constavam
 808 dados. Nos Estados Unidos, descreve-se que esta enfermidade é um problema comum em bezerros,
 809 principalmente em confinamentos, sendo o grupo de maior risco aquele com idade entre seis e 18 meses
 810 (Dore & Smith 2017). Diferente disto, no presente estudo, a maioria dos diagnósticos foi realizada em
 811 bovinos com idade entre 13 e 36 meses (62%) em criação extensiva, não tendo sido identificadas
 812 etiologias nesses casos, semelhante ao já descrito anteriormente em estudos no Brasil (Lemos 2005,
 813 Rissi et al. 2010, Rondelli et al. 2017, Terra et al. 2018). No entanto, em aproximadamente 70% dos
 814 protocolos não continham nenhuma informação epidemiológica o que definitivamente prejudica a
 815 identificação de possíveis agentes envolvidos.

816 A morte de bovinos devido à hipotermia (35) correspondeu à doença por agente físico mais
 817 frequente, equivalendo a 38,46% dos casos dessa categoria. A grande maioria dos diagnósticos (33) foi
 818 realizada no período entre 2000 e 2010, e já foi previamente descrita (Santos et al. 2012). Os outros dois
 819 casos necropsiados ocorreram em forma de surto numa propriedade na qual, de um total de 500
 820 bovinos, adoeceram 40 e morreram 30. A queda brusca de temperatura no dia anterior às mortes
 821 associada aos sinais clínicos e achados patológicos foram semelhantes aos descritos nos casos
 822 anteriores.

823 Mortes causadas por agentes físicos, distúrbios metabólicos ou nutricionais e malformações
 824 congênicas representaram menor número de diagnósticos e estão descritas nos Quadros 3 - 5.

825 **Quadro 3 – Doenças de bovinos causadas por agentes físicos diagnosticadas no LAP-UFMS* entre**
 826 **janeiro de 1995 e dezembro de 2018**
 827
 828

Diagnóstico	Número de casos	%
Hipotermia	35	38,46
Fratura	14	15,38
Traumatismo	14	15,38
Pneumonia aspirativa	14	15,38
Reticulopericardite/reticuloperitonite traumática	3	3,3
Privação de água	2	2,2
Rumenite fibrinonecrotica por ingestão de substância cáustica	2	2,2
Obstrução de abomaso	2	2,2
Compressão medular por crescimento ósseo	1	1,1
Rumenite ulcerativa por leite	1	1,1
Rumenite traumática	1	1,1
Sablose	1	1,1
Eletrocussão (sugestivo)	1	1,1
TOTAL	91	100

829 *LAP-UFMS = Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
 830

831 **Quadro 4 – Doenças metabólicas e nutricionais de bovinos diagnosticadas no LAP-UFMS* entre**
 832 **janeiro de 1995 e dezembro de 2018**
 833

Diagnóstico	Número de casos	%
Acidose ruminal	10	24,39
Deficiência de cobalto (sugestivo)	7	17,07
Desnutrição	6	14,63
Cetose	6	14,63
Hipocalcemia pós-parto	3	7,32
Indigestão vagal	3	7,32
Timpanismo	3	7,32
Osteomalacia	1	2,44
Deficiência de vitamina E e selênio	1	2,44
Urolitíase e obstrução peniana	1	2,44
TOTAL	41	100

834 *LAP-UFMS = Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
 835
 836

837 **Quadro 5 - Malformações congênitas de bovinos diagnosticadas no LAP-UFMS* entre janeiro de**
 838 **1995 e dezembro de 2018**
 839

Diagnóstico	Número de casos	%
Artrogripose	3	20
Persistência de úraco	2	13,33
Malformações múltiplas	2	13,33
Atresia anal	1	6,67
Defeitos cardíacos múltiplos	1	6,67
Hérnia umbilical	1	6,67
Malformação vaginal	1	6,67
Malformação dos membros torácicos	1	6,67
Palatosquise	1	6,67
Persistência do ducto arterioso	1	6,67
Persistência do arco aórtico	1	6,67
TOTAL	15	100

*LAP-UFMS = Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

840
 841
 842 Neoplasias e lesões tumoriformes diagnosticadas em exames *post mortem* corresponderam a 42
 843 casos (Quadro 6), número muito inferior ao descrito em outros estudos no Rio Grande do Sul (Lucena et
 844 al. 2010, 2011, Reis et al. 2017). Essa diferença é associada, principalmente, ao grande número de casos
 845 de intoxicação crônica por *Pteridium aquilinum* nessa região, a qual induz formação de neoplasmas no
 846 trato alimentar superior (Lucena et al. 2010, 2011) e também à maior incidência de linfomas associados
 847 à infecção pelo vírus da leucose enzoótica bovina (Reis et al. 2017). Além disso, mais de 90% das
 848 amostras avaliadas nos estudos realizados por Lucena et al. (2010, 2011) eram provenientes de bovinos
 849 com aptidão leiteira que permanecem mais tempo no rebanho quando comparados aos animais de corte.
 850 Tal informação é reforçada por outro levantamento no Rio Grande do Sul que considerou apenas vacas
 851 com aptidão leiteira (Mello et al. 2017), no qual as doenças neoplásicas foram a segunda causa mais
 852 frequente de morte, sendo o linfoma o neoplasma mais comum.

853
 854 **Quadro 6 - Neoplasmas e lesões tumoriformes de bovinos diagnosticados no LAP-UFMS* entre**
 855 **janeiro de 1995 e dezembro de 2018**
 856

Diagnóstico	N	%
Leucose enzoótica bovina	9	21,43
Linfoma	6	14,29
Carcinoma de células escamosas	6	14,29
Carcinoma hepatocelular	3	7,14
Carcinoma indiferenciado disseminado	2	4,76
Carcinoma renal	2	4,76
Colangiocarcinoma	2	4,76
Fibrossarcoma	1	2,38
Mesotelioma	1	2,38
Adenocarcinoma indiferenciado no pulmão	1	2,38
Fibromas esofágicos	1	2,38
Lipossarcoma	1	2,38
Meningioma	1	2,38
Metástase de feocromocitoma	1	2,38
Metástase de seminoma	1	2,38
Neuroblastoma olfatório (sugestivo)	1	2,38
Papiloma de plexo coroide	1	2,38
Rabdomiossarcoma embrionário	1	2,38
Sarcoma indiferenciado	1	2,38
TOTAL	42	100

*LAP-UFMS = Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

857
 858
 859 As demais categorias tiveram número baixo de diagnósticos cada uma, sugerindo que as perdas
 860 econômicas decorrentes das mesmas não são significativas no estado. De forma semelhante ao descrito
 861 por Lucena et al. (2010) e por Rondelli et al. (2017), distúrbios nutricionais e metabólicos
 862 corresponderam a uma pequena parcela de diagnósticos, provavelmente devido ao baixo número de

863 diagnósticos de desordens metabólicas pós-parto e distúrbios alimentares quando comparado a outros
864 países, principalmente, devido ao Brasil ser um país onde a criação extensiva é predominante.

865 As enfermidades que não foram possíveis de serem enquadradas em uma das categorias já
866 descritas foram alocadas como “outras enfermidades” e estão descritas no Quadro 7.

867

868 **Quadro 7 – Outras enfermidades de bovinos diagnosticadas no LAP-UFMS* entre janeiro de**
869 **1995 e dezembro de 2018**

870

Diagnóstico	Número de casos	%
Necrose hepática aguda de causa indeterminada	14	28
Insuficiência cardíaca	10	20
Ruptura muscular	4	8
Choque hipovolêmico	4	8
Úlcera abomasal	2	4
Acidente ofídico	2	4
Amiloidose	1	2
Compactação de omaso	1	2
Evisceração e perfuração intestinal	1	2
Hemorragia pulmonar	1	2
Hipomielinogênese	1	2
Insuficiência renal crônica	1	2
Intussuscepção	1	2
Hiperplasia e metaplasia glandular no abomaso	1	2
Necrose da substância branca medular de causa indeterminada	1	2
Megaesôfago	1	2
Senilidade	1	2
Síndrome da veia cava	1	2
Torção de abomaso	1	2
Torção intestinal	1	2
TOTAL	50	100

871

*LAP-UFMS = Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

872

873

CONCLUSÕES

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

As principais causas de morte de bovinos em Mato Grosso do Sul identificadas em 24 anos foram doenças inflamatórias e parasitárias, doenças tóxicas e degenerativas. Os principais diagnósticos foram raiva, meningoencefalite não supurativa de causa indeterminada, polioencefalomalacia, meningoencefalite por herpesvírus bovino e botulismo, todas caracterizadas por sinais clínicos neurológicos. Foi observada diminuição no número de amostras de bovinos avaliadas ao longo dos anos, mas não foi possível identificar causas para isso. Mortes causadas por agentes físicos, distúrbios metabólicos e nutricionais e neoplasias e lesões tumoriformes representaram baixa porcentagem dos casos. Isso é relacionado ao tipo de criação que predomina no estado, caracterizada por criações extensivas com finalidade de corte. O grande número de inconclusivos é associado a falhas na coleta de dados e de amostras, o que demonstra a vulnerabilidade do processo diagnóstico.

885

AGRADECIMENTOS: a toda equipe do laboratório pela contribuição.

886

887

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE: os autores declaram que não há conflito de interesses.

888

889

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

- Almeida M.B., Tortelli F.P., Riet-Correa B., Ferreira J.L.M., Soares M.P., Farias N.A.R., Riet-Correa F. & Schild A.L. 2006. Tristeza parasitária bovina na região sul do Rio Grande do Sul: estudo retrospectivo de 1978-2005. *Pesq. Vet. Bras.* 26(4): 237-242.
- Assis-Brasil N.D., Marcolongo-Pereira C., Hinnah F.L., Ladeira S.R.L., Sallis E.S.V., Grecco F.B. & Schild A.L. 2013. Enfermidades diagnosticadas em bezerros na região sul do Rio Grande do Sul. *Pesq. Vet. Bras.* 33(4): 423-430.
- Bacha F.B., Faccin T.C., Lima S.C., Leal C.R.B., Lemos R.A.A. 2014. Dermatofilose em bezerros da raça Nelore no Mato Grosso do Sul. *Semina: Ciênc. Agrár.* 35(4): 1947-1954.
- Barros C.S.L. & Figueiredo G.H. 2003. Procedimentos para o diagnóstico das doenças do sistema nervoso central de bovinos. MAPA/DAS/DDA, Brasília, 50p.

- 900 Bassuíno D.M., Konradt G., Cruz R.A.S., Silva G.S., Gomes D.C., Pavarini S.P. & Driemeier D. 2016.
 901 Characterization of spinal cord lesions in cattle and horses with rabies: the importance of correct
 902 sampling. *J. Vet. Diagnost. Invest.* 28(4): 455-460.
- 903 Bingham J. & van der Merwe M.V. 2002. Distribution of rabies antigen in infected brain material:
 904 determining the reliability of different regions of the brain for rabies fluorescent antibody test. *J.*
 905 *Virol. Methods.* 101: 85-94.
- 906 Blume G.R., Silva L.F., Borges J.R.J., Nakazato L., Terra J.P., Rabelo R.E., Vulcani V.A.S. & Santa'ana F.J.F.
 907 2018. Caracterização etiológica, epidemiológica e clínico-patológica da meningoencefalite por
 908 herpesvírus bovino em bovinos no Estado de Goiás. *Pesq. Vet. Bras.* 38(5): 902-912.
- 909 Brum K.B., Purisco E., Lemos R.A.A. & Riet-Correa F. 2002. Intoxicação por *Vernonia rubricaulis* em
 910 bovinos no Mato Grosso do Sul. *Pesq. Vet. Bras.* 22(3): 119-128.
- 911 Cagnini D.Q., Andrade D.G.A., Cunha P.H.J., Oliveira-Filho J.P., Amorim R.L., Alfieri A.A. & Borges A.S. 2017.
 912 Retrospective study of bovine herpesvirus 5 meningoencephalitis in cattle from São Paulo state,
 913 Brazil. *Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.* 69(2): 299-304.
- 914 Carvalho N.M., Alonso L.A., Cunha T.G., Ravedutti J., Barros C.S.L. & Lemos R.A.A. 2006. Intoxicação de
 915 bovinos por *Tetrapteryx multiglandulosa* (Malpighiaceae) em Mato Grosso do Sul. *Pesq. Vet. Bras.*
 916 26(3): 139-146.
- 917 Carvalho N.M., Bacha F.B., Santos A.C., Carvalho A.Q., Faccin T.C., Pott A. & Lemos R.A.A. 2013.
 918 Spontaneous and experimental intoxication of cattle by *Simarouba versicolor* A. St.- Hill
 919 (Simaroubaceae). *Toxicon.* 64: 55-59.
- 920 Carvalho A.Q., Carvalho N.M., Vieira G.P., Santos A.C., Franco G.L., Pott A., Barros C.S.L. & Lemos R.A.A.
 921 2014. Intoxicação espontânea por *Senna obtusifolia* em bovinos no Pantanal sul-matogrossense.
 922 *Pesq. Vet. Bras.* 34(2): 147-152.
- 923 Colodel E.M., Nakazato L., Weiblen R., Mello R.M., Silva R.R.P., Souza M.A., Filho J.A.O. & Caron L. 2002.
 924 Meningoencefalite necrosante em bovinos causada por herpesvírus bovino no estado de Mato
 925 Grosso, Brasil. *Ciênc. Rural.* 32(2): 293-298.
- 926 Dognani R., Pierre E.J., Silva M.C.P., Patrício M.A.C., Costa S.C., Prado J.R. & Lisbôa J.A.N. 2016.
 927 Epidemiologia descritiva da raiva dos herbívoros notificados no estado do Paraná entre 1977 e 2012.
 928 *Pesq. Vet. Bras.* 36(12): 1145-1154.
- 929 Dore V. & Smith G. 2017. Cerebral disorders of calves. *Vet. Clin. Food Anim.* 33: 27-41.
- 930 Elias F., Schild A.L. & Riet-Correa F. 2004. Meningoencefalite e encefalomalacia por Herpesvírus bovino-
 931 5: distribuição das lesões no sistema nervoso central de bovinos naturalmente infectados. *Pesq. Vet.*
 932 *Bras.* 24(3): 123-131.
- 933 Faccin T.C., Kommers G.D., Galiza G.J.N., Pupin R.C., Madureira R.C. & Lemos R.A.A. 2016. Chronic liver
 934 disease in cattle associated with ingestion of *Brachiaria* spp. *Ciênc. Rural.* 46(11): 2036-2042.
- 935 Farias N.A. 2007. Tristeza parasitária bovina, p.524-532. In: Riet-Correa F., Schild A.L., Lemos R.A.A.,
 936 Borges J.R.J. (Eds), *Doenças de Ruminantes e Equídeos*. Vol. 2. 3ªed. Pallotti, Santa Maria.
- 937 Fecteau G. & George L.W. 2004. Bacterial meningitis and encephalitis in ruminants. *Vet. Clin. Food Anim.*
 938 20: 363-377.
- 939 Ferreira L.C.L., Flores E.F., Driemeier D., Melo O. & Lemos R.A.A. 2008. Doença das mucosas associada à
 940 dermatite generalizada em bovinos, Mato Grosso do Sul. *Pesq. Vet. Bras.* 28(6): 285-292.
- 941 Galiza G.J.N., Silva M.L.C.R., Dantas A.F.M., Simões S.V.D. & Riet-Correa F. 2010. Doenças do sistema
 942 nervoso de bovinos no semiárido nordestino. *Pesq. Vet. Bras.* 30(3): 267-276.
- 943 Guizelini C.C., Lemos R.A.A., Paula J.P.L., Pupin R.C., Gomes D.C., Barros C.S.L., Neves D.A., Alcântara L.O.B.,
 944 Silva R.O.S., Lobato F.C.F. & Martins T.B. 2019. Type C botulism outbreak in feedlot cattle fed
 945 contaminated silage. *Anaerobe.* 55: 103-106.
- 946 Halfen D.C. & Riet-Correa F. 2007. Infecções por herpesvírus bovino-1 e herpesvírus bovino-5, p. 126-
 947 137. In: Riet-Correa F., Schild A.L., Lemos R.A.A., Borges J.R.J. (Eds), *Doenças de Ruminantes e*
 948 *Equídeos*. Vol.1. 3ª ed. Pallotti, Santa Maria.
- 949 Heckler R.F., Lemos R.A.A., Gomes D.C., Dutra I.S., Silva R.O.S., Lobato F.C.F., Ramos C.A.N. & Brumatti R.C.
 950 2018. Blackleg in cattle in the state Mato Grosso do Sul, Brazil: 59 cases. *Pesq. Vet. Bras.* 38(1): 6-14.
- 951 Jonsson N.N., Bock R.E. & Jorgensen W.K. 2008. Productivity and health effects of anaplasmosis and
 952 babesiosis on *Bos indicus* cattle and their crosses, and the effects of differing intensity of tick control
 953 in Australia. *Vet. Parasitol.* 155: 1-9.
- 954 Lemos R.A.A. 2005. *Enfermidades do sistema nervoso de bovinos de corte das regiões Centro-Oeste e*
 955 *Sudeste do Brasil*. Tese de Doutorado, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho,
 956 Campus Jaboticabal, São Paulo. 150p.
- 957 Lemos R.A.A., Rech R.R., Guimarães E.B., Kadri A. & Dutra I.S. 2005. Febre catarral maligna em bovinos
 958 do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. *Ciênc. Rural.* 35(4): 932- 934.

- 959 Lima E.F., Riet-Correa F., Castro R.S., Gomes A.A.B. & Lima F.S. 2005. Sinais clínicos, distribuição das
960 lesões no sistema nervoso e epidemiologia da raiva em herbívoros na região Nordeste do Brasil. *Pesq.*
961 *Vet. Bras.* 25(4): 250-264.
- 962 Lucena R.B., Pierezan F., Kommers G.D., Irigoyen L.F., Figuera R.A. & Barros C.S.L. 2010. Doenças de
963 bovinos no Sul do Brasil: 6706 casos. *Pesq. Vet. Bras.* 30(5): 428-434.
- 964 Lucena R.B., Rissi D.R., Kommers K.D., Pierezan F., Oliveira-Filho J.C., Macêdo J.T.S.A., Flores M.M. &
965 Barros C.S.L. 2011. A retrospective study of 586 tumors in brazilian cattle. *J. Comp. Path.* 145: 20-24.
- 966 Marcolongo-Pereira C., Sallis E.S.V., Grecco F.B., Raffi M.B., Soares M.P. & Schild, A.L. 2011. Raiva em
967 bovinos na Região Sul do Rio Grande do Sul: epidemiologia e diagnóstico imuno-histoquímico. *Pesq.*
968 *Vet. Bras.* 31(4): 331-335.
- 969 Mello A.K.M., Brumatti R.C., Neves D.A., Alcântara L.O.B., Araújo F.S., Gaspar A.O. & Lemos R.A.A. 2019.
970 Bovine rabies: economic loss and its mitigation through antirabies vaccination. *Pesq. Vet. Bras.* 59(3):
971 179-185.
- 972 Mello L.S., Bianchi M.V., Bandinelli M.B., Sonne L. Driemeier D. & Pavarini S.P. 2017. Causas de morte em
973 vacas leiteiras no Rio Grande do Sul. *Pesq. Vet. Bras.* 37(9): 916-920.
- 974 Middleton J.R. 2017. Cerebral Disorders of the Adult Ruminant. *Vet. Clin. Food Anim.* 33: 43-57.
- 975 Nakazato L., Lemos R.A.A. & Riet-Correa F. 2000. Polioencefalomalacia em bovinos nos estados de Mato
976 Grosso do Sul e São Paulo. *Pesq. Vet. Bras.* 20(3): 119-125.
- 977 Oliveira T.S., Bull V., Rezende C.A., Furtini R., Costa E.A., Paixão T.A. & Santos R.L. 2012. Perfil das
978 amostras do sistema nervoso central de bovinos com síndrome neurológica e diagnóstico da raiva
979 bovina no serviço de defesa sanitária de Minas Gerais, 2003-2010. *Pesq. Vet. Bras.* 32(4): 333-339.
- 980 Paiva F., Lemos R.A.A., Nakazato L., Mori A.E., Brum K.B. & Bernardo K.C. 2000. *Trypanosoma vivax* em
981 bovinos no Pantanal do estado do Mato Grosso do Sul, Brasil: I – Acompanhamento clínico,
982 laboratorial e anatomopatológico de rebanhos infectados. *Revta. Bras. Parasitol. Vet.* 9(2): 135-141.
- 983 Peixoto P.V. & Barros C.S.L. 1998. A importância da necropsia em medicina veterinária. *Pesq. Vet. Bras.*
984 18(3-4): 132-134.
- 985 Pinto A.P., Santos B.S., Ribas N.L.K.S., Bacha F.B., Carvalho N.M., Driemeier D., Antoniassi N.A.B. & Lemos
986 R.A.A. 2013. Nonsuppurative myocarditis associated with bovine viral diarrhoea virus infection in
987 calves in the state of Mato Grosso do Sul, Brazil. *Acta Scient. Vet.* 41: 1113.
- 988 Pupin R.C., Guizelini C.C., Lemos R.A.A., Martins T.B., Borges F.A., Borges D.G.L. & Gomes D.C. 2019.
989 Retrospective study of epidemiological, clinical and pathological findings of bovine babesiosis in
990 Mato Grosso do Sul, Brazil (1995-2017). *Ticks and Tick-borne Dis.* 10: 36-42.
- 991 Rech R.R., Rissi D.R., Silva M.C., Inkelmann M.A. & Barros C.S.L. 2006. Histomorfologia do gânglio de
992 Gasser, da rete mirabile carotídea e da hipófise de bovinos: estudo de 199 casos. *Pesq. Vet. Bras.* 26(2):
993 105-111.
- 994 Reis M.O., Slaviero M., Lorenzetti M.P., Cruz R.A.S., Guimarães L.L.B., Pavarini S.P., Driemeier D. & Sonne
995 L. 2017. Neoplasmas bovinos diagnosticados no setor de Patologia Veterinária da UFRGS, Porto
996 Alegre (2005-2014). *Pesq. Vet. Bras.* 37(2): 105-109.
- 997 Ribas N.L.K.S., Souza R.I.C., Santos A.C., Valença R.A., Gouveia A.F., Castro M.B., Mori A.E. & Lemos
998 R.A.A. 2013. Doenças do sistema nervoso de bovinos no Mato Grosso do Sul: 1082 casos. *Pesq. Vet.*
999 *Bras.* 33(10): 1183-1194.
- 1000 Rissi D.R. & Barros C.S.L. 2013. Necrotizing meningoencephalitis in a cow. *Vet. Pathol.* 50(5): 926-929.
- 1001 Rissi D.R., Pierezan F., Oliveira-Filho J.C., Lucena R.B., Carmo P.M.S. & Barros C.S.L. 2010. Abordagem
1002 diagnóstica das principais doenças do sistema nervoso de ruminantes e equinos no Brasil. *Pesq. Vet.*
1003 *Bras.* 30(11): 958-967.
- 1004 Rissi D.R., Rech R.R., Flores E.F., Kommers G.D. & Barros C.S.L. 2007. Meningoencefalite por herpesvírus
1005 bovino-5. *Pesq. Vet. Bras.* 27(7): 251-260.
- 1006 Rondelli L.A.S., Silva G.S., Bezerra K.S., Rondelli A.L.H., Lima S.R., Furlan F.H., Pescador C.A. & Colodel E.M.
1007 2017. Doenças de bovinos em Mato Grosso diagnosticadas no Laboratório de Patologia Veterinária
1008 da UFMT (2005-2014). *Pesq. Vet. Bras.* 37(5): 432-440.
- 1009 Salvador S.C., Lemos R.A.A., Riet-Correa F., Roehe P.M. & Osório A.L.A.R. 1998. Meningoencefalite em
1010 bovinos causada por herpesvírus bovino-5 no Mato Grosso do Sul e São Paulo. *Pesq. Vet. Bras.* 18(2):
1011 75-82.
- 1012 Santos B.L., Estima-Silva P., Coelho A.C.B., Oliveira P.A., Soares M.P., Sallis E.S.V., Bruhn F.R.P. & Schild
1013 A.L. 2018. Doenças do sistema nervoso central de bezerros no sul do Rio Grande do Sul: uma
1014 contribuição ao diagnóstico diferencial. *Pesq. Vet. Bras.* 38(4): 685-691.
- 1015 Santos B.L., Ladeira S.R.L., Riet-Correa F., Soares M.P., Marcolongo-Pereira C., Sallis E.S.V., Raffi M.B. &
1016 Schild A.L. 2019. Clostridial diseases diagnosed in cattle from the South of Rio Grande do Sul, Brazil.
1017 A forty-year survey (1978-2018) and a brief review of the literature. *Pesq. Vet. Bras.* 39 (In press).

- 1018 Santos B.S., Pinto A.P., Aniz A.C.M., Almeida A.P.M.G., Franco G.L., Guimarães E.B. & Lemos R.A.A. 2012.
1019 Mortalidade de bovinos zebuínos por hipotermia em Mato Grosso do Sul. *Pesq. Vet. Bras.* 32(3): 204-
1020 210.
- 1021 Schild A.L., Pereira C.M., Fiss L., Santos B.L., Coelho A.C.B. & Sallis E.S.V. 2013. Doenças diagnosticadas
1022 pelo laboratório regional de diagnóstico no ano 2012. In: Ladeira S.R.L., Ruas J.L., Soares M.P., Schild
1023 A.L. Boletim do laboratório regional de diagnóstico. Universidade Federal de Pelotas. 35, 64p.
- 1024 Schulz L.L., Hayes D.J., Holtkamp D.J. & Swenson D.A. 2018. Economic impact of university veterinary
1025 diagnostic laboratories: A case study. *Prev. Vet. Med.* 151: 5-12.
- 1026 Soares M.C., Gaspar A.O., Brumatti R.C., Gomes D.C., Neves D.A., Alcântara L.O.B., Leal P.V. & Lemos R.A.A.
1027 2018a. Economic impact of an outbreak of botulism in a cattle feedlot. *Pesq. Vet. Bras.* 38(7): 1365-
1028 1370.
- 1029 Soares M.C., Pupin R.C., Guizelini C.C., Gaspar A.O., Gomes D.C., Brumatti R.C. & Lemos R.A.A. 2018b.
1030 Economic losses due to *Vernonia rubricaulis* poisoning in cattle. *Pesq. Vet. Bras.* 38(12): 2217-2223.
- 1031 Souza R.I.C., Santos A.C., Ribas N.L.K.S., Colodel E.M., Leal P.V., Pupin R.C., Carvalho N.M. & Lemos R.A.A.
1032 2015. Doenças tóxicas de bovinos em Mato Grosso do Sul. *Semina: Ciênc. Agrár.* 36(3): 1355-1368.
- 1033 Svensson C., Linder A. & Olsson S.O. 2006. Mortality in swedish dairy calves and replacement heifers. *J.*
1034 *Dairy. Sci.* 89: 4769-4777.
- 1035 Terra J.P., Blume G.R., Rabelo R.E., Medeiros J.T., Rocha C.G.N., Chagas I.N., Aguiar M.S. & Sant'ana F.J.F.
1036 2018. Neurological diseases of cattle in the state of Goiás, Brazil (2010-2017). *Pesq. Vet. Bras.* 38(9):
1037 1752-1760.
- 1038 Waldner C.L., Kennedy R.I., Rosengren L. & Clark E.G. 2009. A field study of culling and mortality in beef
1039 cows from western Canada. *Can. Vet. J.* 50: 491-499.
- 1040 Watson E.N., David G.P. & Cook A.J.C. 2008. Review of diagnostic laboratory submissions of adult cattle
1041 "found dead" in England and Wales in 2004. *Vet. Rec.* 163: 531-535.

1042 **CAPÍTULO 3 - ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA *Ticks and Tick-***
 1043 ***borne Diseases* com o título “*Retrospective study of***
 1044 ***epidemiological, clinical and pathological findings of bovine***
 1045 ***babesiosis in Mato Grosso do Sul, Brazil (1995-2017)*”**
 1046

Original article

Retrospective study of epidemiological, clinical and pathological findings of bovine babesiosis in Mato Grosso do Sul, Brazil (1995 –2017)

Rayane Chitolina Pupin^{a,*}, Carolina de Castro Guizelini^b, Ricardo Antônio Amaral de Lemos^c,
 Tessie Beck Martins^c, Fernando de Almeida Borges^d, Dyego Gonçalves Lino Borges^d,
 Danilo Carlotto Gomes^c

^a Graduate Program in Veterinary Sciences, School of Veterinary Medicine and Animal Science (FAMEZ), Federal University of Mato Grosso do Sul (UFMS), Campo Grande, MS, Brazil

^b Professional Residency Program in Veterinary Medicine, FAMEZ, UFMS, Campo Grande, MS, Brazil

^c Veterinary Anatomic Pathology Laboratory, FAMEZ, UFMS, Campo Grande, MS, Brazil

^d Veterinary Parasitology Laboratory, FAMEZ, UFMS, Campo Grande, MS, Brazil

1047

1048 **Resumo:** Babesiose é uma doença hemolítica transmitida por carrapatos causada
 1049 por protozoários do gênero *Babesia*. O presente estudo descreve os aspectos
 1050 epidemiológicos, clínicos e patológicos dos casos de babesiose bovina
 1051 diagnosticados ao longo das últimas duas décadas no estado de Mato Grosso do
 1052 Sul, Centro-Oeste do Brasil. Foram examinadas 5298 amostras de bovinos que
 1053 resultaram em 41 diagnósticos confirmados ou sugestivos de babesiose
 1054 provenientes de 33 surtos. *Babesia bovis* foi o principal agente causador da doença,
 1055 e animais de todas as idades foram afetados. Animais de raças zebuínas, que são
 1056 predominantes na região estudada, foram os mais acometidos. Apesar de ser
 1057 sugerido que bovinos zebus são altamente resistentes à infecção, os achados
 1058 deste estudo demonstram que eles podem desenvolver doença grave e morrer em
 1059 virtude da infecção por *Babesia* spp. A doença foi diagnosticada em quase todos
 1060 os anos estudados (1995-2017), no entanto, o número de casos de babesiose é
 1061 baixo quando comparado ao total de casos revisados. Veterinários de campo
 1062 devem ser capazes de reconhecer e diagnosticar esta doença nas fases iniciais

1063 para que o tratamento seja instituído o mais rápido possível e as perdas
1064 econômicas sejam minimizadas.

1065 **Abstract:** Babesiosis is a tick-borne hemolytic disease caused by intraerythrocytic
1066 protozoan parasites of the genus *Babesia*. The present study describes
1067 epidemiological, clinical, and pathological features of cases of bovine babesiosis
1068 diagnosed over the last two decades in the state of Mato Grosso do Sul in central-
1069 western Brazil. Examination of a total of 5298 bovine samples resulted in a definitive
1070 or presumptive diagnosis of babesiosis in 41 cases from 33 outbreaks. *Babesia*
1071 *bovis* was the most common causal agent of bovine babesiosis, and animals of all
1072 ages were affected. Zebu cattle, which are more frequent in the study region than
1073 are taurine cattle, were the cattle most often affected. Although zebu cattle have
1074 been claimed to be highly tolerant, the present findings show that they can develop
1075 severe illness and die due to *Babesia* spp. infection. The disease was diagnosed
1076 almost every year over the time period covered in this study (1995–2017). However,
1077 the number of cases of bovine babesiosis diagnosed was low compared to the total
1078 number of cases reviewed. Veterinary practitioners that work on cattle farms should
1079 to be able to diagnose the disease in its early stages so that treatment can be
1080 initiated promptly and economic losses can be minimized.

1081 **Introduction**

1082 Babesiosis is an infectious disease caused by protozoan parasites of the
1083 genus *Babesia* that infect and replicate exclusively within erythrocytes and induce
1084 hemolytic anemia (Bock et al., 2004; De Vos et al., 2004; Chauvin et al., 2009; Valli
1085 et al., 2017). These hemoprotozoan organism are transmitted mainly by ticks.
1086 Together, babesiosis and anaplasmosis in cattle have been commonly referred to
1087 as “tick fever” (Almeida et al., 2006; Farias, 2007).

1088 The disease has a global distribution and occurs mainly in tropical and
1089 subtropical regions. It is particularly important in Asia, Africa, South America, Central
1090 America, parts of Southern Europe, and Australia (Spickler and Bovine babesiosis,
1091 2008). *Babesia bovis* and *Babesia bigemina* are the species of *Babesia* cause this
1092 economically important disease of cattle in Brazil (De Vos et al., 2004; Farias, 2007)
1093 and other regions around the world (Bock et al., 2004).

1094 Economic losses associated with this disease include not only losses due to
1095 animal death but also losses due to weight losses, reduced feed conversion
1096 efficiency, reduced milk production and abortion. Furthermore, there are losses due
1097 to the control of the disease and its tick vectors, such as veterinary care, acaricidal
1098 baths, vaccination, chemoprophylaxis and treatment of sick animals, and animal
1099 health- related international trade restrictions (Bock et al., 2004; Jonsson, 2006;
1100 Jonsson et al., 2008). A study showed that 62% of the economic losses from
1101 *Babesia* spp. are related to cattle death and the treatment of sick animals and that
1102 the remaining 38% of losses correspond to costs involved in the control of the
1103 disease, including the hiring of veterinarians, drug administration to cattle, and
1104 ancillary diagnostic tests (Guglielmone et al., 1999).

1105 The epidemiological features of diseases affecting cattle may vary greatly
1106 depending on the geographical area where they occur (Rissi et al., 2010).
1107 Retrospective studies can be useful for identifying these features and using them
1108 for the early diagnosis of diseases and disease control, especially by veterinary
1109 practitioners working on large-scale farms (Lucena et al., 2010; Rissi et al., 2010).
1110 In Brazil, retrospective studies on the epidemiology of bovine babesiosis have been
1111 carried out in the states of Rio Grande do Sul in southern Brazil (Rodrigues et al.,
1112 2005; Almeida et al., 2006) and Paraíba in northeastern Brazil (Costa et al., 2011).
1113 Similar research from central-western Brazil has not been published in the
1114 veterinary literature to date.

1115 The purpose of this study is to describe the epidemiological, clinical, and
1116 pathological features of cases of bovine babesiosis diagnosed over the last two
1117 decades (between January 1995 and December 2017) at the Veterinary Anatomic
1118 Pathology Laboratory from School of Veterinary Medicine and Animal Science
1119 (FAMEZ) Federal University of Mato Grosso do Sul (UFMS) in the city of Campo
1120 Grande, state of Mato Grosso do Sul in central-western Brazil. We believe that our
1121 study represents a significant contribution to the understanding and recognition of
1122 this disease in this state, where, unlike in other parts of the country, the majority of
1123 cattle herds comprise cattle of the Nelore breed of cattle. The present retrospective
1124 survey also adds important information to the existing body of scientific knowledge
1125 on the subject.

1126

1127

1128 **Materials and methods**

1129 Pathology records of bovine necropsies performed by members of the
1130 Anatomic Pathology Laboratory of the School of Veterinary Medicine and Animal
1131 Science (LAP-FAMEZ) at the Federal University of Mato Grosso do Sul (UFMS) at
1132 Campo Grande, state of Mato Grosso do Sul, Brazil, or by veterinarian practitioners
1133 in the field were systematically reviewed. This study covered a 23-year period
1134 (between January 1995 and December 2017). Cases with a presumptive or
1135 definitive diagnosis of babesiosis were included in the retrospective data collection.
1136 Medical records of experimental studies, out-of-state animals, and healthy cattle
1137 submitted by the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA) between
1138 2001 and 2007 as part of a surveillance program for Bovine Spongiform
1139 Encephalopathy (BSE) were not included in this retrospective survey.

1140 A definitive diagnosis of bovine babesiosis was made when the following
1141 characteristics were present: (1) gross jaundice, enlarged and yellow liver, enlarged
1142 spleen, dark brown kidneys, and dark urine (Fig. 1A–F); (2) microscopic lesions
1143 characterized by biliary stasis and centrilobular necrosis in the liver (Fig. 2A), acute
1144 tubular necrosis and deposition of orange pigment in kidneys (Fig. 2B); and 3)
1145 presence of intraerythrocytic stages of *Babesia* spp. were found in cytology
1146 preparations of internal organs or on blood smears (or both) screened under the
1147 microscope (Fig. 2C–D). Cerebral babesiosis was diagnosed when pink
1148 discoloration of brain gray matter was present (Fig. 3A–B), either alone or with the
1149 other lesions and was associated with intraerythrocytic stages of *Babesia bovis* in
1150 cytology preparations of the brain (Fig. 3C). A presumptive diagnosis of bovine
1151 babesiosis was made in those cases in which gross and microscopic lesions
1152 consistent with *Babesia* spp. infection, as described above, were present but
1153 piroplasms were not found within red blood cells on cytology touch preparations or
1154 on blood smears examined by light microscopy. Differentiation between *B. bovis*
1155 and *B. bigemina* was based on the morphology and size of merozoites within
1156 erythrocytes. *B. bovis* is smaller than *B. bigemina*, with merozoites measuring up to
1157 2 μm , whereas *B. bigemina* may occupy the entire length of the red blood cell
1158 (Potgieter, 1977).

1159
1160
1161

Fig. 1. Macroscopic lesions of bovine babesiosis. (A,B) – jaundice; (C) – enlarged and yellow liver; (D) – enlarged spleen (E) – dark brown kidney; (F) – dark urine.

1162
 1163
 1164
 1165
 1166

Fig. 2. Cytological findings and microscopic lesions of bovine babesiosis. (A) liver - marked centrilobular vacuolation and biliary stasis, HE; (B) kidney – acute tubular necrosis and deposition of orange pigment, HE; (C) – *Babesia bigemina*, blood smear panoptic staining; (D) – *B. bovis*, blood smear, panoptic staining.

Fig. 3. Cerebral babesiosis. (A–B) pink discoloration of brain gray matter; (C) stasis of erythrocytes parasitized by *B. bovis* in capillary of brain, cytology preparation of brain and panoptic staining.

1167
1168
1169
1170

1171 Each case of bovine babesiosis included in the present study was
1172 chronologically identified by Arabic numbers. Cases of *Babesia* spp. infection in
1173 cattle from the same farm that occurred within a short period and the same time
1174 frame were grouped as an outbreak.

1175 The following data were retrieved from our database and then analyzed:
1176 epidemiological data (time of occurrence of the disease, age of the animals affected,
1177 total number of animals affected, number of sick cattle, number of cattle found
1178 dead), clinical and pathological data (clinical signs and gross lesions), and treatment
1179 data (medication used).

1180 Cattle breeds were divided into the following groups: zebu (Nelore, Brahman,
1181 Gir, Guzera, and Tabapuã), crosses between zebu cattle and taurine cattle
1182 (Girolando, Braford, Brangus, 1/2 Angus x 1/2 Nelore, Senepol, Montana, Canchim,
1183 Bonsmara) and taurine (Jersey, Swiss Pardo, Caracu, Angus, Blond d'aquitaine,

1184 Charolais, Chianina, Hereford, Holstein, Limousin, Marchigiana, Piedmont, and
1185 Simental). Animals of unknown breed origin were assigned to the mixed breed cattle
1186 group. To compare the proportions of zebuine and non-zebuine animals affected by
1187 babesiosis, statistical analysis was performed using a Chi-square test. Data were
1188 considered statistically significant at a p -value ≤ 0.05 .

1189

1190 **Results**

1191 Between January 1995 and December 2017, 11,426 samples of different
1192 animal species were submitted to our laboratory. During this 23-year period, 5298
1193 bovine samples representing 46.36% of the total number of samples were
1194 processed for histopathology. We investigated 33 babesiosis outbreaks involving a
1195 total of 41 animals; 27 out of the 41 animals corresponded to confirmed cases of
1196 bovine babesiosis, of which 21 were diagnosed as having cerebral babesiosis. The
1197 remaining 14 of the 41 animals received a presumptive diagnosis of bovine
1198 babesiosis. Epidemiological data of each outbreak are presented in Table 1.

1199

1200 Table 1. Number of outbreaks of babesiosis diagnosed by the Anatomic Pathology Laboratory,
 1201 School of Veterinary Medicine and Animal Science from 1995 to 2017 in the state of Mato Grosso
 1202 do Sul in central-western Brazil.

Case	Outbreak	Month/ year	Age	Breed	Total number of animals	Sick	Died	Note
1	1	Apr/95	8 months	Nelore	NI*	NI*	NI*	Presumptive
2	2	Jun/99	7 months	NI*	500	3	3	<i>B. bovis</i>
3,4	3	Sep/99	24 months	Mixed	500	78	18	Cerebral babesiosis
5	4	Feb/01	15 days	Caracu	NI*	NI*	NI*	Cerebral babesiosis
6	5	Feb/02	24 months	Mixed	4	3	3	<i>B. bovis</i> e <i>B. bigemina</i>
7	6	Jan/05	9 months	Mixed	55	6	6	Presumptive
8, 9, 10, 11, 12	7	Jul/05	30 months	Nelore	895	194	20	Cerebral babesiosis
13	8	Nov/05	24 months	Brahman	NI*	NI*	NI*	Presumptive
14	9	Jan/06	24 months	Brahman	NI*	NI*	NI*	Presumptive
15	10	Sep/08	24 months	Nelore	NI*	NI*	NI*	Presumptive
16	11	Nov/08	1.5 month	Swiss Pardo	NI*	1	1	Cerebral babesiosis
17	12	Mar/09	2 days	Nelore	500	2	2	Presumptive
18	13	Mar/09	28 months	Nelore	452	10	10	Presumptive
19	14	Jul/09	12 months	Nelore	780	4	3	<i>Babesia</i> sp.
20	15	Oct/09	24 months	Brangus	5000	NI*	1	<i>B. bovis</i>
21	16	Mar/10	26 months	Nelore	1000	10	2	Presumptive
22	17	Mar/10	15 months	Nelore	NI*	1	1	Presumptive
23	18	Aug/10	96 months	Mixed	400	1	1	Presumptive
24	19	Nov/10	15 days	Swiss Pardo	200	1	1	Cerebral babesiosis
25	20	Mar/11	60 months	Jersey	50	4	4	Presumptive
26	21	Mar/11	24 months	Nelore	NI*	NI*	NI*	Cerebral babesiosis
27	22	Jul/11	14 months	Nelore	NI*	NI*	NI*	<i>Babesia</i> sp.
28	23	Aug/11	24 months	Nelore	218	8	7	Presumptive
29	24	Sep/11	12 months	Mixed	2000	1	1	Presumptive
30	25	Dec/11	10 days	Brahman	NI*	NI*	NI*	Presumptive
31, 32	26	Sep/15	15 days	½ Angus ½ Nelore	100	8	7	Cerebral babesiosis
33	27	Oct/15	23 days	Girolando	50	4	1	Cerebral babesiosis
34	28	Dec/15	18 months	Nelore	3500	NI*	NI*	Cerebral babesiosis
35	29	Jan/16	15 months	Braford	82	1	1	Cerebral babesiosis

36, 37, 38	30	Apr/16	36 months	Nelore	NI*	NI*	3	Cerebral babesiosis
39	31	Aug/16	15 days	Girolando	NI*	NI*	NI*	Cerebral babesiosis
40	32	Jul/17	6 months	Nelore	750	1	1	Cerebral babesiosis
41	33	Nov/17	36 months	Holstein	NI*	NI*	NI*	<i>Babesia</i> sp.

1203

1204 *Babesia bovis* was the species of *Babesia* most often found associated with
1205 the disease outbreaks, causing 23 out of the 27 confirmed cases of bovine
1206 babesiosis (85%). Co-infection with *B. bovis* and *B. bigemina* was detected in 1
1207 animal (4%). In 3 outbreaks (11%), the species of *Babesia* responsible for the
1208 disease was not recorded in our pathology reports.

1209 Information regarding the total number of animals affected, the number of
1210 sick animals and the number of animals found dead were lacking in some of the
1211 pathology reports. Information regarding the months of occurrence and the age of
1212 the affected animals are given in Figs. 4 and 5. In outbreaks 3, 7 and 16, treatment
1213 of affected animals was instituted by using the antiprotozoal drug 4,4'-
1214 (diazamino)dibenzamidine.

1215

1216

1217 Fig. 4. Number of outbreaks of babesiosis diagnosed by Anatomic Pathology Laboratory, School of
1218 Veterinary Medicine and Animal Science (Campo Grande, state of Mato Grosso do Sul, central-
1219 western Brazil) from January 1995 until December 2017 according to the month of babesiosis
1220 diagnosis.

1221

1222
1223
1224
1225
1226

Fig. 5. Number of outbreaks of babesiosis diagnosed by Anatomic Pathology Laboratory, School of Veterinary Medicine and Animal Science (Campo Grande, state of Mato Grosso do Sul, central-western Brazil) from January 1995 until December 2017 according to the age of the animals affected.

1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235

Zebu cattle breeds were the breeds most often affected by babesiosis, accounting for 52% of the outbreaks of the disease, of which 14 involved the Nelore breed and 3 involved the Brahman breed. Zebu and taurine crosses were affected in 5 episodes (15%): 2 outbreaks in Girolando, 1 in Brangus, 1 in Angus x Nelore, and 1 in Braford. Specimens from taurine cattle were collected in 5 outbreaks (15%): 1 Caracu, 1 Jersey, 1 Holstein, and 2 Swiss Pardo. In 5 outbreaks (15%), the cattle breed was listed as “mixed” in the pathology reports, and in 1 outbreak (3%), this information was not provided. There was no significant difference in the proportion of animals affected between the zebu and non-zebu breeds ($p = 0.7086$).

1236
1237
1238

The major clinical signs manifested by the affected animals are shown in Table 2. Necropsy findings on these cases are included in Table 3.

1239 Table 2 - Number of outbreaks of babesiosis diagnosed by Anatomic Pathology Laboratory, School
 1240 of Veterinary Medicine and Animal Science (Campo Grande, state of Mato Grosso do Sul, Brazil)
 1241 from 1995 to 2017 and clinical signs.

Clinical sign	Total number of cases	%
Apathy	17	41
Incoordination	16	39
Tremors	10	24
Dark urine	9	21
Behavioral changes/ aggressive behavior	6	15
Blindness	5	12
Drooling	5	12
Opisthotonus	4	10
Icteric mucous membranes	4	10
Paddling	4	10
Tachypnea/ dyspnea	4	10
Pale mucous membranes	4	10
Anorexia	4	10
Wobbling/ circling	4	10
Nystagmus	3	7
Lacrimation, droopy ears, unthrifty, dull, rough haircoat, fever, tachycardia	2	5

1242

1243 Table 3 - Number of outbreaks of babesiosis diagnosed by Anatomic Pathology Laboratory, School
 1244 of Veterinary Medicine and Animal Science (Campo Grande, state of Mato Grosso do Sul, Brazil)
 1245 from 1995 to 2017 and necropsy findings.

Gross lesion (necropsy finding)	Total number of cases	%
Yellow, swollen, enlarged liver	24	59
Dark urine	23	56
Enlarged spleen (splenomegaly)	22	54
Icterus (jaundice)	19	46
Dusky pink discoloration (congestion) of the gray matter of the brain (cerebral cortex, telencephalon)	19	46
Good nutritional status	17	41
Dark kidneys	15	37
Serosal petechiae and ecchymoses	15	37
Pale carcass	13	32
Tick infestation	11	27
Diffuse congestion of all organs	1	2
Not informed	3	7

1246

1247 Discussion

1248 The results of the present study show that bovine babesiosis occurs in cattle
 1249 from the state of Mato Grosso do Sul in central-western Brazil. The disease was
 1250 diagnosed almost every year over the time period covered in this retrospective
 1251 survey (1995–2017). Definitive or presumptive diagnoses of bovine babesiosis
 1252 corresponded to 0.77% of all diagnoses of diseases affecting cattle in Mato Grosso
 1253 do Sul, Brazil, during the period of January 1995 to December 2017.

1254 Most of the outbreaks of bovine babesiosis were due to *B. bovis* infection.
 1255 Similarly, a higher prevalence of this *Babesia* species in cases of babesiosis in cattle

1256 has been reported in previous retrospective studies conducted in Brazil and
1257 elsewhere, including Argentina, Bolivia, and Australia (Guglielmone et al., 1999;
1258 Carrique-Mas et al., 2000; Almeida et al., 2006; Jonsson et al., 2008). The higher
1259 lethality of *B. bovis* in cattle may be because this species is more pathogenic than
1260 *B. bigemina* (Bock et al., 1997, 2004; De Vos et al., 2004; Zintl et al., 2005; Spickler
1261 and Bovine babesiosis, 2008) and may be associated with hypotensive shock,
1262 coagulation disorders, and cytoadherence (Bock et al., 2004; De Vos et al., 2004).
1263 However, a higher prevalence of *B. bigemina* than *B. bovis* was reported in
1264 retrospective surveys of bovine babesiosis in Italy (Cringoli et al., 2002), Egypt
1265 (Elsify et al., 2015; Fereig et al., 2017), and Ethiopia (Abdela et al., 2018). Abdela
1266 et al. (2018) suggested that *B. bigemina* was more prevalent than *B. bovis* in
1267 Ethiopia because *B. bovis* was introduced more recently into the country than was
1268 *B. bigemina*. Fereig et al. (2017) claimed that in Egypt, *B. bigemina* prevails over *B.*
1269 *bovis* because of the greater number of tick vectors capable of transmitting *B.*
1270 *bigemina* than of those capable of transmitting *B. bovis* in that country. Our survey
1271 was based on necropsy and histopathology examinations of tissue samples and not
1272 on serological and PCR analyses of serum and blood samples, which have been
1273 reported in some previous retrospective studies on bovine babesiosis (Carrique-
1274 Mas et al., 2000; Cringoli et al., 2002; Elsify et al., 2015; Fereig et al., 2017).
1275 Therefore, we were unable to determine whether the higher frequency of *B. bovis*
1276 than of *B. bigemina* in cases of bovine babesiosis in the state of Mato Grosso do
1277 Sul is due to the former's higher prevalence in this state or its higher pathogenicity
1278 and lethality.

1279 In the present study, outbreaks occurred during all seasons of the year: 9
1280 outbreaks occurred during the summer, 6 occurred during the autumn, 9 occurred
1281 during the winter, and 9 occurred during the spring. Our findings are similar to
1282 previous from studies on bovine babesiosis conducted in the state of Paraíba in
1283 northeastern Brazil (Costa et al., 2011) and in the state of São Paulo in southeastern
1284 Brazil (Gonçalves et al., 2011). Our findings differ from those reported for the state
1285 of Rio Grande do Sul in southern Brazil, in which no cases of *Babesia* spp. infection
1286 in cattle were diagnosed during the winter (Almeida et al., 2006). Additionally, in
1287 Bolivia, no cases of the disease were recorded in colder and high-altitude areas
1288 (Carrique-Mas et al., 2000). These study differences are related to the influence of
1289 climate on the life cycle of the tick vector. The state of Mato Grosso do Sul, which

1290 lies in the central-western region of the country, has a tropical climate that is
1291 characterized by rainy summers and dry winters (Aw) according to the updated of
1292 Köppen-Geiger climate classification (Kottek et al., 2006). It has monthly average
1293 temperatures above 18 °C and an average precipitation of less than 60 mm for at
1294 least 1 month of the year. Ticks that thrive under such climatic conditions are
1295 therefore able to infest cattle throughout the year (Madruga et al., 2000), increasing
1296 the chance of transmission of *Babesia* to animals by these arthropod vectors.

1297 A similar situation occurs in Karnataka, India, which also has an Aw weather
1298 classification (Kottek et al., 2006), where cases of bovine babesiosis are diagnosed
1299 year-round (Dharaneshha et al., 2017). In Zambia, a *B. bigemina* prevalence close
1300 to zero was reported during the dry season and was associated with a lower number
1301 of ticks infesting cattle than that observed during the rainy season (Simuunza et al.,
1302 2011). This African country has a warm temperate climate with dry winters and hot
1303 summers (Cwa). Average temperatures during the coldest three months of the year
1304 vary from -3 °C to 18 °C (Köppen, 1948). There is a reduction in tick populations at
1305 lower environmental temperatures; as vector numbers in the environment are low
1306 during the colder periods of the year, pathogen transmission rates are decreased
1307 during these periods.

1308 In our retrospective study, the morbidity rate of most outbreaks was less than
1309 5% (11 disease outbreaks) and ranged from 8 to 21.6% in 6 outbreaks. In one of
1310 the outbreaks (outbreak 5), the morbidity rate reached 75%; however, in this area
1311 there were only four cattle in total. In those outbreaks in which early therapy was
1312 instituted, treated animals recovered, and there were reductions in the lethality
1313 rates. Similar outcomes have been described by other authors (Antoniassi et al.,
1314 2009).

1315 All age groups of cattle were affected in the outbreaks studied; 14 outbreaks
1316 involved animals up to 12 months old, and 19 outbreaks involved animals older than
1317 12 months. An outbreak of bovine babesiosis occurred in 2-day-old calves, which
1318 suggested transplacental transmission as previously reported by other researchers
1319 (Yeruham et al., 2003). A higher prevalence of cases of *Babesia* spp. infection in
1320 adult animals than in young animals has also been observed in other regions of
1321 Brazil (Almeida et al., 2006; Antoniassi et al., 2009). In endemic areas, such as Mato
1322 Grosso do Sul in central-western Brazil, disease outbreaks and the deaths of adult
1323 animals are not expected (Gonçalves, 2000). In the present study, the deaths of

1324 animals older than 12 months of age due to babesiosis were likely due to a
1325 disruption of enzootic stability. A number of factors can breakdown the enzootic
1326 stability to babesiosis in a particular region, including poor management of cattle,
1327 which allows tick numbers to escalate and heavy tick infestations to occur, and
1328 declines in antibody levels against *Babesia* spp., as the immunity from exposure to
1329 this pathogen gradually decreases if no tick infestations are found in the herd for a
1330 certain period of time (D'Andrea et al., 2006; Farias, 2007). Other authors have
1331 suggested that even if conditions for the development and maintenance of enzootic
1332 stability to babesiosis are favorable, antigenic variations of the protozoan parasite,
1333 climate changes, variation in animal genotype, and variation in management
1334 strategies may prevent enzootic stability from arising or make it transient (Jonsson
1335 et al., 2012). This scenario could also help explain the occurrence of outbreaks of
1336 bovine babesiosis in adult animals in these areas.

1337 Some studies suggest that calves up to 6 months of age rarely develop
1338 clinical disease because younger animals are naturally resistant to *Babesia* spp.
1339 infection (Bock et al., 2004; De Vos et al., 2004; Chauvin et al., 2009). However, in
1340 our study, there was a large number of cases of bovine babesiosis affecting animals
1341 up to 12 months old, especially calves up to 1 month of age. With the exception of
1342 one outbreak of bovine babesiosis affecting animals that died at the second day of
1343 age and in which *Babesia* spp. was presumably acquired through transplacental
1344 infection, outbreaks of the disease were likely associated with decreasing levels of
1345 colostral antibodies starting at 20 days of age (Gonçalves, 2000; Farias, 2007) and
1346 a high tick load. Animals are most susceptible to infection between 31 and 45 days
1347 of age (Santana et al., 2008).

1348 In our survey, the majority of the cases of bovine babesiosis occurred in zebu-
1349 derived animals, mainly those of the Nelore breed. This finding should be interpreted
1350 with caution since this particular cattle breed outnumbers the other breeds in bovine
1351 herds from the study area (Souza, 2010). There was no statistically significant
1352 difference in the occurrence of babesiosis between zebuine and non-zebuine
1353 animals. These findings demonstrate that all breeds of cattle in the geographic area
1354 studied are susceptible to *Babesia* spp. Although it has been claimed that *Bos*
1355 *indicus* is relatively resistant to tick infestations and to babesiosis (Bock et al., 1997,
1356 1999a, b; Gonçalves, 2000; Bock et al., 2004; De Vos et al., 2004; Almeida et al.,
1357 2006; Jonsson, 2006; Farias, 2007; Jonsson et al., 2008; Spickler and Bovine

1358 babesiosis, 2008; Antoniassi et al., 2009; Costa et al., 2011), they can still develop
1359 severe illness and die due *Babesia* spp. infection.

1360 The higher prevalence of this disease in zebu breeds could be because they
1361 are the predominant cattle breeds in Mato Grosso do Sul, central-western Brazil,
1362 where this study was carried out. The higher prevalence may also be associated
1363 with lower protective antibody levels against *Babesia* spp. In zebu animals than in
1364 *B. taurus* animals raised in the same region (Jonsson et al., 2008).
1365 Seroepidemiological studies have shown that Nelore herds have lower antibody
1366 levels against *Babesia* spp., especially against *B. bigemina*, than do Holstein herds
1367 (D'Andrea et al., 2006), which corroborates these hypotheses. Zebu cattle are highly
1368 efficient in removing tick larvae from their coats during the first 24 h of tick infestation
1369 by licking themselves. Vigorous self-grooming likely interrupts the life cycle of the
1370 tick vector for *B. bigemina*, thereby precluding protozoa infection and, therefore, de-
1371 creasing antibody levels against this piroplasm (D'Andrea et al., 2006; Jonsson et
1372 al., 2008).

1373 An outbreak (outbreak 26) occurred in calves of 50% *Bos indicus* lineages.
1374 Some authors claim that breeding cows of 50% *Bos indicus* heritage can be
1375 expected to give rise to offspring that are more resistant to *Babesia* spp. than are
1376 pure taurine animals. This breeding strategy can be expected to result in a
1377 significant decreases in the number of cases of bovine babesiosis (Bock et al.,
1378 1999a, b; Bock et al., 2004). In contrast, in another study of bovine babesiosis,
1379 animals of 25% *Bos indicus* heritage were affected less often by this disease than
1380 were pure *Bos taurus* animals. However, the inclusion of zebu breeds in cattle
1381 breeding programs is insufficient to reduce the overall economic losses associated
1382 with *B. bovis* infections (Bock et al., 1997). In addition, lower tick infestations in
1383 crossbred cattle results in lower infection rates. As a result, these animals do not
1384 reach a minimum antibody level to achieve enzootic stability (Mahoney et al., 1981).
1385 There is variation in the individual susceptibility of animals to *Babesia* spp. infection
1386 within the same herd and among breeds (Bock et al., 1999a; Benavides and Sacco,
1387 2007). In naive zebu cattle introduced into pastures with large numbers of *Babesia*-
1388 infected ticks, high transmission rates of this pathogen can result in the disease
1389 and/or death of these animals (Bock et al., 1999b, 2004; Jonsson et al., 2008). Such
1390 a scenario occurred in outbreak 28, in which Nelore cattle were moved within the
1391 state of Mato Grosso do Sul from Pantanal to the city of Nova Andradina. This

1392 geographic region is considered an area of enzootic instability due to the floods that
1393 occur during the rainy season (from November to March). Flooding occurs between
1394 30 and 60 days after the onset of moderate to heavy rains (Rodela and Neto, 2007)
1395 and interferes with the development of the free-living stages of the tick, limiting
1396 reproduction of this arthropod.

1397 In the present retrospective study, the clinical signs, necropsy and
1398 microscopic findings of cases of bovine babesiosis diagnosed by our laboratory
1399 were similar to those reported in the veterinary literature (Bock et al., 2004; De Vos
1400 et al., 2004; Rodrigues et al., 2005; Almeida et al., 2006; Farias, 2007; Jonsson et
1401 al., 2008; Spickler and Bovine babesiosis, 2008; Antoniassi et al., 2009).

1402 Although the disease occurred nearly every year during the last 23 years of
1403 diagnostic activities in our laboratory covered in this retrospective survey, the
1404 number of cases of bovine babesiosis diagnosed was low relative to the total
1405 number of cases reviewed. Furthermore, the number of cases was lower than that
1406 reported in the southern region of Brazil (Almeida et al., 2006). Since central-
1407 western Brazil is an endemic area for babesiosis and because southern Brazil has
1408 enzootic instability, a higher number of cases and, consequently, a higher number
1409 of deaths are expected in the latter region. The total number of animals affected in
1410 each outbreak of bovine babesiosis is generally low. However, dis- ease outbreaks
1411 involving large numbers of animals may also occur, e.g., outbreak 3 and outbreak
1412 7. This observation is in agreement with the statement made by Guglielmone in his
1413 review article published in 1995 that outbreaks of babesiosis are often
1414 overestimated. Veterinary practitioners that work at cattle farms should be familiar
1415 with the epidemiology, clinical signs, and necropsy findings of bovine babesiosis
1416 and be able to diagnose the disease in its early stages. Treatment should be initiated
1417 promptly so that the economic losses related to the illness and death of animals can
1418 be minimized between the first manifestations of the disease and the release of
1419 laboratory results.

1420

1421 **Conflict of interest:** The authors declare that they have no competing interests.

1422

1423 **Funding:** This research did not receive any specific grant from funding agencies in
1424 the public, commercial, or not-for-profit sectors.

1425

1426 **References**

- 1427 Abdela, N., Ibrahim, N., Begna, F., 2018. Prevalence, risk factors and vectors
1428 identification of bovine anaplasmosis and babesiosis in and around Jimma town,
1429 Southwestern Ethiopia. *Acta Trop.* 177, 9–18.
- 1430 Almeida, M.B., Tortelli, F.P., Riet-Correa, B., Ferreira, J.L.M., Soares, M.P., Farias,
1431 N.A.R., Riet-Correa, F., Schild, A.L., 2006. Tick fever in southern Brazil: a
1432 retrospective study of 1978-2005. *Pesqui. Vet. Bras.* 26, 237–242 (article
1433 published in Portuguese).
- 1434 Antoniassi, N.A.B., Corrêa, A.M.R., Santos, A.S., Pavarini, S.P., Sonne, L.,
1435 Bandarra, P.M., Driemeier, D., 2009. Cerebral babesiosis outbreak in bovines in
1436 the State of Rio Grande do Sul, Brazil. *Ciênc. Rural.* 39, 933–936 (article
1437 published in Portuguese).
- 1438 Benavides, M.V., Sacco, A.M.S., 2007. Differential *Bos taurus* cattle response to
1439 *Babesia bovis* infection. *Vet. Parasitol.* 150, 54–64.
- 1440 Bock, R.E., De Vos, A.J., Kingston, T.G., McLellan, D.J., 1997. Effect of breed of
1441 cattle in innate resistance to infection with *Babesia bovis*, *B. bigemina* and
1442 *Anaplasma marginale*. *Aust. Vet. J.* 75, 337–340.
- 1443 Bock, R.E., Kingston, T.G., Standfast, N.F., De Vos, A.J., 1999a. Effect of cattle
1444 breed on innate resistance to inoculations of *Babesia bigemina*. *Aust. Vet. J.* 77,
1445 465–466.
- 1446 Bock, R.E., Kingston, T.G., De Vos, A.J., 1999b. Effect of breed of cattle on
1447 transmission rate and innate resistance to infection with *Babesia bovis* and *B.*
1448 *bigemina* transmitted by *Boophilus microplus*. *Aust. Vet. J.* 77, 461–464.
- 1449 Bock, R., Jackson, L., De Vos, A., Jorgensen, W., 2004. Babesiosis of cattle.
1450 *Parasitology* 129, S247–S269.
- 1451 Carrique-Mas, J.J., Widdowson, M.A., Cuéllar, A.M., Ribera, H., Walker, A.R., 2000.
1452 Risk of babesiosis and anaplasmosis in different ecological zones of Santa Cruz
1453 Department. Bolivia. *Vet. Parasitol.* 93, 29–38.
- 1454 Chauvin, A., Moreau, E., Bonnet, S., Plantard, O., Malandrin, L., 2009. *Babesia* and
1455 its hosts: adaptation to long-lasting interactions as a way to achieve efficient
1456 transmission. *Vet. Res.* 40, 1–18.

- 1457 Costa, V.M.M., Rodrigues, A.L., Medeiros, J.M.A., Labruna, M.B., Simões, S.V.D.,
1458 Riet-Correa, F., 2011. Cattle tick fever in the semiarid region of the Brazilian state
1459 of Paraíba. *Pesqui. Vet. Bras.* 31, 239–243 (article published in Portuguese).
- 1460 Cringoli, G., Otranto, D., Testini, G., Buono, V., Di Giulio, G., Traversa, D., Lia, R.,
1461 Rinaldi, L., Veneziano, V., Puccini, V., 2002. Epidemiology of bovine tick-borne
1462 diseases in Southern Italy. *Vet. Res.* 33, 421–426.
- 1463 D’Andrea, L.A.Z., Sartor, I.F., Madruga, C.R., Freitas, S.B.Z., Kroll, L.B., Kronka,
1464 S.N., 2006. Immunological condition of cattle in Holstein and Nelore breed in
1465 regard to *Babesia bovis* and *B. bigemina* in two regions of the state of São Paulo.
1466 *Pesqui. Vet. Bras.* 26, 74–78 (article published in Portuguese).
- 1467 De Vos, A.J., De Wall, D.T., Jackson, L.A., 2004. Bovine babesiosis. In: Coetzer,
1468 J.A.W., Tustin, R.C. (Eds.), *Infectious Diseases of Livestock.*, 2nd ed. Oxford
1469 Southern Africa, South Africa, pp. 406–420.
- 1470 Dharanesha, N.K., Giridhar, P., Byregowda, S.M., Venkatesh, M.D., Ananda, K.J.,
1471 2017. Seasonal prevalence of blood parasitic diseases in crossbreed cattle of
1472 Mysore and its surrounding districts of Karnataka. *J. Parasit. Dis.* 41, 773–777.
- 1473 Elsify, A., Sivakumar, T., Nayel, M., Salama, A., Elkhtam, A., Rizk, M., Mosaab, O.,
1474 Sultan, K., Elsayed, S., Igarashi, I., Yokoyama, N., 2015. An epidemiological
1475 survey of bovine *Babesia* and *Theileria* parasites in cattle, buffaloes, and sheep
1476 in Egypt. *Parasitol. Int.* 64, 79–85.
- 1477 Farias, N.A., 2007. Cattle tick fever. In: 3^a ed. In: Riet-Correa, F., Schild, A.L.,
1478 Lemos, R.A.A., Borges, J.R.J. (Eds.), *Doenças de Ruminantes e equídeos.* 2.
1479 Pallotti, Santa Maria, pp. 524–532 (Chapter published in Portuguese).
- 1480 Fereig, R.M., Mohamed, S.G.A., Mahmoud, H.Y.A.H., AbouLaila, M.R., Guswanto,
1481 A., Nguyen, T., Mohamed, A.E.A., Inoue, N., Igarashi, I., Nishikawa, Y., 2017.
1482 Seroprevalence of *Babesia bovis*, *B. bigemina*, *Trypanosoma evansi*, and
1483 *Anaplasma marginale* antibodies in cattle in Southern Egypt. *Ticks Tick Borne*
1484 *Dis.* 8, 125–131.
- 1485 Gonçalves, P.M., 2000. Epidemiology and control of bovine babesiosis and
1486 anaplasmosis in Southeast region of Brazil. *Ciênc. Rural.* 30, 187–194 (article
1487 published in Portuguese).
- 1488 Gonçalves, R.C., Silva, A.A., Ferreira, D.O.L., Chiacchio, S.B., Lopes, R.S., Borges,
1489 A.L., Amorim, R.M., 2011. Tick fever in cattle in the region of Botucatu – SP: a

- 1490 retrospective study of 1986-2007. *Semina Ciênc. Agrárias*. 32, 307–312 (article
1491 published in Portuguese).
- 1492 Guglielmone, A.A., 1995. Epidemiology of babesiosis and anaplasmosis in South
1493 and Central America. *Vet. Parasitol.* 57, 109–119.
- 1494 Guglielmone, A.A., Aguirre, D.H., Späth, E.J.A., Gaido, A.B., Mangold, A.J., Ríos,
1495 L.G., 1999. Long-term study of incidence and financial loss due to cattle
1496 babesiosis in a Argentinian dairy farm. *Prev. Vet. Med.* 12, 307–312.
- 1497 Jonsson, N.N., 2006. The productivity effects of cattle tick (*Boophilus microplus*)
1498 infestation on cattle, with particular reference to *Bos indicus* cattle and their
1499 crosses. *Vet. Parasitol.* 137, 1–10.
- 1500 Jonsson, N.N., Bock, R.E., Jorgensen, W.K., 2008. Productivity and health effects
1501 of anaplasmosis and babesiosis on *Bos indicus* cattle and their crosses, and the
1502 effects of differing intensity of tick control in Australia. *Vet. Parasitol.* 155, 1–9.
- 1503 Jonsson, N.N., Bock, R.E., Jorgensen, W.K., Morton, J.M., Stear, M.J., 2012. Is
1504 endemic stability of tick-borne disease in cattle a useful concept? *Trends*
1505 *Parasitol.* 28, 85–89.
- 1506 Köppen, W., 1948. *Climatology With a Study of the Climates of the Earth*. México,
1507 496 p. (article published in Spanish).
- 1508 Kottek, M., Grieser, J., Beck, C., Rudolf, B., Rubel, F., 2006. World Map of the
1509 Köppen-Geiger climate classification updated. *Meteorol. Zeith.* 15, 259–263.
- 1510 Lucena, R.B., Pierezan, F., Kommers, G.D., Irigoyen, L.F., Figuera, R.A., Barros,
1511 C.S.L., 2010. Diseases of cattle in southern Brazil: 6.706 cases. *Pesqui. Vet.*
1512 *Bras.* 30, 428–434 (article published in Portuguese).
- 1513 Madruga, C.R., Araújo, F.R., Marques, A.P.C., Carvalho, C.M.E., Cusinato, F.Q.,
1514 Crocci, A.J., Kessler, R.H., Miguita, M., 2000. Development of an enzyme-linked
1515 immunosorbent assay for the detection of antibodies against *Babesia bovis*.
1516 *Pesqui. Vet. Bras.* 20, 167–170 (article published in Portuguese).
- 1517 Mahoney, D.F., Wright, I.G., Goodger, B.V., Mirre, G.B., Sutherst, R.W., Utech,
1518 K.B.W., 1981. The transmission of *Babesia bovis* in herds of European and Zebu
1519 x European cattle infested with the tick, *Boophilus microplus*. *Aust. Vet. J.* 57,
1520 461–469.
- 1521 Potgieter, F.T., 1977. *The Life Cycle of Babesia bovis and Babesia bigemina in*
1522 *Ticks and in Cattle in South Africa [PhD Thesis]*. Rand Afrikaans University,
1523 Johannesburg.

- 1524 Rissi, D.R., Pierezan, F., Oliveira-Filho, J.C., Lucena, R.B., Carmo, P.M.S., Barros,
1525 C.S.L., 2010. Diagnostic approaches for the main neurological diseases of
1526 ruminant and horses in Brazil. *Pesqui. Vet. Bras.* 30, 958–967 (article published
1527 in Portuguese).
- 1528 Rodela, L.G., Neto, J.P.Q., 2007. Climate seasons on Nhecolândia Pantanal, Mato
1529 Grosso do Sul state. Brazil. *Rev. Bras. Cartografia.* 59, 101–113 (article
1530 published in Portuguese).
- 1531 Rodrigues, A., Rech, R.R., Barros, R.R., Figuera, R.A., Barros, C.S.L., 2005.
1532 Cerebral babesiosis in cattle: 20 cases. *Ciênc. Rural.* 35, 121–125.
- 1533 Santana, A.P., Linhares, G.F.C., Murata, L.S., Bernal, F.E., Torres, F.A., Madruga,
1534 C.R., 2008. Dinamic of natural infection in newborn calves exposed to by *Babesia*
1535 *bigemina* as detected by polymerase reaction chain. *Ciênc. Anim. Bras.* 9, 721–
1536 730 (article published in Portuguese).
- 1537 Simuunza, M., Weir, W., Courcier, E., Tait, A., Shiels, B., 2011. Epidemiological
1538 analysis of tick-borne diseases in Zambia. *Vet. Parasitol.* 175, 331–342.
- 1539 Souza, C.B.M., 2010. Beef cattle in state Mato Grosso do Sul: Evolution and
1540 competitiveness. [Master thesis]. Universidade Estadual de Campinas,
1541 Campinas (published in Portuguese).
- 1542 Spickler, A.R., Bovine babesiosis. 2008.
1543 <http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/factsheets.php> (accessed 30 October
1544 2017).
- 1545 Valli, V.E.O., Kiupel, M., Bienzle, D., 2017. Hematopoietic system. In: 6th ed. In:
1546 Maxie, M.G. (Ed.), Jubb, Kennedy, and Palmer's – Pathology of Domestic
1547 Animals 3. Elsevier, St. Louis, pp. 117–120.
- 1548 Yeruham, I., Avidar, Y., Aroch, I., Hadani, A., 2003. Intra-uterine infection with
1549 *Babesia bovis* in a 2-day-old calf. *J. Vet. Med.* 50, 60–62.
- 1550 Zintl, A., Gra, J.S., Skerret, H.E., Mulcahy, G., 2005. Possible mechanisms
1551 underlying age-related resistance to bovine babesiosis. *Parasite Immunol.* 27,
1552 115–120.
- 1553

1554 **CAPÍTULO 4 – artigo publicado na revista Acta Scientiae**
1555 **Veterinariae com o título “*Photosensitization in cattle caused by***
1556 ***spontaneous and experimentally ingestion of Stryphnodendron***
1557 ***fissuratum*”**

Acta Scientiae Veterinariae, 2018. 46: 1542.

RESEARCH ARTICLE
Pub. 1542

ISSN 1679-9216

**Photosensitization in Cattle Caused by Spontaneous and
Experimentally Ingestion of *Stryphnodendron fissuratum***

Neylisa Dario Lazaro¹, Flavia Barbieri Bacha², Rayane Chitolina Pupin³, Juliana Paniago Lordello de Paula³,
Paula Velozo Leal³, Arnildo Pott⁴, Danilo Carloto Gomes⁵ & Ricardo Antônio Amaral de Lemos⁵

1558

1559 **Resumo: *Introdução:*** *Stryphnodendron fissuratum* é uma árvore do cerrado
1560 brasileiro cujo fruto é tóxico para bovinos podendo causar sinais clínicos digestivos,
1561 fotossensibilização hepatógena e abortos. Intoxicação experimental já foi
1562 reproduzida em bovinos, caprinos e porquinhos-da-índia; no entanto,
1563 fotossensibilização não pôde ser reproduzida. O objetivo deste trabalho foi
1564 descrever um surto de intoxicação natural e a intoxicação experimental, ambos
1565 cursando com fotossensibilização hepatógena. ***Materiais, métodos & resultados:***
1566 no surto natural, três bovinos na fase aguda e três na fase crônica foram
1567 examinados. Amostras de sangue foram coletadas desses animais para
1568 mensuração dos níveis séricos de aspartato aminotransferase (AST), gama-
1569 glutamiltransferase (GGT), ureia e creatinina. Os primeiros três bovinos foram
1570 submetidos a necropsia e avaliação histopatológica. Para a reprodução
1571 experimental, foram utilizados dois bezerros de nove meses de idade que
1572 receberam, por via oral, uma pasta feita a partir dos frutos triturados de *S.*
1573 *fissuratum* misturados com água. Esses frutos haviam sido coletados em uma
1574 propriedade na qual estavam ocorrendo casos de intoxicação em bovinos.
1575 Amostras de sangue foram coletadas para mensuração sérica de AST, GGT, ureia
1576 e creatinina, antes do início da administração da planta e depois diariamente
1577 durante todo o período experimental. Biopsia de pele foi realizada antes do início
1578 do experimento e uma segunda foi feita após os primeiros sinais de lesão cutânea.
1579 O surto natural afetou 52 bovinos de um lote de 160 (31 bezerros e 21 vacas). Dois
1580 bezerros e 14 vacas morreram. Clinicamente havia depressão, ataxia,

1581 incoordenação, alterações comportamentais, decúbito e morte. Um animal que
1582 morreu e outros 36 que se recuperaram desenvolveram fotodermatite. Os achados
1583 de necropsia foram estado corporal ruim, rins pálidos, fígado com padrão lobular
1584 evidente, conteúdo ruminal ressecado e bexiga repleta. Em dois animais, sementes
1585 dos frutos foram encontradas no rúmen, e em um animal havia também úlceras no
1586 abomaso e edema transmural neste órgão. Microscopicamente, nos rins havia leve
1587 a moderada dilatação dos túbulos, acúmulo de material proteináceo no lúmen
1588 tubular além de tumefação e necrose epiteliais leves. No fígado, tumefação dos
1589 hepatócitos e moderada retenção biliar. Os valores das enzimas hepáticas e renais
1590 em todos os animais estavam acima dos considerados normais para a espécie.
1591 Experimentalmente, ambos os bezerros adoeceram e um morreu. Os sinais clínicos
1592 foram apatia, inapetência, andar cambaleante, perda de peso e pelos arrepiados.
1593 Um deles apresentou também icterícia, lacrimejamento, fotofobia, desprendimento
1594 da pele das orelhas, úlceras no focinho, narinas e face ventral da língua. Esse
1595 animal foi eutanasiado *in extremis* e os achados de necropsia foram icterícia
1596 generalizada, fígado aumentado e com padrão lobular evidente, bile espessa, rins
1597 pálidos e úlceras no esôfago, língua e epiglote. Microscopicamente, as lesões
1598 foram similares às descritas no surto natural. A biopsia de pele do bezerro que se
1599 recuperou evidenciou edema perivascular e eosinofilia leve. **Discussão:** o
1600 diagnóstico foi feito com base nos achados epidemiológicos, sinais clínicos,
1601 achados de necropsia e lesões microscópicas. Experimentalmente, a planta foi
1602 tóxica nas doses administradas. Fotossensibilização foi o sinal clínico mais comum
1603 durante o surto natural e, até agora, nunca tinha sido reproduzida
1604 experimentalmente. Baseado nas lesões histopatológicas, pode-se considerar que
1605 esta seja de origem hepatógena. Os resultados do presente estudo mostraram que
1606 as lesões renais possuem importante papel na patogênese dessa intoxicação e na
1607 evolução dos casos

1608 **Abstract: Background:** *Stryphnodendron fissuratum* is a tree from the Brazilian
1609 Cerrado. Its fruit is toxic to cattle and can cause clinical digestive signs,
1610 hepatogenous photosensitization, and abortion. Cases of poisoning in cattle, goats
1611 and guinea pigs have been experimentally reproduced; however, photosensitization
1612 could not be reproduced. The aim of this work was to describe an outbreak of natural
1613 poisoning and experimental reproduction in cattle, both with hepatogenous

1614 photosensitization. **Materials, Methods & Results:** Its described and natural
1615 outbreak and an experimental poisoning. In the outbreak, three bovines in the acute
1616 phase and three in the chronic phase were examined. Blood samples were collected
1617 from all of these animals in order to measure serum levels of aspartate
1618 aminotransferase (AST), gamma-glutamyl transferase (GGT), urea, and creatinine.
1619 The first three animals underwent necropsy and histopathological evaluation. The
1620 experiment was conducted with two nine-month-old calves that received an oral
1621 paste made with crushed *S. fissuratum* fruits mixed with water. These fruits were
1622 collected at a farm at which cattle poisoning cases had occurred. Blood samples
1623 were collected in order to measure serum levels of AST, GGT, urea, and creatinine,
1624 before plant administration and then daily during the experimental period. Skin
1625 biopsies were taken before plant administration and new one after the first signs of
1626 skin lesions. The natural outbreak affected 52 of 160 bovine (31 calves and 21 cows)
1627 in the lot. Two calves and 14 cows died. Clinical signs consisted of depression,
1628 ataxia, incoordination, behavioral changes, decubitus, and death. One animal that
1629 died and 36 others that recovered had photodermatitis. Necropsy findings in the
1630 animals consisted of bad corporal condition, pale kidneys, evidence of liver lobular
1631 pattern, dry rumen contents, and full bladder. In two animals, fruit seeds were found
1632 in the rumen, and one animal had ulcers and transmural edema in the abomasum.
1633 Microscopically, mild to moderate renal tubular distension, accumulation of
1634 proteinaceous material in lumen with mild to moderate swelling, and epithelial
1635 necrosis. In the liver, swelling of hepatocytes and moderate bile stasis was detected.
1636 Enzymes values in all evaluated bovines were higher than those considered normal
1637 for the species. Experimentally, both calves became ill and one died. The clinical
1638 signs were apathy, inappetence, wobbling, weight loss, and goosebumps. One of
1639 them had jaundice, tearing, photophobia, ear skin detachment, and ulcers at the
1640 muzzle, nostrils and ventral face of the tongue. This animal was euthanized *in*
1641 *extremis*, and the necropsy findings showed generalized jaundice, evidence of
1642 increased liver lobular pattern, thick bile, pale kidneys, and esophageal, tongue, and
1643 epiglottal ulcers. Microscopically, the lesions were similar to those described during
1644 the natural outbreak. The skin biopsy from the calf that recovered showed
1645 perivascular edema and mild eosinophilia. **Discussion:** The diagnosis was made
1646 based on clinical signs, necropsy findings, histopathological lesions, and epidemio-
1647 logical analysis. Experimentally, the plant was toxic at the administered doses.

1648 Photosensitization was the most common clinical sign during the natural outbreak
1649 and until now, has never been experimentally reproduced. Based on histopathologi-
1650 cal lesions observed in this study, we can consider that is from hepatogenous origin.
1651 The results showed that the kidney lesions have an important role during the
1652 pathogenesis caused by this poisoning and during disease evolution.

1653 **Introdução**

1654 O *Stryphnodendron fissuratum* é uma árvore nativa do cerrado pertencente
1655 a família *Fabaceae* e Subfamília *Mimosoideae*, que mede até 20 m de altura [14].
1656 Por apresentar favas acastanhadas e retorcidas, é popularmente conhecida como
1657 “rosquinha” [18]. A frutificação e a queda dos frutos ocorrem durante a estação
1658 seca, entre os meses de julho e setembro [5,6]. A ocorrência de surtos da
1659 intoxicação pode causar importantes perdas econômicas, pois os coeficientes de
1660 morbidade e letalidade podem alcançar valores de até 16.6% e 53.3%,
1661 respectivamente [5].

1662 Os frutos são considerados a parte tóxica da planta [18], ocorrendo a
1663 intoxicação espontânea quando caem ao solo e são ingeridos pelos bovinos
1664 [5,10,11]. A intoxicação espontânea está associada a sinais clínicos digestivos,
1665 fotossensibilização e abortos em bovinos [6,19]; apenas um grupo de autores des-
1666 creveu lesões renais [5].

1667 O *S. fissuratum*, em experimentos, demonstrou-se tóxico para bovinos
1668 [5,18], caprinos [2,13] e porquinhos-da-índia [12], mas não reproduziu lesões de
1669 fotossensibilização em nenhuma das espécies citadas [2,5,13,18].

1670 O objetivo do presente trabalho foi descrever fotossensibilização hepatógena
1671 em bovinos causada pela ingestão espontânea e experimental de frutos de
1672 *Stryphnodendron fissuratum*.

1673

1674 **MATERIAIS E MÉTODOS**

1675 *Surto espontâneo*

1676 Os dados epidemiológicos e clínicos foram obtidos através da entrevista com
1677 o médico veterinário e o funcionário responsáveis pelos bovinos. Para o cálculo dos
1678 níveis de morbidade considerou-se a população exposta a planta, ou seja, os
1679 animais do lote afetado.

1680 Para a caracterização do quadro clínico foram examinados três bovinos na
1681 fase aguda (Bovinos 1, 2 e 3) e outros três em fase de recuperação (Bovinos 4, 5
1682 e 6). Amostras de sangue total para obtenção de soro foram colhidas dos bovinos
1683 na fase aguda - que foram os três animais necropsiados - e de três animais em fase
1684 de recuperação. Avaliou-se aspartato aminotransferase (AST), γ -
1685 glutamiltransferase (GGT), ureia e creatinina utilizando-se kits comerciais (Roche
1686 Cobas C11)¹. Amostras da planta foram enviadas para o setor de botânica da
1687 UFMS para identificação.

1688 Três bovinos, todos em fase aguda, foram necropsiados e fragmentos de
1689 diferentes órgãos e também músculo esquelético foram coletados, os quais foram
1690 fixados em formol e posteriormente processados e corados rotineiramente em
1691 hematoxilina e eosina. Fragmentos de córtex, tálamo, cerebelo e medula espinhal
1692 foram coletados refrigerados e encaminhados para realização de exames de
1693 imunofluorescência direta (IFD) e inoculação intracerebral em camundongos (ICC)
1694 para diferencial de raiva.

1695

1696 *Intoxicação experimental*

1697 Realizou-se um experimento com administração de frutos colhidos em uma
1698 fazenda localizada no Estado do Mato Grosso do Sul, na qual estavam ocorrendo
1699 casos de intoxicação por *S. fissuratum* em bovinos no mês de agosto. De um total
1700 de 202 bovinos, adoeceram oito e morreram quatro. Os animais recuperados
1701 manifestaram fotossensibilização.

1702 As favas colhidas foram levadas para a Universidade Federal do Mato
1703 Grosso do Sul (UFMS) onde foram armazenadas em balcão coberto, arejado e
1704 seco, por 30 dias até o início do experimento. Amostras da planta contendo folhas
1705 e frutos foram encaminhados para a classificação no Laboratório de Botânica da
1706 UFMS.

1707 Os animais foram alimentados com ração comercial (MACAL NUTRA 16)²,
1708 sal mineral (MACAL P68)², água *ad libitum* e pastagem verde de *Pennisetum*
1709 *purpureum* (Napier) e *Paspalum notatum* (grama mato grosso) fornecidas no cocho
1710 trituradas.

1711 Dois bezerros machos, mestiços, de nove meses de idade - identificados
1712 como bezerro #1 e bezerro #2 - foram utilizados. Os frutos foram triturados e

1713 misturados com água afim de adquirir consistência pastosa, sendo essa pasta
 1714 administrada por via oral utilizando uma seringa plástica. O delineamento
 1715 experimental está descrito na Tabela 1.

1716

1717 Tabela 1 – Intoxicação experimental por *Stryphnodendron fissuratum* em bezerros. Delineamento
 1718 experimental – dose diária, período de administração (dias), início dos sinais clínicos e evolução.

Bezerro	Dose diária (g/kg PV)	período de administração (dias)	Início dos sinais (dias de adm.)	Evolução
1	1,0	13	2	Recuperação
2	2,0	10	3	Eutanásia <i>in extremis</i>

1719

1720 As doses utilizadas foram calculadas baseando-se em trabalhos
 1721 anteriormente realizados em bovinos nos quais ocorreram quadros agudos e
 1722 evolução fatal [5,18]. Estas doses foram reduzidas visando a reprodução de
 1723 quadros com evolução prolongada, na tentativa de reproduzir a fotossensibilização.
 1724 Antes do início dos experimentos, os bezerros foram submetidos à avaliação
 1725 clínica, pesagem, desverminação e coleta de sangue venoso através de punção na
 1726 veia jugular para realização de hemograma e mensuração dos níveis séricos de γ -
 1727 glutamiltransferase (GGT), aspartato aminotransferase (AST), ureia e creatinina
 1728 utilizando kits comerciais (Roche Cobas C111)¹. Coleta de sangue e dosagem das
 1729 enzimas continuaram sendo realizadas diariamente após o início do experimento.

1730 Fragmentos de pele foram colhidos dos bezerros #1 e #2, um dia antes do
 1731 início da administração. Após a manifestação dos primeiros sinais de lesão cutânea
 1732 - pelos arrepiados e quebradiços - novas biopsias foram realizadas na mesma
 1733 região que a primeira, com proximidade de 5 cm da coleta anterior. Os fragmentos
 1734 colhidos foram fixados em formol a 10% e processados para avaliação histológica
 1735 em microscópio de luz.

1736 Bovinos que apresentaram evolução fatal foram necropsiados, sendo
 1737 coletados fragmentos de todos os órgãos que foram fixados em formol a 10% e pro-
 1738 cessados rotineiramente para avaliação histopatológica.

1739 O experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA
 1740 da UFMS sob o protocolo no 400/2012.

1741 Para avaliação dos exames bioquímicos, os valores de referência
1742 considerados normais para a espécie bovina foram: (1) AST 78 - 132 U/L, (2) GGT
1743 6.1 a 17 U/L, (3) ureia 20 - 30 mg/dL, (4) creatinina 1 - 2 mg/dL [7].

1744

1745 **RESULTADOS**

1746 *Intoxicação espontânea*

1747 O surto ocorreu em uma propriedade no município de Rio Verde do Mato
1748 Grosso (MS) que continha um rebanho total de 360 bovinos e possuía baixa oferta
1749 de forragem. O lote afetado era composto de 160 vacas e bezerros, dos quais
1750 adoeceram 52 animais, sendo 31 bezerros e 21 vacas. Destes, morreram dois
1751 bezerros e 14 vacas. O quadro clínico caracterizou-se por depressão, ataxia,
1752 incoordenação de membros pélvicos, diminuição de sensibilidade de cauda, ânus
1753 e membros pélvicos, alteração comportamental, decúbito e morte em 1 a 3 dias.
1754 Um dos animais que morreu na fase aguda desenvolveu fotodermatite, assim como
1755 os demais 36 que se recuperaram, totalizando 37 animais com lesões de
1756 fotossensibilização (Figura 1A).

1757 Nos três bovinos necropsiados os achados macroscópicos foram
1758 semelhantes e consistiam de estado corporal ruim, rins difusamente pálidos, fígado
1759 com padrão lobular evidenciado e com múltiplos focos amarelados, conteúdo
1760 ruminal ressecado e bexiga repleta. Sementes da planta foram encontradas no
1761 rúmen de dois deles e em um dos animais (Bovino 3) havia também úlceras
1762 multifocais no abomaso e edema transmural difuso. Os achados histológicos
1763 também foram semelhantes nos três animais e caracterizaram-se, principalmente,
1764 por lesões renais e hepáticas. Nos rins havia discreta a moderada dilatação dos
1765 túbulos e acúmulo de material proteináceo eosinofílico no lúmen desses, além de
1766 discreta a moderada tumefação e necrose das células epiteliais tubulares (Figura
1767 1B). No fígado, vacuolização moderada do citoplasma dos hepatócitos e moderada
1768 retenção biliar (Figura 1C). As lesões hepáticas eram mais acentuadas no bovino
1769 3.

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

Figura 1 – Intoxicação espontânea e experimental por *Stryphnodendron fissuratum*. (A) – bezerro Nelore com lesões de fotodermatite na barbela, flanco e lateral do tórax após ingestão espontânea de frutos de *S. fissuratum*. (B) – intoxicação experimental por *S. fissuratum*. No rim há tumefação e necrose de células epiteliais tubulares e acúmulo de material proteináceo no lúmen tubular. (C) – intoxicação espontânea por *S. fissuratum*. Fígado com hepatócitos tumefeitos e moderada retenção biliar. (D-E) – árvore e frutos de *S. fissuratum*.

Os valores das enzimas avaliadas estavam acima dos valores de referência em todos bovinos e estão descritos na Tabela 2.

1781 Tabela 2 – Intoxicação espontânea por *Stryphnodendron fissuratum* em bovinos. Níveis séricos de
 1782 GGT, AST, ureia e creatinina dos três animais necropsiados (Bovinos 1, 2 e 3) e de três animais
 1783 que sobreviveram a fase aguda e desenvolveram fotodermatite (Bovinos 4, 5 e 6).
 1784

	Bovino 1	Bovino 2	Bovino 3	Bovino 4	Bovino 5	Bovino 6
GGT (UI/L)	86,3*	174,6*	185*	156,1*	50,5*	46,1*
AST (UI/L)	499,2*	807,1*	1066,5*	115,7	78,3	97,7
Ureia (mg/dL)	336,9*	468,2*	530,2*	50,2*	30,6*	33,2*
Creatinina (mg/dL)	6,5*	8,7*	7,4*	1,3	1,4	2,3

1785 * acima dos valores de referência

1786

1787 A planta foi classificada como *Stryphnodendron fissuratum* e foi armazenada
 1788 no Laboratório de Botânica da UFMS sob o número CGMS-64898 (Figura 1D-1E).

1789

1790 *Intoxicação experimental*

1791 Ambos os bezerros adoeceram e um morreu. Os sinais clínicos do bezerro
 1792 #1 foram icterícia leve, queda dos pelos das orelhas, apatia, andar cambaleante,
 1793 diarreia, inapetência e emagrecimento. Biopsia de pele foi realiza- da e os achados
 1794 foram edema perivascular leve e infiltrado discreto de eosinófilos. Esse animal
 1795 recuperou-se.

1796 O bezerro #2 apresentou apatia, inapetência, andar cambaleante,
 1797 emagrecimento, desidratação, salivação, lacrimejamento, secreção nasal, icterícia,
 1798 fotofobia, hipotonia ruminal, diarreia, pelos arrepiados, crostas e desprendimento
 1799 da pele das orelhas, úlceras no focinho, fossas nasais e face ventral da língua. O
 1800 animal foi eutanasiado *in extremis*. Os achados de necropsia foram icterícia
 1801 generalizada, edema na região axilar, fígado com bordos arredondados e padrão
 1802 lobular evidenciado, bile espessa, rins pálidos com elevações avermelhadas,
 1803 hidropericárdio, úlceras no esôfago, língua e epiglote. Microscopicamente, as
 1804 principais lesões foram vistas no fígado e nos rins. No fígado, havia desorganização
 1805 dos cordões de hepatócitos, tumefação hepatocelular, necrose individual aleatória
 1806 e colestase leve a moderada. Nos rins, tumefação, vacuolização e necrose das
 1807 células epiteliais tubulares, além de dilatação tubular e formação de cilindros
 1808 hialinos. Na pele, as lesões foram características de fotodermatite e, na língua e no
 1809 esôfago havia úlceras.

1810 O hemograma dos bezerros #1 e #2 não apresentaram variações
 1811 significativas e ocorreram elevações dos níveis séricos das enzimas avaliadas. Os
 1812 valores estão expressos na Tabela 3.

1813

1814 Tabela 3 – Intoxicação experimental por *Stryphnodendron fissuratum* em bezerros. Níveis séricos
 1815 de GGT, AST, ureia e creatinina.

1816

Bezerro	Parâmetro	Dias															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	GGT	7	9	15	22*	22*	22*	22*	26*	20*	21*	25*	30*	30*	35*	38*	42,5*
	AST	30	104	52	47	52	68	57	57	83	47	68	52	89	125	62	110
	Ureia	47*	46*	45*	48*	45*	45*	40*	46*	49*	40*	45*	44*	44*	46*	47*	51*
	Creatinina	1,6	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,4	1,4	1,7	1,2	1,4	1,4	1,8	1,8	2,0
2	GGT	12	12	12	12	12	15	17	17	22*	25*	27*	26*	22*	24*	22*	22*
	AST	22	27	27	26	27	62	73	52	110	57	78	68	157*	125	125	125
	Ureia	43*	52*	47*	50*	46*	45*	48*	57*	80*	77*	70*	77*	94*	89*	84*	105*
	Creatinina	1,4	1,4	1,3	1,3	1,5	1,7	1,8	3,7*	3,6*	3,1*	2,1*	2,8*	3,6*	4,3*	4,1*	4,6*

1817 * acima do valor de referência

1818

1819 DISCUSSÃO

1820 O diagnóstico da intoxicação espontânea por *Stryphnodendron fissuratum*
 1821 baseou-se nos sinais clínicos, achados de necropsia e histopatológico, e também
 1822 na investigação epidemiológica que confirmou a escassez de pastagem, presença
 1823 da planta e evidências de sua ingestão. As amostras de sistema nervoso central
 1824 dos bovinos do surto natural tiveram resultado negativo para raiva. A principal
 1825 condição descrita para a ingestão dos frutos é o estresse nutricional durante
 1826 estação seca [12]. Experimentalmente, o *S. fissuratum* demonstrou ser tóxico nas
 1827 doses empregadas provocando a morte de bovinos com quadro clínico e patológico
 1828 de insuficiência renal e hepática - com ocorrência de fotodermatite em um animal.

1829 Sinais clínicos do surto e dos bovinos intoxicados experimentalmente foram
 1830 semelhantes aos descritos em intoxicações espontâneas [5] e experimentais nessa
 1831 e em outras espécies [1,13,18]. Outros sinais descritos como mugidos prolongados,
 1832 midríase, tremores de cabeça e pescoço, timpanismo [18], fezes ressequidas com
 1833 muco, salivação, edema de barbela [5], regurgitação e bruxismo [5,18] não foram
 1834 observados nos animais deste trabalho.

1835 No presente estudo, o coeficiente de morbidade foi de 32,5%, maior que os
 1836 descritos na literatura, enquanto o de letalidade foi 30,76%, menor que o máximo
 1837 descrito [5]. Reproduziu-se fotossensibilização hepatógena em um dos bovinos do
 1838 experimento e esta foi a manifestação observada na maioria dos animais do surto

1839 natural, ocorrendo em 71,15% dos bovinos intoxicados. Esse sinal clínico não foi
1840 reproduzido em experimentos anteriores em bovinos [5] e caprinos [2,13] e em
1841 relatos anteriores estima-se que ocorra em 20% dos animais afetados [5].
1842 Considerando as lesões macroscópicas e histológicas no fígado observadas nos
1843 casos espontâneos [5] e experimentais [5,16] e também aquelas observadas neste
1844 estudo, pode-se considerar que a fotossensibilização na intoxicação por *S.*
1845 *fissuratum* é de origem hepatógena. A lesão cutânea ocorre nos animais que se
1846 recuperam da fase aguda da doença, caracterizada principalmente pela lesão
1847 renal, sendo semelhante ao que foi observado em um estudo com *Enterolobium*
1848 *contortisiliquum*, no qual bovinos que se recuperam da acidose ruminal
1849 desenvolveram essa manifestação [8].

1850 Lesões na cavidade oral e no esôfago observadas no bezerro #2 já haviam
1851 sido descritas em intoxicação experimental [1]. As lesões observadas na superfície
1852 dorsal da língua, nas gengivas e no esôfago são compatíveis com lesões
1853 extrarrenais da uremia [3], o que é fundamentado pelas lesões macro e
1854 microscópicas nos rins e também pela elevação dos valores de ureia e creatinina.
1855 Estes achados foram semelhantes aos encontrados na intoxicação natural por
1856 *Amaranthus spinosus* em bovinos [9]. Estes autores consideraram que a lesão
1857 pode estar relacionada ao efeito direto da toxina da planta sobre o órgão ou a
1858 eliminação da amônia pelo trato gastrointestinal.

1859 As lesões macroscópicas no fígado e no rim foram semelhantes nos casos
1860 naturais e experimentais, e assemelham-se com os relatos anteriores [5,16]. Úlcera
1861 e edema na parede do abomaso foram observadas em apenas um dos animais do
1862 surto espontâneo e já foram descritas anteriormente [5,16]. Edema subcutâneo,
1863 lesões no rúmen e intestinos - áreas avermelhadas na mucosa e serosa - descritas
1864 em outros casos [5,16] não foram aqui observadas. Lesões histológicas no rúmen
1865 também não foram observadas no presente estudo e são descritas por outros
1866 autores em bovinos [5,16] e caprinos [2], e são associadas a acidose ruminal [4].

1867 Os resultados do presente estudo evidenciam que a lesão renal
1868 desempenha um importante papel na patogenia da intoxicação e na evolução da
1869 doença. Todos os animais que tiveram evolução fatal apresentaram níveis de ureia
1870 e creatinina significativamente acima dos valores fisiológicos, o que já foi descrito
1871 na literatura [17], enquanto que no bezerro #1 e nos animais do surto que se
1872 recuperaram, os níveis de ureia excederam levemente o valor de referência e a

1873 creatinina permaneceu dos valores considerados normais. As lesões renais
1874 caracterizaram-se por dilatação e necrose tubular e formação de cilindros de
1875 proteína, o que também já foi descrito em outros estudos em bovinos [1,5,16] e em
1876 caprinos [2].

1877 As enzimas de avaliação da função hepática - AST e GGT - apresentaram
1878 marcada elevação nos casos naturais e, experimentalmente, observou-se níveis
1879 normais de AST e discreto aumento de GGT, embora o bovino com evolução fatal
1880 tenha desenvolvido fotodermatite e apresentasse lesões histológicas no fígado. Em
1881 estudos experimentais, AST apresentou marcada elevação e GGT moderada [17].

1882 Apesar de não ter sido realizado o isolamento de princípios químicos no
1883 presente estudo, relatos anteriores mencionam que o princípio tóxico é
1884 desconhecido [19] mas que já foram isoladas saponinas triterpênicas, taninos
1885 hidrossolúveis, proantocianidinas e leucoantocianidinas [1,21].

1886 Um importante diagnóstico diferencial a ser considerado, é a intoxicação por
1887 *Enterolobium contortisiliquum*, cujo curso clínico também está associado a abortos,
1888 fotossensibilização e sinais digestivos [20] no entanto, nessa intoxicação não são
1889 observadas lesões renais como as descritas nos casos da intoxicação pelo *S.*
1890 *fissuratum*. Nos animais que sobrevivam a fase aguda e que desenvolvem
1891 fotodermatite, deve-se diferenciar de intoxicações por plantas fotossensibilizantes,
1892 a principal delas as forrageiras do gênero *Brachiaria*, sendo as lesões
1893 histopatológicas suficientes para isso [15]. Nos animais que morrem de forma
1894 aguda, devido aos sinais neurológicos, deve-se diferenciar também de raiva e, nos
1895 casos que cursam com icterícia, de babesiose e anaplasnose.

1896

1897 **CONCLUSÕES**

1898 Concluiu-se que o *Stryphnodendron fissuratum* é uma causa potencial de
1899 prejuízos econômicos a criação de bovinos, estando associado, principalmente, a
1900 lesões renais e hepáticas. Animais que sobrevivem a fase aguda da intoxicação
1901 podem desenvolver fotossensibilização hepatógena, sendo essa frequente.
1902 Experimentalmente, foi possível reproduzir a fotodermatite em um dos animais.

1903

1904 MANUFACTURERS

1905 ¹Roche Diagnóstica Brasil. São Paulo, SP, Brazil. ²MACAL Nutrição Animal.
1906 Campo Grande, MS, Brazil.

1907 **Funding.** This work was funded by the Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do
1908 Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT/CNPq
1909 Grant 15/2014 – PRONEM - MS).

1910 **Ethical approval.** The experiment was approved by the Ethical Committee for
1911 Animal Use of UFMS under the protocol # 400/2012.

1912 **Declaration of interest.** The authors report no conflicts of interest. The authors
1913 alone are responsible for the content and writing of paper.

1914

1915 Referências

1916 **1 Aguiar-Filho C.R., Albuquerque R.F., Rocha B.P., Colodel E.M., Lemos**
1917 **R.A.A., Riet-Correa F., Evêncio-Neto J. & Mendonça F.S. 2013.** Avaliação da
1918 toxicidade das favas de *Stryphnodendron fissuratum* (Mimosoideae) em vacas
1919 gestantes. *Pesquisa Veterinária Brasileira*. 33(5): 607-612.

1920 **2 Albuquerque R.F., Evêncio-Neto J., Freitas S.H., Dória R.G.S., Saurini N.O.,**
1921 **Colodel E.M., Riet-Correa F. & Mendonça F.S. 2011.** Abortion in goats after
1922 experimental administration of *Stryphnodendron fissuratum* (Mimosoi-
1923 *Toxicon*. 58: 602-605

1924 **3 Breshears M.A. & Confer A.W. 2017.** The Urinary System. In: Zachary J.F. (Ed).
1925 *Pathologic Basis of Veterinary Disease*. 6th edn. St. Louis: Elsevier, pp.640-641.

1926 **4 Brito M.F., Tokarnia C.H. & Peixoto P.V. 2001.** Intoxicação experimental pelas
1927 favas de *Stryphnodendron obovatum* (Leg. Mimosoideae) em bovinos. 2 Achados
1928 anatômico e histopatológicos. *Pesquisa Veterinária Brasileira*. 21(2): 61-72.

1929 **5 Ferreira E.V., Boabaid F.M., Arruda L.P., Lemos R.A.A., Souza M.A.,**
1930 **Nakazato L. & Colodel E.M. 2009.** Intoxi-
1931 cação por *Stryphnodendron fissuratum*
(Mimosoideae) em bovinos. *Pesquisa Veterinária Brasileira*. 29(11): 951-957.

1932 **6 Furlan F.H., Colodel E.M., Lemos R.A.A., Castro M.B., Mendonça F.S. & Riet-**
1933 **Correa F. 2012.** Poisonous plants affecting cattle in Central-Western Brazil.
1934 *International Journal of Poisonous Plant Research*. 2: 1-13.

1935 **7 Kaneko J.J. 2008.** Appendix VIII Blood Analyte Reference Values in Large
1936 Animals. In: *Clinical Biochemistry of Domestic Animals*. 6th edn. San Diego:
1937 Academic Press, pp.882-888.

- 1938 **8 Leal P.V., Pupin R.C., Lima S.C., Melo G.K.A., Araújo M.A., Gomes D.C.,**
1939 **Barros C.S.L. & Lemos R.A.A. 2017.** Ingestion of pods of *Enterolobium*
1940 *contortisiliquum* causes hepatogenous photosensitization in cattle. *Toxicon*. 131: 6-
1941 10.
- 1942 **9 Lemos R.A.A., Barros C.S.L., Salles M.S. Barros S.S. & Peixoto P.V. 1993.**
1943 Intoxicação espontânea por *Amaranthus spinosus* (Amaranthaceae) em bovinos.
1944 *Pesquisa Veterinária Brasileira*. 13(1-2): 25-34.
- 1945 **10 Lemos R.A.A., Jorge G.D. & Gonçalves Júnior W. 2008.** Intoxicação por
1946 *Stryphnodendron fissuratum*. In: Lemos R.A.A. & Leal C.R.B (Eds). *Doenças de*
1947 *Impacto Econômico em Bovinos de Corte - Perguntas e Respostas*. Campo
1948 Grande: Editora UFMS, pp.287-289.
- 1949 **11 Lemos R.A.A., Guimarães E.B., Carvalho N.M., Nogueira A.P.A., Santos**
1950 **B.S., Souza R.I.C., Cardinal S.G. & Kassab H.O. 2011.** Plant Poisonings in Mato
1951 Grosso do Sul. In: Riet-Correa F., Pfister J., Schild A.L. & Wierenga R. (Eds).
1952 *Poisoning by Plants, Mycotoxins and Related Toxins*. Wallingford: CABI Head
1953 Office, pp.68-72.
- 1954 **12 Macedo J.S., Rocha B.P., Colodel E.M., Freitas S.H., Dória R.G.S., Riet-**
1955 **Correa F., Evêncio-Neto J. & Mendonça F.S. 2015.** Congenital malformations
1956 caused by *Stryphnodendron fissuratum* (Leg. Mimosoideae) in guinea pigs (*Cavia*
1957 *porcellus*). *Toxicon*. 106: 68-71.
- 1958 **13 Mendonça F.S., Evêncio-Neto J., Estevão L.R.M., Melo L.E.H., Freitas S.H.,**
1959 **Arruda L.P., Boabaid F.M. & Colodel E.M. 2010.** Aspectos clínicos da intoxicação
1960 experimental pelas favas de *Stryphnodendron fissuratum* (Leg. Mimosoideae) em
1961 caprinos. *Pesquisa Veterinária Brasileira*. 30(3): 203-210.
- 1962 **14 Occhioni E.M.L. 1990.** Considerações taxonômicas no gênero
1963 *Stryphnodendron* Mart. (Leguminosae Mimosoideae) e distribuição geográfica das
1964 espécies. *Acta Botânica Brasílica*. 4: 153-158.
- 1965 **15 Riet-Correa B., Castro M.B., Lemos R.A.A., Riet-Correa G., Mustafa V. &**
1966 **Riet-Correa F. 2011.** *Brachiaria* spp. Poisoning of Ruminants in Brazil. *Pesquisa*
1967 *Veterinária Brasileira*. 31(3): 183-192.
- 1968 **16 Rodrigues A.S., Chaves N.S.T., Damasceno A.D., Souza M.A., Rocha**
1969 **Júnior L.H. & Gonzaga Júnior W.C. 2005.** Aspectos anatomo-histopatológicos da
1970 intoxicação experimental de bovinos pela ingestão de frutos de *Stryphnodendron*
1971 *fissuratum* MART. ("rosquinha"). *Ciência Animal Brasileira*. 6(3): 195-202.

- 1972 **17 Rodrigues A.S., Chaves N.S.T., Damasceno A.D., Trindade B.R., Barini**
1973 **A.C., Ferreira V.Q. & Pantoja C.E.M.S. 2005.** Aspectos laboratoriais da
1974 intoxicação experimental de bovinos pelos frutos de *Stryphnodendron fissuratum*
1975 MART. (“rosquinha”). *Ciência Animal Brasileira*. 6(4): 287-293.
- 1976 **18 Rodrigues A.S., Chaves N.S.T., Damasceno A.D., Trindade B.R., Martins**
1977 **G.H.L. & Arantes A.F. 2005.** Aspectos clínicos da intoxicação experimental de
1978 bovinos pelos frutos de *Stryphnodendron fissuratum* MART. (“rosquinha”). *Ciência*
1979 *Animal Brasileira*. 6(2): 119-126.
- 1980 **19 Tokarnia C.H., Brito M.F., Barbosa J.D., Peixoto P.V. & Döbereiner J. 2012.**
1981 *Stryphnodendron fissuratum*. In: *Plantas tóxicas do Brasil para Animais de*
1982 *Produção*. Rio de Janeiro: Helianthus, pp.134-136.
- 1983 **20 Tokarnia C.H., Brito M.F., Barbosa J.D., Peixoto P.V. & Döbereiner J. 2012.**
1984 *Enterolobium contortisiliquum*. In: *Plantas tóxicas do Brasil para Animais de*
1985 *Produção*. Rio de Janeiro: Helianthus, pp.139-144.
- 1986 **21 Yokosuka A., Kawakami S., Haraguchi M. & Mimaki Y. 2008.** Stryphnosides
1987 A-F, six new triterpene glycosides from the pericarps of *Stryphnodendron*
1988 *fissuratum*. *Tetrahedron*. 64: 1474-1481.
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002

CONSIDERAÇÕES FINAIS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

- Ao longo de 24 anos, foram avaliadas amostras de 5083 amostras de necropsias de bovinos. As doenças mais frequentes foram as inflamatórias e parasitárias seguidas por tóxicas ou toxi-infecciosas, degenerativas, causadas por agentes físicos, metabólicas ou nutricionais, neoplasias e lesões tumoriformes e, por último, malformações congênitas. Aquelas que não se enquadraram em nenhuma categoria foram classificadas como outras;
- Os principais diagnósticos foram raiva, meningoencefalite não supurativa de causa indeterminada, polioencefalomalacia, meningoencefalite por herpesvírus bovino e botulismo;
- Outras causas importantes de morte de bovinos foram tristeza parasitária bovina, septicemia e carbúnculo sintomático;
- A porcentagem de diagnósticos inconclusivos foi alta e decorrente de falta de dados clínicos e epidemiológicos, não encaminhamento de fragmentos de todos os órgãos para avaliação e mau acondicionamento das amostras;
- A babesiose bovina foi diagnosticada em quase todos os anos estudados (23 anos) mas representou baixa porcentagem em relação ao total de diagnósticos;
- Não houve diferença estatística significativa na ocorrência de babesiose em bovinos zebuínos e não zebuínos; ou seja, apesar de serem considerados resistentes a enfermidade, animais de raças zebuínas podem adoecer e morrer;
- Houve predominância de casos em bovinos com mais de 12 meses e 50% dos surtos em bezerros com menos de um ano acometeram aqueles com menos de 30 dias, o que é associado à queda da imunidade passiva;
- Foi acompanhado um surto de intoxicação em bovinos causada pela ingestão de *Stryphnodendron fissuratum*. O quadro clínico-patológico caracterizou-se por lesões renais e hepáticas;
- Os bovinos que sobreviveram a fase aguda da doença, caracterizada por lesões renais, desenvolveram sinais clínicos de fotodermatite;

- 2035
- 2036
- 2037
- 2038
- 2039
- 2040
- Experimentalmente, reproduziu-se pela primeira vez fotodermatite em um bovino após administração, por via oral, de frutos triturados de *S. fissuratum* na dose de 2g/kg PV por 10 dias;
 - A fotossensibilização observada nos casos de intoxicação por *S. fissuratum* possuem origem hepatógena.

2041

ANEXO 1 – PROJETO APROVADO

TÍTULO: Caracterização epidemiológica, clínica e patológica das principais doenças de bovinos em Mato Grosso do Sul

Resumo do projeto (máximo 14 linhas, espaço simples entre linhas - fonte Arial tamanho 10)

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

A atuação dos Laboratórios de Diagnóstico Veterinário baseada na coleta e análise de dados de forma padronizada e sistematizada permite a elaboração de material de divulgação destinado, principalmente, aos médicos veterinários de campo fornecendo importante orientação sobre as principais enfermidades que ocorrem na sua área de atuação. Além disso, é importante fonte de publicações científicas. O estabelecimento de medidas de prevenção e controle das doenças só é possível após o conhecimento das condições de ocorrência das mesmas nos diferentes sistemas de produção. Assim, para que se desenvolvam medidas para evitar ou minimizar os prejuízos causados por elas é necessário determinar a epidemiologia de cada uma delas. O diagnóstico rápido e preciso das doenças é a maneira mais segura para evitar sua disseminação, assim como o conhecimento da epidemiologia é o único meio eficiente de evitar a introdução de doenças em uma região anteriormente livre. O objetivo do projeto é realizar avaliação epidemiológica, clínica e patológica das principais doenças que acometem bovinos no estado do Mato Grosso do Sul baseada em estudo retrospectivo de 1995 a 2016 e prospectivo entre 2017 e 2018.

2057

Palavras – chave (três)

Estudo retrospectivo	Epidemiologia	Bovinos
----------------------	---------------	---------

2058

2059

INTRODUÇÃO

2060

2061

2062

O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, atingindo 215 milhões de cabeças no ano de 2015, das quais aproximadamente 70 milhões estão na região Centro-Oeste (Brasil 2015).

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

A cadeia produtiva da carne é um importante segmento da economia nacional constituindo-se em uma das principais fontes de produtos de exportação do país. Para a manutenção do cenário de crescimento do agronegócio no Brasil, a garantia do estado sanitário das cadeias produtivas é um dos principais desafios, sendo o conhecimento das enfermidades que afetam os bovinos de extrema importância para que se alcance o máximo potencial de criação (Lucena et al. 2010).

Os laboratórios de diagnóstico veterinário (LDVs) dedicam-se ao estudo das doenças dos animais desde o ponto de vista epidemiológico, das causas determinantes das mesmas e do seu controle. Isto se torna possível através dos exames de animais ainda vivos, cadáveres completos ou parte dos mesmos, usando técnicas especiais com objetivo de identificar organismos causadores de doenças ou substâncias responsáveis ou produzidas no desenvolvimento das mesmas (Costa et al. 2009). Apesar de, por muitas vezes, a realização da necropsia ser a única forma de se concluir um diagnóstico, ela é negligenciada em várias situações (Peixoto & Barros 1998).

2077 A atuação dos LDVs baseada na coleta e análise de dados de forma padronizada
2078 e sistematizada permite a elaboração de material de divulgação destinado, principalmente,
2079 aos médicos veterinários de campo, visto que esses fornecem importante orientação sobre
2080 as principais enfermidades que ocorrem na sua área de atuação (Lucena et al. 2010, Rissi
2081 et al. 2010). Apesar de não existirem muitas variações nas doenças observadas nas áreas
2082 de abrangência de cada laboratório de diagnóstico (Rissi et al. 2010), características
2083 epidemiológicas podem variar bastante entre as regiões.

2084 Esse modo de atuação dos LDVs permite a realização de estudos retrospectivos,
2085 sendo esses uma importante fonte de publicações científicas (Sanchez et al. 2000,
2086 Rodrigues et al. 2005, Costa et al. 2009, Galiza et al. 2010, Lucena et al. 2010, Rissi et al.
2087 2010, Ribas et al. 2013, Souza et al. 2015). Através desses estudos é possível: (1) agrupar
2088 dados clínicos, laboratoriais e patológicos; (2) definir a prevalência de uma enfermidade
2089 em diferentes categorias de animais; (3) modificar diagnósticos incorretos e conceitos
2090 errôneos (Figuera 2008).

2091 O estabelecimento de medidas de prevenção e controle das doenças só é possível
2092 após o conhecimento das condições de ocorrência das mesmas nos diferentes sistemas
2093 de produção. Assim, para que se desenvolvam medidas para evitar ou minimizar os
2094 prejuízos causados por elas é necessário determinar a epidemiologia de cada uma delas.
2095 O diagnóstico rápido e preciso das doenças é a maneira mais segura para evitar sua
2096 disseminação, assim como o conhecimento da epidemiologia é o único meio eficiente de
2097 evitar a introdução de doenças em uma região anteriormente livre (Barros et al. 2006, Riet-
2098 Correa et al. 2007).

2099 Os LDVs constituem também uma parte essencial para o estabelecimento de um
2100 sistema eficiente de vigilância epidemiológica que é essencial para a manutenção e
2101 expansão do mercado consumidor dos produtos de origem animal. Um dos principais
2102 exemplos disso foi a notificação de casos atípicos e esporádicos de encefalopatia
2103 espongiforme bovina (BSE) no estado de Paraná em 2010 (Brasil 2012) e em Mato Grosso
2104 (Brasil 2014).

2105 A falta de informação de veterinários e produtores rurais conduz a dúvidas frente a
2106 diagnóstico de intoxicação por plantas (Rissi et al. 2007) e da mesma forma isso pode
2107 ocorrer com outras enfermidades de bovinos, ressaltando a importância de veiculação de
2108 informações aos indivíduos relacionados à atividade pecuária (Schild et al. 2013). O não
2109 encaminhamento de materiais aos LDVs quando ocorrem surtos ou mortes isoladas em
2110 animais de produção resulta em opiniões divergentes e muitas vezes não fundamentadas
2111 que acabam atrasando o diagnóstico correto e aumentando os prejuízos (Peixoto & Barros
2112 1998).

2113 A associação entre a epidemiologia, sinais clínicos, achados de necropsia e
2114 histopatológicos demonstrou ser eficiente no diagnóstico de enfermidades com
2115 sintomatologia nervosa (Lemos 2005). No entanto, apesar da importância da realização de
2116 diagnóstico pelos laboratórios, o período de tempo entre o aparecimento dos primeiros
2117 casos clínicos e a realização do diagnóstico pode resultar em enormes prejuízos devido ao
2118 adoecimento e morte de novos animais. Por isso é de extrema importância que os
2119 veterinários de campo, baseados na epidemiologia, sinais clínicos e achados de necropsia,
2120 sejam capazes de elaborar uma lista de possíveis diagnósticos que permitam a realização
2121 de tratamentos em outros animais que venham a adoecer assim como medidas de
2122 profilaxia para que novos animais não adoçam, visando minimizar os prejuízos naquele
2123 rebanho.

2124 Embora exista grande quantidade de conhecimento produzido nos LDVs, muitas
2125 vezes esse não é transferido aos demais profissionais externos aos grandes centros
2126 acadêmicos (Lemos 2004). Considerando esse aspecto ressalta-se a importância da
2127 confecção de material que contenha informações que possam auxiliar a elaboração de
2128 diagnóstico presuntivo de forma rápida e eficiente até que seja possível a realização do
2129 diagnóstico final.

2130 Especificamente em Mato Grosso do Sul, a ação dos laboratórios de diagnóstico
2131 veterinário foi fundamental para a determinação das condições de ocorrência de diversas
2132 doenças responsáveis por importantes perdas econômicas para a pecuária do estado,
2133 permitindo o estabelecimento de medidas eficientes para o controle. Podem ser citadas
2134 doenças infecciosas como raiva (Langorh et al. 2003), meningoencefalite por herpesvírus
2135 bovino tipo 5 (Salvador et al. 1998), diarreia viral bovina (Ferreira 2007, Pinto et al. 2013),
2136 carbúnculo sintomático (Heckler et al. 2017), febre catarral maligna (Lemos et al. 2005),
2137 dermatofilose (Bacha et al. 2014); doenças parasitárias como tripanossomíases (Paiva et
2138 al. 2000), tóxicas (Brum et al. 2002, Carvalho et al. 2006, Carvalho et al. 2013, Carvalho et
2139 al. 2014, Souza et al. 2015, Faccin et al. 2016), metabólicas como a polioencefalomalacia
2140 (Nakazato et al. 2000) e casos de mortalidade por hipotermia associadas a variações
2141 climáticas bruscas (Santos et al. 2012).

2142 Outro aspecto importante dos estudos retrospectivos é que os mesmos permitem
2143 identificar falhas nos procedimentos de diagnóstico empregados e correção dessas
2144 visando aumento da eficácia diagnóstica. Como exemplo dessa situação pode-se citar o
2145 estudo que identifica possíveis falhas no diagnóstico da raiva quando determinadas partes
2146 anatômicas do sistema nervoso central não são encaminhadas ao laboratório (Bingham &
2147 Merwe 2002). Outro exemplo são as doenças entéricas, particularmente as diarreias
2148 neonatais. O diagnóstico dessas patologias é complexo e inclui diversos fatores como o
2149 número de partículas infecciosas, ocorrência de doenças concomitantes e a virulência do

2150 agente. Dessa forma, o diagnóstico fundamenta-se na interpretação dos resultados
2151 laboratoriais (isolamento de patógenos) associada aos sinais clínicos e dados
2152 epidemiológicos. A necropsia e a histopatologia podem ser determinantes para o
2153 estabelecimento do diagnóstico através da identificação de lesões causadas pelo agente
2154 isolado (Blanchard 2012). Em resumo, a ocorrência de quadros clínicos e patológicos nos
2155 quais a etiologia e agente etiológico não são identificado pode ser decorrente de falhas no
2156 encaminhamento de amostras para exames laboratoriais.

2157 Essas observações são particularmente importantes pois em estudos
2158 retrospectivos realizados em diferentes LDVs do Brasil demonstram o grande número de
2159 diagnósticos inconclusivos (Lucena et al. 2010, Ribas et al. 2013). Dentre as principais
2160 falhas apontadas nesses estudos estão tecidos ou cadáveres em mau estado de
2161 conservação (autólise), falta de dados epidemiológicos, envio de tecidos insuficientes e
2162 não observação de lesões macroscópicas pelo remetente (Lucena et al. 2010, Ribas et al.
2163 2013)

2164

2165 **OBJETIVOS**

2166 **Objetivos Gerais**

2167 Realizar estudo retrospectivo e prospectivo das enfermidades de bovinos do Mato
2168 Grosso do Sul diagnosticadas pelo Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade
2169 Federal de Mato Grosso do Sul e após isso classifica-las de acordo com a etiologia e
2170 identificar os principais sinais clínicos e características epidemiológicas que permitam a
2171 elaboração de possíveis diagnósticos.

2172

2173 **Objetivos Específicos**

2174 - Realizar estudo retrospectivo das enfermidades de bovinos em Mato Grosso do
2175 Sul diagnosticadas pelo LAP-FAMEZ-UFMS no período compreendido entre janeiro de
2176 1995 dezembro de 2016;

2177 - Realizar estudo prospectivo das enfermidades de bovinos em Mato Grosso do Sul
2178 diagnosticadas pelo LAP-FAMEZ-UFMS no período compreendido entre janeiro de 2017 e
2179 dezembro de 2018;

2180 - Identificar as principais enfermidades de bovinos diagnosticadas pelo LAP-
2181 FAMEZ-UFMS;

2182 - Identificar sinais clínicos, características epidemiológicas e achados de necropsia
2183 que permitam a realização de uma lista de possíveis diagnósticos e a diferenciação entre
2184 as principais doenças de bovinos por veterinários de campo;

2185 METODOLOGIA

2186 Serão revisados todos os protocolos de necropsia e histopatológico de bovinos dos
2187 arquivos do Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal de Mato Grosso
2188 do Sul (LAP-UFMS), Mato Grosso do Sul, entre janeiro de 1995 e dezembro de 2016, além
2189 de estudo prospectivo avaliando-se os protocolos de 2017 e 2018. Não serão computados
2190 laudos de bovinos provenientes de outros estados e nem daqueles utilizados em
2191 experimentos. Serão obtidas informações quanto a idade, sexo, raça, sinais clínicos, dados
2192 epidemiológicos, achados de necropsia e alterações histopatológicas, além do diagnóstico
2193 definitivo. Serão contabilizados os casos inconclusivos, impróprios para avaliação e os
2194 sugestivos de alguma enfermidade.

2195 As doenças dos bovinos serão agrupadas de acordo com a sua etiologia em
2196 doenças virais, bacterianas, parasitárias, tóxicas, neoplasias, nutricionais/metabólicas e
2197 distúrbios do desenvolvimento.

2198 Em seguida, serão identificadas as principais características epidemiológicas e os
2199 principais sinais clínicos e achados de necropsia que permitam que veterinários de campo
2200 elaborem uma lista de enfermidades suspeitas, possibilitando a diferenciação entre elas.
2201 Para isso, as informações serão classificadas em frequentes – descritas em mais de 70%
2202 dos casos, pouco frequentes – descritas entre 30 e 69,9% dos casos, e infrequentes –
2203 descritas entre 0 e 29,9% dos casos.

2204 O estudo prospectivo será realizado até dezembro de 2018 sendo contabilizados
2205 todos os materiais de bovinos necropsiados por membros da equipe do LAP-FAMEZ ou
2206 enviados por médicos veterinários. Serão excluídos dados referentes a materiais de outros
2207 estados e daqueles utilizados em experimentos.

2208 As necropsias realizadas por membros do LAP-FAMEZ serão realizadas após o
2209 preenchimento da ficha epidemiológica para obtenção de informações relacionadas à:
2210 categoria animal afetada, idade, sexo; total de animais na propriedade, no lote afetado,
2211 número de doentes e número de mortos; tipo de pastagem, de aguada, fornecimento de
2212 sal mineral e/ou ração em alguma fase da vida, protocolos de vacinação; se há morcegos
2213 hematófagos, destino das carcaças, se há plantas tóxicas conhecidas na propriedade;
2214 sinais clínicos dos animais afetados, se outras espécies foram acometidas, se a doença
2215 ocorre apenas em um pasto ou em pastos diferentes, se os animais doentes receberam
2216 tratamento e se sim, qual foi e qual foi a evolução. Durante a necropsia serão coletados
2217 fragmentos dos diversos órgãos para fixação em formol 10% e caso seja necessária será
2218 feita coleta de fragmentos refrigerados ou congelados para realização de exames
2219 complementares.

2220 Considerando que as doenças do sistema nervoso são a principal causa de
2221 mortalidades em bovinos em Mato Grosso do Sul (Lemos 2005), serão adotados

2222 procedimentos especiais que permitam um diagnóstico conclusivo. Nos animais
2223 necropsiados, partes do sistema nervoso central (SNC) e dos demais órgãos serão
2224 colhidas, conservadas em formol a 10%, incluídos em parafina, cortados em secções de 5
2225 m, corados pela técnica de hematoxilina e eosina, e observados em microscópio óptico. A
2226 distribuição das lesões encefálicas será analisada a partir de cortes histológicos das
2227 seguintes regiões do sistema nervoso central: córtex telencefálico (frontal, parietal e
2228 occipital), bulbo na altura do óbex, ponte na altura dos pedúnculos cerebelares,
2229 mesencéfalo na altura dos colículos rostrais, tálamo, cerebelo, hipocampo, núcleos da
2230 base e medula espinhal (cervical, dorsal e lombar) (Barros & Marques 2003). Parte do
2231 SNC, conservada sob refrigeração em recipiente estéril será encaminhada para
2232 diagnóstico da raiva pelas técnicas de imunofluorescência direta (IFD) e inoculação
2233 intracerebral em camundongos (ICC).

2234 Nos casos diagnosticados clinicamente como botulismo serão colhidas amostras
2235 de fígado (400g), porção média do duodeno com conteúdo (25cm), e conteúdo do rúmen
2236 (20ml) em recipientes estéreis, conservados sob refrigeração e encaminhados para o
2237 LADDAN/IAGRO para pesquisa de toxina botulínica pelas técnicas de bioensaio e
2238 soroneutralização em camundongos.

2239 O diagnóstico laboratorial da raiva será realizado pelo LADDAN/IAGRO segundo a
2240 técnica de imunofluorescência direta e pela prova biológica em camundongos.

2241 Os critérios utilizados para o diagnóstico das enfermidades serão os seguintes:
2242 Serão considerados positivo para raiva materiais que apresentarem resultado positivo nas
2243 provas de imunofluorescência direta (IFD) ou na prova de inoculação intracerebral em
2244 camundongos (ICC) e a presença de meningoencefalite e/ou mielite não- supurativa
2245 associada a ocorrência de corpúsculos de inclusão eosinofílicos no citoplasma de
2246 neurônios, especialmente nas células de Purkinje.

2247 Para o diagnóstico do botulismo os principais critérios adotados serão os dados
2248 epidemiológicos (existência de fonte de contaminação: como carcaças, aguadas, silagem,
2249 cama de frango, palhadas,) o quadro clínico (paralisia flácida) e a ausência de lesões
2250 macro ou microscópicas que justifiquem os sinais clínicos observados. A presença de
2251 toxina botulínica, no fígado, conteúdo ruminal ou intestinal, será utilizada como critério
2252 complementar de diagnóstico (Lemos 2004).

2253 O diagnóstico de encefalite por BoHV-5 terá por critério o achado de
2254 meningoencefalite não supurativa associada a necrose do córtex cerebral e presença de
2255 inclusões anfófilas ou acidofílicas intranucleares em astrócitos e neurônios. O quadro
2256 clínico-epidemiológico será usado como critério diagnóstico complementar (Lemos 2004).

2257 O critério de diagnóstico de polioencefalomalacia (PEM) basear-se-á no quadro
2258 clínico, achados de necropsia, e principalmente nos achados histopatológicos de necrose

2259 laminar de neurônios e malacia caracterizada pela presença de células Gitter. A
2260 recuperação dos bovinos tratados com tiamina e corticosteróides será empregada como
2261 critério diagnóstico auxiliar (NAKAZATO et al. 2000).

2262 O diagnóstico de tétano utilizará como critério o quadro clínico, a epidemiologia
2263 (ocorrência de situações que favoreçam a infecção como cirurgias, aplicação de vacinas e
2264 ferimentos), a ausência de achados de lesões macro ou microscópicas, ou ainda, a
2265 eliminação de distúrbios metabólicos como a hipocalcemia ou hipomagnesemia que
2266 justificassem os sinais clínicos observados.

2267 O diagnóstico da febre catarral maligna terá como base o quadro clínico e
2268 patológico. A histopatologia, principalmente a ocorrência de lesões inflamatórias
2269 características no gânglio trigeminal, será considerada com principal critério diagnóstico
2270 (Lemos et al. 2005).

2271 O critério adotado para os diagnósticos negativos de BSE será a ausência de lesões
2272 histológicas características dessa enfermidade (Barros & Marques 2003). Se ocorrerem
2273 casos com lesões sugestivas de encefalopatias espongiiformes os materiais serão
2274 encaminhados para o laboratório de referência do MAPA, onde serão realizados exames
2275 complementares (imuno-histoquímica).

2276 Para o diagnóstico de outras doenças do sistema nervoso de bovinos como a
2277 listeriose, meningoencefalites bacterianas, babesiose cerebral ou ainda doenças que
2278 podem causar sinais neurológicos ou confundíveis com estes, mas que não causam lesões
2279 no SNC como as intoxicações por *Vernonia rubricaulis* e *Senna* spp., os critérios de
2280 diagnóstico serão as lesões características destas doenças e a identificação ou o
2281 isolamento do agente (Barros et al. 2006).

2282 Os materiais encaminhados ao laboratório por médicos veterinários que atuam no
2283 campo, tanto da iniciativa privada como de órgão públicos, o levantamento epidemiológico
2284 terá por base as informações descritas na ficha epidemiológica do LAP/FAMEZ/UFMS.
2285 Considerando que a coleta de amostras para exames laboratoriais segue critérios
2286 individuais dos veterinários remetentes, em muitos casos os materiais não serão
2287 encaminhados de acordo com as recomendações do MAPA (Barros & Marques 2003).
2288 Nessas situações, as possíveis falhas na metodologia de coleta e conservação, serão
2289 anotadas nas fichas referentes a cada material e veterinário será orientado sobre os
2290 procedimentos corretos de coleta de materiais.

2291

2292 LITERATURA CITADA

2293 Bacha F.B., Faccin T.C., Lima S.C., Leal C.R.B., Lemos R.A.A. Dermatofilose em
2294 bezerros da raça Nelore no Mato Grosso do Sul. Semina: Ciências Agrárias, Londrina,
2295 v.35, n.4, p. 1947-1954, 2014.

- 2296 Barros C.S.L. & Marques G.H.F. Procedimentos para o diagnóstico das doenças do
2297 sistema nervoso central de bovinos. Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária e
2298 Abastecimento, Departamento de Defesa Animal. 2003.
- 2299 Barros C.S.L., Driemeier D., Dutra I.S., Lemos R.A.A. Doenças do sistema nervoso
2300 de bovinos no Brasil. Ed. Montes Claros, MG, 2006. (Coleção Vallée).
- 2301 Blanchard P.C. Diagnostics of Dairy and Beef Cattle Diarrhea. *Vet Clin Food Anim*,
2302 28, p.443-463, 2012.
- 2303 Brasil 2012. Acessado em 31/01/2017. Disponível em.
2304 <http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2012/12/nota-oficial>
- 2305 Brasil 2014. Acessado em 31/01/2017. Disponível em:
2306 [http://www.agricultura.gov.br/animal/noticias/2014/05/entenda-o-caso-de-eeb-no-mato-](http://www.agricultura.gov.br/animal/noticias/2014/05/entenda-o-caso-de-eeb-no-mato-grosso)
2307 [grosso](http://www.agricultura.gov.br/animal/noticias/2014/05/entenda-o-caso-de-eeb-no-mato-grosso)
- 2308 Brasil 2015. Acessado em 02/02/2017. Disponível em:
2309 [http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2016/04/producao-de-carne-no-brasil-](http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2016/04/producao-de-carne-no-brasil-aumenta-45porcento-em-15-anos)
2310 [aumenta-45porcento-em-15-anos](http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2016/04/producao-de-carne-no-brasil-aumenta-45porcento-em-15-anos)
- 2311 Brum K.B., Purisco E., Lemos R.A.A., Riet-Correa F. Intoxicação por *Vernonia*
2312 *rubricaulis* em bovinos no Mato Grosso do Sul. *Pesq. Vet. Bras.* 22(3), 119-128, 2002
- 2313 Carvalho N.M., Alonso L.A., Cunha T.G., Ravedutti J., Barros C.S.L., Lemos R.A.A.
2314 Intoxicação de bovinos por *Tetrapteryx multiglandulosa* (Malpighiaceae) em Mato Grosso
2315 do Sul. *Pesq. Vet. Bras.* 26(3), 139-146, 2006.
- 2316 Carvalho N.M., Bacha F.B., Santos A.C., Carvalho A.Q., Faccin T.C., Pott A., Lemos
2317 R.A.A. Spontaneous and experimental intoxication of cattle by *Simarouba versicolor* A. St.-
2318 Hill (Simaroubaceae). *Toxicon*, 64, 55-59, 2013.
- 2319 Carvalho A.Q., Carvalho N.M., Vieira G.P., Santos A.C., Franco G.L., Pott A., Barros
2320 C.S.L., Lemos R.A.A. Intoxicação espontânea por *Senna obtusifolia* em bovinos no
2321 Pantanal Sul-Matogrossense. *Pesq. Vet. Bras.* 34(2): 147-152, 2014.
- 2322 Costa V.M.M., Simões S.V.D., Riet-Correa F. Doenças parasitárias em ruminantes
2323 no semi-árido brasileiro. *Pesq. Vet. Bras.* 29(7): 563-568, 2009.
- 2324 Faccin T.C., Kommers G.D., Galiza G.J.N., Pupin R.C., Madureira R.C., Lemos
2325 R.A.A. Chronic liver disease in cattle associated with ingestion of *Brachiaria* spp. *Ciência*
2326 *Rural*, Santa Maria, Online, 2016.
- 2327 Ferreira L.C.L. Doença das mucosas associada à dermatite generalizada em
2328 bovinos em Mato Grosso do Sul. Dissertação – Mestrado – Programa de Pós-Graduação
2329 em Ciência Animal, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Brasil.
2330 2007. 76p.

- 2331 Figuera R.A. Causas de morte e razão para eutanásia em cães. Tese (doutorado)
2332 – Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais, Programa de
2333 Pós- Graduação em Medicina Veterinária, RS, 2008.
- 2334 Galiza G.J.N., Silva M.L.C.R., Dantas A.F.M., Simões S.V.D., Riet-Correa F.
2335 Doenças do sistema nervoso de bovinos no semiárido nordestino. *Pesq. Vet. Bras.* 30(3):
2336 267-276. 2010.
- 2337 Heckler R.F., Lemos R.A.A., Gomes D.C., Dutra I.S., Silva R.O.S., Lobato F.C.F.,
2338 Ramos C.A.N., Brumatti R.C. Blackleg in cattle in the state Mato Grosso do Sul, Brazil: 59
2339 cases. *Pesq. Vet. Bras.* In press.
- 2340 Langorh I.M., Irigoyen L.F., Lemos R.A.A., Barros C.S.L. Aspectos epidemiológicos,
2341 clínicos e distribuição das lesões histológicas no encéfalo de bovinos com raiva. *Ciência*
2342 *Rural*, Santa Maria, v.33, n.1, p.125-131, 2003.
- 2343 Lemos R.A.A. (Org.). Botulismo, Meningoencefalite por Herpesvírus Bovino tipo 5,
2344 Polioencefalomalacia, Raiva. *Série Qualificação Rural*. 1ª. ed. Campo Grande: Editora
2345 UFMS. v. 1. 86 p. 2004.
- 2346 Lemos R.A.A. Enfermidades do sistema nervoso de bovinos de corte das regiões
2347 Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Tese – Doutorado em Medicina Veterinária Preventiva.
2348 Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária, Universidade Estadual Paulista Julio de
2349 Mesquita Filho, Campus Jaboticabal, São Paulo. 2005. 150p.
- 2350 Lemos R.A.A., Rech R.R., Guimarães E.B., Kadri A., Dutra I.S. Febre catarral
2351 maligna em bovinos do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. *Ciência Rural*, v.35, n. 4,
2352 p.932-934. 2005.
- 2353 Lucena R.B., Pierezan F., Kommers G.D., Irigoyen L.F., Figuera R.A., Barros C.S.L.
2354 Doenças de bovinos no Sul do Brasil: 6706 casos. *Pesq. Vet. Bras.* 30(5): 428-
2355 434, 2010.
- 2356 Nakazato L., Lemos R.A.A., Riet-Correa F. Polioencefalomalacia em bovinos nos
2357 estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. *Pesq. Vet. Bras.* 20(3): 119-125, 2000.
- 2358 Paiva F., Lemos R.A.A., Nakazato L., Mori A.E., Brum K.B., Bernardo K.C.
2359 *Trypanosoma vivax* em bovinos no Pantanal do estado do Mato Grosso do Sul, Brasil: I –
2360 Acompanhamento clínico, laboratorial e anatomopatológico de rebanhos infectados. *Rev.*
2361 *Bras. Parasitol. Vet.*, 9, 2, 135-141, 2000.
- 2362 Peixoto P.V. & Barros C.S.L. A importância da necropsia em medicina veterinária.
2363 *Pesq. Vet. Bras.* v.18, n.3-4. 1998
- 2364 Pinto A.P., Santos B.S., Ribas N.L.K.S., Bacha F.B., Carvalho N.M., Driemeier D.,
2365 Antoniassi N.A.B., Lemos R.A.A. Nonsuppurative myocarditis associated with bovine viral
2366 diarrhoea virus infection in calves in the state of Mato Grosso do Sul, Brazil. *Acta Scientiae*
2367 *Veterinariae*, 41: 1113, 2013.

- 2368 Ribas N.L.K.S., Souza R.I.C., Santos A.C., Valençuela R.A., Gouveia A.F., Castro
2369 M.B., Mori A.E., Lemos R.A.A. Doenças do sistema nervoso de bovinos no mato grosso do
2370 sul: 1082 casos. *Pesq. Vet. Bras.* 33 (10): 1183-1194, 2013.
- 2371 Riet-correa F. (Org.), Schild A.L. (Org.), Lemos R.A.A. (Org.), Borges J.R.J. (Org.).
2372 Doenças de Ruminantes e Equídeos. 3ª. Ed. Santa Maria: Pallotti, 2007. v.2. 1416p.
- 2373 Rissi D.R., Rech R.R., Pierezan F., Gabriel A.L., Trost M.E., Brum J.S., Kommers
2374 G.D., Barros C.S.L. Intoxicações por plantas e micotoxinas associadas a plantas em
2375 bovinos no Rio Grande do Sul: 461 casos. *Pesq. Vet. Bras.* 27(7): 261-268, 2007.
- 2376 Rissi D.R., Pierezan F., Oliveira-Filho J.C., Lucena R.B., Carmo P.M.S., Barros
2377 C.S.L. Abordagem diagnóstica das principais doenças do sistema nervoso de ruminantes
2378 e equinos no Brasil. *Pesq. Vet. Bras.* 30(11): 958-967, 2010.
- 2379 Rodrigues A., Rech R.R., Barros R.R., Figuera R.A., Barros C.S.L. Babesiose
2380 cerebral em bovinos: 20 casos. *Ciência Rural*, v.35, n.1, p.121-125, 2005.
- 2381 Sanches A.W.D., Langohr I.M., Stigger A.L., Barros C.S.L. Doenças do sistema
2382 nervoso central em bovinos no Sul do Brasil. *Pesq. Vet. Bras.* 20(3): 113-118, 2000.
- 2383 Santos B.S., Pinto A.P., Aniz A.C.M., Almeida A.P.M.G., Franco G.L., Guimarães
2384 E.B., Lemos R.A.A. Mortalidade de bovinos zebuínos por hipotermia em Mato Grosso do
2385 Sul. *Pesq. Vet. Bras.* 32(3): 204-210, 2012.
- 2386 Salvador S.C., Lemos R.A.A., Riet-Correa F., Roehe P.M., Osório A.L.A.R.
2387 Meningoencefalite em bovinos causada por herpesvírus bovino-5 no Mato Grosso do Sul
2388 e São Paulo. *Pesq. Vet. Bras.* 18(2), 75-82, 1998.
- 2389 Schild A.L., Pereira C.M., Fiss L., Santos B.L., Coelho A.C.B., Sallis E.S.V. Doenças
2390 diagnosticadas pelo laboratório regional de diagnóstico no ano 2012. In: Ladeira S.R.L.,
2391 Ruas J.L., Soares M.P., Schild A.L. Boletim do laboratório regional de diagnóstico.
2392 Universidade Federal de Pelotas. Nº 35, 2013, 64p.
- 2393 Souza R.I.C., Santos A.C., Ribas N.L.K.S., Colodel E.M., Leal P.V., Pupin R.C.,
2394 Carvalho N.M., Lemos R.A.A. Doenças tóxicas de bovinos em Mato Grosso do Sul.
2395 *Semina: Ciências Agrárias, Londrina*, v.36, n.3, p.1355-1368, 2015.

2396

2397 EQUIPE

2398 Ricardo Antônio Amaral de Lemos, CPF 416.816.310-04. Professor Adjunto,
2399 ricardo.lemos@ufms.br

2400 Danilo Carloto Gomes, CPF 345.046.518-07, Professor Adjunto,
2401 danilo.gomes@ufms.br

2402 Tessie Beck Martins, CPF 010.828.550-22, Professor Adjunto,
2403 tessie.martins@ufms.br

- 2404 Cassia Rejane de Brito Leal, CPF 404.192.235-68, Professor Adjunto,
2405 cassia.leal@ufms.br
- 2406 Fernando de Almeida Borges, 037.459.996-30, Professor Adjunto,
2407 fernando.borges@ufms.br
- 2408 Rayane Chitolina Pupin, CPF 024826451-66, Técnica de Nível Superior,
2409 rayane.pupin@ufms.br
- 2410 Nickolly Lilge Kawski de Sá Ribas, CPF 008.184.111-63, Técnica de laboratório,
2411 nicklk@yahoo.com.br
- 2412 Paula Velozo Leal, CPF 730.073.401-44, Mestre, paulavleal@hotmail.com
- 2413 Juliana Paniago Lordello de Paula, CPF 733.513.181-20, aluna de Mestrado

2414
2415**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO**

ATIVIDADES	2017												2018												2019				
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M
Estudo retrospectivo 1995-2016				X	X	X	X	X	X																				
Estudo prospectivo 2017-2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Análise dos dados										X	X	X	X																
Revisão de literatura								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Redação																							X	X	X	X	X	X	
Publicação de artigos																							X	X	X	X	X		
Defesa da tese																													X

2416

2417 ORÇAMENTO

2418

2419 Não serão necessários recursos adicionais além dos já utilizados pelo laboratório.

2420

2421 INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES

2422

2423 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

2424

2425 PRODUTOS DA PESQUISA

2426

2427 Além da produção de tese de doutorado, tem-se como objetivos adicionais dessa pesquisa a confecção de artigos científicos que abordem aspectos epidemiológicos, sinais clínicos, achados de necropsia e histopatológicos das principais doenças de bovinos e também a

2428 confecção de um guia prático que aborde as principais síndromes clínicas das doenças de

2429 bovinos e que possa ser usado por veterinários de campo.

2430

2431

2432

2433 INOVAÇÃO

2434

2435 A proposta representa uma importante contribuição acadêmica e prática, pois objetiva-se

2436 ao fim do projeto a elaboração de material destinado, principalmente, aos médicos

2437 veterinários que atuam no campo que sirva de orientação e informação sobre as principais

2438 doenças de bovinos no estado de Mato Grosso do Sul e, baseado nos dados

2439 epidemiológicos, listar possíveis etiologias e achados de necropsia dessas enfermidades.

ANEXO 2 – AUTORIZAÇÕES LEGAIS

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Comissão de Ética no Uso de Animais /CEUA

C E R T I F I C A D O

Certificamos que o Protocolo nº 400/2012 do Pesquisador Ricardo Antônio Amaral de Lemos referente ao projeto de pesquisa **“Plantas tóxicas de interesse pecuário em Mato Grosso do Sul – estimativas de perdas produtivas e desenvolvimento de modelos experimentais para avaliar tecnologias aplicadas ao controle das intoxicações”**, está de acordo com a legislação vigente e demais disposições da ética em investigação que envolvem diretamente os animais e foi aprovado pela **COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS/CEUA/UFMS**, em reunião ordinária de 17 de maio de 2012.

Campo Grande (MS), 17 de maio de 2012.

Drª Joice Stein
Coordenadora da CEUA