UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL
CURSO DE MESTRADO

**UREIA EXTRUSADA NO SUPLEMENTO ALIMENTAR E IMUNOCASTRACÃO PARA TERMINACÃO
DE CORDEIROS EM PASTAGENS**

MARIANA DE NADAI BONIN

CAMPO GRANDE – MS
FEVEREIRO - 2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL
CURSO DE MESTRADO

**UREIA EXTRUSADA NO SUPLEMENTO ALIMENTAR E
IMUNOCASTRÃO PARA TERMINAÇÃO DE CORDEIROS EM
PASTAGENS**

MARIANA DE NADAI BONIN

Médica Veterinária

Orientador: Prof^ª. Dr^ª. Camila Celeste
Brandão Ferreira Ítavo

Co-Orientador: Prof. Dr. Luís Carlos Vinhas
Ítavo

Dissertação apresentada à Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, como parte
das exigências para obtenção do título de
Mestre em Ciência Animal. Área de
concentração: Produção Animal.

CAMPO GRANDE – MS
FEVEREIRO - 2020

Certificado de aprovação

Mariana de Nadai Bonin

Ureia extrusada no suplemento e imunocastração para terminação
de cordeiros em pastagens

Extruded urea in supplement and immunocastration for finishing
lambs in pastures

Dissertação apresentada à
Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul, como requisito à obtenção do
título de Mestre em Ciência Animal.

Aprovado(a) em: 20-02-2023

BANCA EXAMINADORA:

Dra. Camila Celeste Brandão Femeira Lavo
Orientadora (UFMS)

Dr. Gelson dos Santos Difante
(UFMS)

Dra. Maria Inês Lenz Souza
(UFMS)

Dedicatória

Dedico este trabalho aos meus pais, Vera e Paschoal,
aos meus irmãos Marcio e Marina,
aos meus avós Idalina, Assunta e Eden (em memória),
os quais sempre dedicaram muito de suas vidas a mim.

Agradecimentos

Agradeço imensamente Àquele que nunca abandona, que nunca desampara, ao qual eu nunca questiono: Deus;

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ/UFMS), ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFMS e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil.

Ao patrocínio pela empresa Amireia Pajoara;

Aos meus pais e irmãos, que sempre me apoiaram em todas as minhas escolhas e serviram de exemplo para a maioria delas. Em especial a minha irmã Marina de Nadai Bonin Gomes, que me acolheu e cuidou com todo amor e responsabilidade de mãe para as emoções e orientadora para os estudos. Ao meu cunhado e professor Rodrigo da Costa Gomes, obrigada por toda paciência;

Às minhas avós, Assunta Breda de Nadai e Idalina Feltrin Bonin que mesmo de longe nunca me deixaram de fora de suas orações e ao meu avô Eden Bonin que cuida lá de cima de todos os meus passos;

À minha Orientadora Prof^a Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo e ao meu Co-Orientador Prof. Luís Carlos Vinhas Ítavo pela oportunidade de crescer, por todas as dúvidas sanadas e as dificuldades vencidas;

A todos os decentes do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, especialmente Prof. Breno Fernandes Barreto Sampaio, Prof. Gelson Difante e Prof^a Alda Izabel de Souza, que colaboraram com este trabalho;

Ao Grupo de Estudos em Ovinocultura (GEO), por todo trabalho, por toda ajuda, sem vocês eu não teria conseguido nada;

Às minhas grandes amigas Aline Gabarrão e Kedma Monteiro Ferelli, obrigada por toda ajuda, por todas as broncas, por todas as risadas e também por todas as lágrimas que derramamos sempre juntas frente as dificuldades enfrentadas... e vencemos todas!

Àquela que muito mais que professora e mestre, sempre muito amiga, disposta a ajudar e nos ouvir, Prof^a Marjorie Toledo Duarte;

Aos meus amigos Gabriella Jorgetti, Marcus Niwa e Eduardo Leal, por me ajudarem a conduzir o experimento com muita risada e enxergando o lado divertido de todo o trabalho;

As minhas estagiárias, Camila de Godoy, Aline Miguel, Amanda Godoy, Belém (Rosanne Luz) que com muito amor e às vezes com menos paciência que mereciam, procurei ensinar tudo que pude e que me ensinaram em dobro, como alunas e como amigas;

E a todos àqueles que aqui não foram citados, mas sabem de sua importância nesta trajetória: MEU MUITO OBRIGADO!

Epígrafe

“Deus está no controle, não há o que temer!”

UREIA EXTRUSADA NO SUPLEMENTO ALIMENTAR E IMUNOCASTRÃO PARA TERMINAÇÃO DE CORDEIROS EM PASTAGENS

Resumo: Os resultados deste estudo foram divididos em dois artigos. O primeiro artigo refere-se ao uso de ureia extrusada em suplementos para terminação de cordeiros cruzados SRD x Texel, aos 5 meses de idade, durante 90 dias em pastos de *Brachiaria* spp. Os animais foram divididos em dois tratamentos: suplementação com ureia extrusada substituindo 50% da proteína do farelo de soja e suplementação sem ureia extrusada, onde foram avaliados o consumo de suplemento, de proteína bruta, de farelo de soja e de ureia extrusada, o peso vivo inicial e ao abate, escore de condição corporal inicial e final, ganho médio diário, peso e rendimento de carcaça quente, comprimento de carcaça, profundidade torácica, espessura de gordura subcutânea e área de olho de lombo medidas por ultrassom in vivo e na carcaça pós abate, maturidade de carcaça, marmoreio, textura da carne e da gordura, força de cisalhamento da carne, pH da carne, perdas por cozimento, cor da carne e da gordura. No sangue foram avaliados os parâmetros de AST, GGT, albumina, creatinina, proteínas totais e ureia. Tivemos como resultados a ausência de efeito de tratamento com e sem a adição de ureia extrusada no suplemento alimentar sobre o consumo de suplemento e consumo de proteína bruta. Houve diferença para o peso corporal médio (34,0 vs. 35,2 kg), ganho médio diário (242,1 vs. 264,6 g/dia), peso de abate (41,9 vs. 45,0 kg) e peso de carcaça (18,9 vs. 20,1 kg). Não houve efeito do uso de ureia extrusada para Escore de Condição Corporal inicial (2,0 vs. 2,0) e final (2,8 vs. 2,8), rendimento de carcaça quente (2,8 vs. 2,8), comprimento de carcaça (66,9 vs. 66,0 cm), profundidade torácica (28,0 vs. 29,7), espessura de gordura subcutânea na carcaça (3,6 vs. 3,1 mm) e área de olho de lombo (14,1 vs. 14,6 cm²) dos animais. O grupo de animais que receberam a ureia extrusada apresentaram carcaças de qualidade superior para as características de acabamento de carcaça (99% vs. 66%), maturidade (22% vs. 0%), marmoreio (55% vs. 33%), textura da carne (44% vs. 33%) e da gordura (66% vs. 22%). Não houve efeito significativo para maciez e cor da carne e da gordura. Não houve alterações significativas no perfil bioquímico do sangue (gama-glutamiltransferase, aspartato aminotransferase, albumina, creatinina, proteína total, ureia) dos animais durante o experimento em ambos os tratamentos. A

inclusão de ureia extrusada no suplemento para terminação de cordeiros em pastagens é praticável para a produção de carcaças de qualidade. O segundo artigo, teve como objetivo avaliar o efeito da vacina anti-GnRH para castração de cordeiros destinados a terminação em pastagens e resultou em diferença entre animais imunocastrados e inteiros respectivamente, para o peso ao abate (45,23 vs. 47,41 kg), ganho de peso total (9,05 vs. 11,23 kg), ganho médio diário (95,30 vs. 118,27 g/dia) e conversão alimentar (6,51 vs. 5,29). Houve efeito significativo para motilidade (4,5 vs. 61,0), vigor (0,40 vs. 3,00), volume (0,09 vs. 0,74) e turbilhonamento (0,20 vs. 2,70) na terceira colheita de sêmen que foi 30 dias após a segunda dose da vacina. Houve efeito significativo para peso dos testículos (0,09 vs. 0,35 g). Não houve alteração no perfil bioquímico do sangue dos animais. A imunocastração é eficaz para a esterilização de cordeiros em terminação e pode ser adotada sem prejudicar o desempenho dos mesmos.

Palavras-chave: amireia, *Brachiaria* spp., carcaça, desempenho produtivo, ovinos

UREA EXTRUDED IN FOOD SUPPLEMENT AND IMMUNOCASTRATION FOR FINISHING LAMBS IN PASTURES

Abstract: The results of this study were divided into two articles. The first article refers to the use of extruded urea in supplements for finishing lambs SRD x Texel, at 5 months of age, for 90 days in pastures of *Brachiaria* spp. The animals were divided into two treatments: supplementation with extruded urea replacing 50% of the soy bran protein and supplementation without extruded urea, where the consumption of supplement, crude protein, soy bran and extruded urea, weight live and at slaughter, initial and final body condition score, average daily gain, hot carcass weight and yield, carcass length, chest depth, subcutaneous fat thickness and rib eye area measured by ultrasound in vivo and in the carcass post slaughter, carcass maturity, marbling, meat and fat texture, meat shear strength, meat pH, cooking losses, meat and fat color. In the blood, the parameters of AST, GGT, albumin, creatinine, total proteins and urea were

evaluated. The results were that there was no treatment effect with and without the addition of extruded urea in the food supplement on the consumption of supplement and consumption of crude protein. There was a difference for average body weight (34.0 vs. 35.2 kg), average daily gain (242.1 vs. 264.6 g / day), slaughter weight (41.9 vs. 45.0 kg) and carcass weight (18.9 vs. 20.1 kg). There was no effect of using extruded urea for the initial (2.0 vs. 2.0) and final (2.8 vs. 2.8) Body Condition Score, hot carcass (2.8 vs. 2.8), carcass length (66.9 vs. 66.0 cm), chest depth (28.0 vs. 29.7), subcutaneous fat thickness in the carcass (3.6 vs. 3.1 mm) and loin eye (14.1 vs. 14.6 cm²) of the animals. The group of animals that received extruded urea showed superior carcasses for carcass finishing characteristics (99% vs. 66%), maturity (22% vs. 0%), marbling (55% vs. 33%), meat texture (44% vs. 33%) and fat (66% vs. 22%). There was no significant effect on the tenderness and color of meat and fat. There were no significant changes in the blood biochemical profile (gamma-glutamyltransferase, aspartate aminotransferase, albumin, creatinine, total protein, urea) during the experiment in both treatments. The inclusion of extruded urea in the supplement for finishing lambs in pastures is feasible for the production of quality carcasses. The second article aimed to evaluate the effect of the anti-GnRH vaccine for castration of lambs destined for pasture and resulted in a difference between immunocastrated and whole animals, respectively, for slaughter weight (45.23 vs. 47.41 kg), total weight gain (9.05 vs. 11.23 kg), average daily gain (95.30 vs. 118.27 g / day) and feed conversion (6.51 vs. 5.29). There was a significant effect on motility (4.5 vs. 61.0), vigor (0.40 vs. 3.00), volume (0.09 vs. 0.74) and swirling (0.20 vs. 2.70) in the third semen collection that was 30 days after the second dose of the vaccine. There was a significant effect on testicles weight (0.09 vs. 0.35 g). There was no change in the biochemical profile of the animals' blood. Immunocastration is effective for the sterilization of finishing lambs and can be adopted without impairing their performance.

Keywords: amireia, *Brachiaria* spp., Carcass, productive performance, sheep

Sumário

Introdução	9
Revisão Bibliográfica.....	11
1. Ovinocultura de corte	11
2. Pastagens de <i>Brachiaria spp.</i>	12
3. Suplementação de ovinos em pastagens de <i>Brachiaria spp.</i>	13
4. Ureia extrusada	13
5. Imunocastração	14
Referências bibliográficas	17
USO DE UREIA EXTRUSADA EM SUPLEMENTOS PARA TERMINAÇÃO DE CORDEIROS EM PASTAGENS	19
Introdução	22
Material e métodos.....	23
Resultados e Discussão.....	26
1. Consumo.....	26
2. Desempenho produtivo	27
3. Sangue.....	30
Conclusões	31
Referências bibliográficas	32
EFICIÊNCIA DA VACINA ANTI-GnRH PARA CASTRAÇÃO DE CORDEIROS DESTINADOS À TERMINAÇÃO EM PASTAGEM.....	35
Introdução	38
Material e Métodos.....	39
Resultados e discussão	41
1. Características seminais	41
2. Características histológicas dos testículos de animais inteiros e imunocastrados.....	43
3. Desempenho produtivo	45
4. Sangue	47
Conclusão	48
Referências bibliográficas	49
Considerações finais	52

Introdução

Grande parte da carne produzida no Brasil é originada de animais produzidos e terminados a pasto. As pastagens de *Brachiaria spp.* são as gramíneas cultivadas mais comumente encontradas no país por tratar-se de pastagens que oferecem uma boa cobertura de solo, uma satisfatória produção animal quando bem manejadas, exige baixa mão-de-obra e o uso de tecnologias simples e de fácil aplicação, propiciando um sistema de produção barato (Crispim & Branco, 2002).

Em virtude de o país ser predominantemente de clima tropical, contamos com uma flutuação da produção de massa verde segundo a sazonalidade da produtividade. Para que seja possível lidar com tais peculiaridades ambientais, pode-se utilizar a suplementação a pasto que permite alocar maior número de animais por área, encurtar o ciclo de terminação gerando uma carne de melhor qualidade e uma maior rotatividade financeira ao produtor.

No suplemento utilizado a pasto, pode-se utilizar ingredientes que melhorem ainda mais o desempenho animal, entre eles está a ureia, que é uma forma barata de melhorar a eficiência do consumo da pastagem de baixa qualidade na época da seca, alcançando mais facilmente a exigência nutricional da categoria, favorecendo um maior ganho de peso, devido ao fato dos ruminantes possuírem a capacidade de transformar fontes de NNP em proteína através do ciclo da ureia (Berchielli et al., 2006).

Na ovinocultura de corte, a castração de machos tem como objetivo reduzir o efeito do comportamento sexual, disputa por dominância e facilidade no manejo para formação de lotes, uma vez que torna possível a mistura de animais de diferentes sexos em um mesmo local. No entanto, as técnicas cirúrgicas tradicionalmente utilizadas não favorecem o bem-estar animal, além de trazer prejuízos ao desempenho, gastos com medicamentos e até a perda de animais (Price et al., 2003). Desta maneira, alternativas devem ser buscadas, como a castração imunológica, a fim de evitar os problemas causados pelas técnicas tradicionais, e usufruir dos benefícios da castração para a produção de carcaças e carne de qualidade (Zanella et al., 2009).

A qualidade das carcaças, no entanto, deve estar em consonância com aspectos produtivos como ganho de peso, velocidade ao atingir o peso ideal de abate, eficiência na deposição de tecidos na carcaça e ainda a precocidade de acabamento, fator determinante para a qualidade visual dos cortes e prevenção do encurtamento das fibras musculares pelo frio, por exemplo, o que causaria menor maciez a carne. Animais castrados são mais precoces para deposição de gordura na carcaça. Por outro lado, animais inteiros apresentam um melhor desempenho produtivo, devido principalmente a ação da testosterona, que potencializa a deposição muscular e, conseqüentemente, melhora a eficiência para o ganho de peso, fazendo com que machos inteiros atinjam o peso ideal de abate mais precocemente que animais castrados (Machado et al., 2018).

Neste sentido, ao abordarmos a produção de ovinos machos para o abate, há de se aliar as potencialidade e deficiências produtivas de cada classe sexual e elaborar alternativas nutricionais para equalizá-las. Assim, a suplementação de cordeiros terminados a pasto, com ureia extrusada, pode ser uma alternativa a produção de carcaças de animais castrados e inteiros com padrões semelhantes de qualidade.

Desta forma, este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia da imunocastração em ovinos e a suplementação com ureia extrusada para terminação de cordeiros em pastagem de *Brachiaria* spp.

Revisão Bibliográfica

1. Ovinocultura de corte

A ovinocultura de corte tem conquistado espaço entre os produtores rurais por demandar um menor investimento em infraestrutura e suplementação comparados à bovinocultura de corte, além de poder ser uma alternativa de renda ao pequeno e médio produtor (Ítavo et al., 2019). A menor duração do ciclo de criação, prolificidade dos animais, produção de carcaça e, por parte dos consumidores, melhor aceitação dos produtos cárneos ovinos colaboram fortemente para este crescimento produtivo (Simplício et al., 2003).

Ainda que modesto, o crescimento anual da importação de carne ovina é real, já que o apreço pela diversificação de cortes e por pratos com este ingrediente tem aumentado significativamente na população (Martins et al., 2016). O Brasil ainda importa grande parte da carne ovina de países como Uruguai e Argentina, pois a produção nacional não é capaz de atender sozinha a demanda do país. Portanto, torna-se indispensável que se intensifique a produção de cordeiros em quantidade e qualidade para que o país se torne autossuficiente neste mercado (Ítavo et al., 2019).

Na produção de ovinos de corte, o cordeiro é a categoria animal que fornece carne de melhor qualidade, apresenta maior rendimento de carcaça e eficiência de produção, devido a sua alta velocidade de crescimento (Pires et al., 2006).

A qualidade da carne dos ovinos é uma combinação dos atributos de sabor, suculência, textura, maciez e aparência, associados a carcaças com cobertura de gordura satisfatória e elevadas proporções dos cortes de maior valor agregado (Silva Sobrinho et al., 2005). Combinações de raça, idade ao abate, alimentação, sistema de produção, manejo, sexo, condição sexual, maturidade e condição corporal dos animais podem ser utilizados para produção de carcaças de qualidade que, junto a qualidade da carne, são os principais itens desejados para animais de terminação. Portanto, é de suma importância que estes animais sejam abatidos no momento exato em que reúnam todos os atributos sensoriais preferidos pelos consumidores (Osório et al., 2012).

2. Pastagens de *Brachiaria spp.*

Apesar da grande extensão de área para produção de pastagens, a região central do país sofre com a grande flutuação da produção de massa verde, decorrente de diversos fatores como degradação de culturas, infertilidade de solo, sazonalidade, escassez ou excesso de chuvas, além da característica alagadiça da planície pantaneira. Assim, torna-se justificável o investimento em pesquisas para o sucesso da pecuária em pastos de *Brachiaria spp.* por tratar-se de um sistema de produção barato, que proporciona boa cobertura de solo, satisfatória produção animal quando bem manejado, exige baixa mão-de-obra e colabora ainda mais para o avanço da pecuária (Crispim & Branco, 2002).

As gramíneas do gênero *Brachiaria spp.* apresentam características positivas como a facilidade de colheita do pasto pelo animal, relação folha:colmo, espessura de colmo, altura do dossel forrageiro, resistência a solos ácidos, de baixa fertilidade e persistência por maior tempo no período seco do ano (Dias et al, 2019).

Por outro lado, os principais desafios à produção de ovinos de corte na região centro-oeste, está a dificuldade em produzi-los a pasto, já que a maior parte das pastagens desta região é composta por gramíneas do gênero *Brachiaria spp.* As gramíneas deste gênero são potencialmente tóxicas aos ovinos, por fazer parte de sua composição bromatológica saponinas esteroidais litogênicas chamadas protodioscinas, responsáveis pela ocorrência de fotossensibilização hepatógena, que é a principal característica clínica associada a *Brachiaria spp.* em ovinos (Melo et al., 2018).

Técnicas como piqueteamento com rodízio dos animais, diferimento de pastagens, uso de animais controle para manter a altura ideal das plantas para pastejo em seu melhor estágio nutritivo, adubações e correções de solo periódicas (Crispim & Branco, 2002), podem ser utilizadas para melhoria dos índices produtivos das pastagens e, também, para o controle de incidência de fotossensibilização em ovinos.

A suplementação a pasto com concentrado proteico melhora o estado nutricional dos ovinos, colaborando para uma melhor vitalidade, tornando o animal mais resistente aos componentes tóxicos presentes nas *Brachiaria* spp, sendo uma ferramenta nutricional que pode diminuir os efeitos da intoxicação pelas gramíneas do gênero, em ovinos (Melo et al., 2018).

O Setor de Ovinocultura da UFMS, através de vários projetos de pesquisa com a utilização de pasto de *Brachiaria* spp., exclusivamente para a criação e produção de ovinos, têm encontrado baixíssima morbidade por fotossensibilização, tanto por resistência dos animais, como pelo uso de estratégias nutricionais que diminuíram a prevalência da doença (Dias et al., 2019).

3. Suplementação de ovinos em pastagens de *Brachiaria* spp.

A terminação de ovinos em pastagens de *Brachiaria* spp., ainda que pouco utilizada em sistemas intensivos, é uma alternativa ao confinamento quando utilizada a suplementação proteico-energética para atender as exigências de ganho de peso (Ítavo et al., 2019).

Outro fator que realça a importância da suplementação de ruminantes em pastagens tropicais, são estudos que comprovam o aumento na precocidade dos animais para abate e a melhor qualidade de carcaça obtida para cortes especiais e mercados mais exigentes em qualidade de carne, que estão dispostos a pagar por este diferencial (Reis et al., 2012).

A incorporação de ureia na dieta de cordeiros é uma forma barata para melhorar a eficiência do consumo da pastagem de baixa qualidade no período de seca e alcançar a exigência nutricional da categoria, proporcionando ganho de peso satisfatório, já que ruminantes possuem a capacidade de transformar fontes de nitrogênio não proteico em proteína através do ciclo da ureia (Berchielli et al., 2006).

4. Ureia extrusada

A ureia extrusada é o produto obtido pela extrusão de uma mistura de amido e ureia, sob condições de alta temperatura e pressão, levando à

gelatinização do amido. Neste tipo de processamento, o grânulo de amido é gelatinizado e a ureia transformada, desde uma estrutura cristalina para uma estrutura não-cristalina, fazendo com que a maior parte das estruturas não-cristalinas se encontrem na porção gelatinizada, tornando a mistura mais palatável e aumentando a aceitabilidade do concentrado pelos animais (Bartley & Deyoe, 1975; Teixeira et al., 1988).

Na ureia extrusada, o amido fornece energia disponível aos microrganismos do rúmen, ao mesmo tempo que a ureia é hidrolisada em amônia, provendo, simultaneamente os principais componentes para a síntese microbiana (Gonçalves et al., 2003).

Nesse processo, o grão de amido é gelatinizado e a ureia, que originalmente está na forma cristalina, após sofrer modificação na sua estrutura, torna-se menos disponível ao ataque da urease bacteriana em relação a sua forma original. Além disso, o amido gelatinizado resulta em um produto mais fermentável, o qual reduz o pH do rúmen. Conseqüentemente a absorção da amônia é mais lenta e a concentração no sangue é menor, reduzindo os riscos de toxidez. Uma maximização da síntese proteica microbiana pode ocorrer, aumentando a digestão, as taxas de passagem, a ingestão de matéria seca e o desempenho animal (Moraes et al., 2019).

Além das vantagens nutricionais, a ureia extrusada é um produto que apresenta melhores características de manuseio, produzindo excelentes misturas ao ser incorporada na ração, uma vez que, pelo processo de extrusão, ocorre redução no alto teor de higroscopicidade da ureia, levando a melhor aceitabilidade pelos animais (Bartley & Deyoe, 1975).

5. Imunocastração

A castração dos machos é realizada com o objetivo de reduzir o efeito anabólico da testosterona e aumentar a deposição de gordura na carcaça, além de diminuir o comportamento de macho promovido por este hormônio, reduzindo a atividade física e gasto de energia em brigas por dominância e sodomia (Machado et al., 2018).

Porém, a técnica de castração cirúrgica realizada a campo é um método cruento de esterilização dos animais, que não valoriza os preceitos de bem-estar animal, além de poder causar diversas complicações pós-operatórias como inflamações e miíases na ferida, sendo até mesmo causa de morte, acarretando gastos com medicamentos e prejuízos pela perda de animais (Price et al., 2003).

Como forma de superar grande parte das desvantagens causadas pela castração cirúrgica, ainda mantendo seus benefícios, criou-se a imunocastração, uma forma de esterilização imunológica através de uma vacina anti-GnRH. A vacina funciona como um supressor do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), que tem papel na regulação central da função sexual, resultando na supressão da secreção das gonadotrofinas hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo estimulante (FSH) na hipófise anterior, e conseqüente redução na produção de testosterona nas gônadas masculinas (Janett et al., 2012; Zanella et al., 2009).

A técnica de esterilização de ovinos ainda jovens, possibilita que as principais características da carne de cordeiro, como o sabor e a maciez, sejam estendidas por mais tempo, possibilitando que os animais tenham mais tempo para ganharem peso e desenvolverem uma melhor composição de carcaça. Além disso, a utilização da vacina não exige período de carência para o abate por se tratar de um produto não-hormonal e que não deixa resíduos no organismo animal (Amatayakul-Chantler et al., 2013).

A castração através de vacina anti-GnRH já foi validada em estudos com diversas espécies de animais como bovinos, suínos, equinos e animais selvagens (Janett et al., 2012).

Para bovinos, espécie para a qual a vacina Bopriva® foi originalmente desenvolvida, são recomendados pela empresa Zoetis® protocolos com duas doses alternadas e intervalos diferentes. O intervalo entre a primeira e a segunda dose vai determinar o efeito castrado nos animais, que se inicia 10 dias após a segunda aplicação. Quando o intervalo entre doses for de 30 dias, o efeito castrado se estende por 90 dias; com intervalo de 60 ou 90 dias entre doses o efeito castrado é de 120 ou 150 dias, respectivamente. Quando necessário o uso de uma terceira dose, o efeito se estende por mais 150 dias.

Desta forma, faz-se necessário o estudo da eficiência para utilização deste método de castração em ovinos e seus impactos nas características reprodutivas e produtivas a fim de avaliar a eficácia e viabilidade de utilização desta técnica nos sistemas de produção de ovinos.

Assim, foram elaborados dois artigos com os títulos “Uso de ureia extrusada em suplementos para terminação de cordeiros em pastagem” e “Efeito da vacina anti- GnRH para castração de cordeiros destinados a terminação em pastagens”, sob as normas da revista *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition* (normas no anexo), trazendo os resultados do uso da suplementação de ovinos a pasto com ureia e do uso da vacina anti-GnRH para castração de ovinos.

Referências bibliográficas

AMATAYAKUL-CHANTLER, S. et al. (2013) Effects on performance and carcass and meat quality attributes following immunocastration with the gonadotropin releasing factor vaccine Bopriva or surgical castration of *Bos indicus* bulls raised on pasture in Brazil. *Meat Science*, 95, 78-84. <http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2013.04.008>.

BARTLEY, E.E.; DEYOE, C.W. (1975) Starea as a protein replace for ruminants. *Feedstuffs*, Minneapolis, 47, 30, 42-44.

BERCHIELLI, T.T.; PIRES, A.V.; OLIVEIRA, S.G. (2006) *Nutrição de ruminantes*. Jaboticabal: FUNEP, 583p.

CRISPIM, S.M.A.; BRANCO, O.D. (2002) Aspectos gerais das Braquiárias e suas características na sub-região da Nhecolândia, Pantanal, MS. In: _____. Corumbá: Embrapa Pantanal, 25 p.

DIAS, A. M. et al. Pastagens para ovinos. (2019) In: *Viva Ovinocultura*. 1. ed. Campo Grande: Editora UFMS, p. 52-84.

FARINATTI, L. H. E. et al. (2006) Desempenho de ovinos recebendo suplementos ou mantidos exclusivamente em pastagem de azevém (*Lolium multiflorum* Lam.) *Revista Brasileira de Zootecnia*. 35, 2, 527-534. <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982006000200027>.

GONÇALVES, C. C. M. et al. (2003) Desempenho de bovinos de corte no pasto suplementados com misturas múltiplas contendo ureia e amireia. *Ciência Agrotécnica*. 28, 1, 174-181. <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-70542004000100023>.

ITAVO, C. C. B. F. et al. (2019) Produção de ovinos de corte no cerrado. *Viva Ovinocultura*. 1. ed. Campo Grande: Editora UFMS, 9-50.

JANETT, F. et al. (2012) Vaccination against gonadotropin-releasing factor (GnRF) with Bopriva significantly decreases testicular development, serum testosterone levels and physical activity in pubertal bulls. *Theriogenology*. 78, 182-188. <http://dx.doi.org/10.1016/j.theriogenology.2012.01.035>.

MACHADO, D. S. et al. (2018) Meta-analysis of the immunocastration technique (anti-GnRH) for male bovines in the finishing phase. *Pesquisa agropecuária brasileira*, Brasília, 53, 961-969. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2018000800011>.

MARTINS, E. C. et al. (2016) Cenários mundial e nacional da caprinocultura e da ovinocultura. *Boletim Ativos de Ovinos e Caprinos*, Brasília, 3, 2, 1-6.

MELO, G. K. A. et al. (2018) Poisoning by *Brachiaria* spp. in suckling lambs supplemented and unsupplemented in a creep-feeding system. *Small Ruminant Research*, 158, 30-34. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2017.11.014>

MORAES, G. J. et al. (2019) Extruded urea could reduce true protein source in beef cattle diets. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*. 103, 1283-1294. <https://doi.org/10.1111/jpn.13140>

OSÓRIO, M. et al. (2012) Características sensoriais da carne de ovinos Corriedale em função da idade de abate e da castração. *Agrarian*, 6, 19, 60-66. <http://dx.doi.org/10.30612/agrarian.v6i19.1869>

PIRES, C.C. et al. (2006) Características da carcaça de cordeiros alimentados contendo diferentes níveis de fibra em detergente neutro. *Revista Brasileira de Zootecnia*, 35, 5, 2058-2065. <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982006000700025>.

PRICE, E. O. et al. (2003) Aggressive behavior is reduced in bulls actively immunized against gonadotropin-releasing hormone. *Journal of Animal Science*. 81, 2, 411-5. <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982006000700025>.

REIS, R. A. et al. (2012) Suplementação como estratégia de produção de carne de qualidade em pastagens tropicais. *Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal*, 13, 3, 642-655. <http://dx.doi.org/10.1590/S1519-99402012000300005>.

SILVA SOBRINHO, A. et al. (2005) Características de qualidade da carne de ovinos de diferentes genótipos e idades ao abate. *Revista Brasileira de Zootecnia*. 34, 3, 1070-1078. <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982005000300040>.

SIMPLÍCIO, A. A. et al. (2003) Caprino-ovinocultura de corte como alternativa para a geração de emprego e renda. *Embrapa Caprinos – Documentos*, Sobral - CE, p. 44.

TEIXEIRA, J.C. et al. (1988) Use of amirea in rabbits as nitrogen source in partial substitution for soybean meal. *Journal of Animal Science*, Champaign, 66, 1, 337-338.

ZANELLA, R. et al. (2009). Características testiculares de touros imunizados com vacina anti-hormônio liberador do hormônio luteinizante. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, 44, 10, 1359-1363. <https://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2009001000021>

USO DE UREIA EXTRUSADA EM SUPLEMENTOS PARA TERMINAÇÃO DE CORDEIROS EM PASTAGENS

Mariana de Nadai Bonin - Discente de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal – UFMS, marianabonin@hotmail.com

Kedma Leonora Silva Monteiro Ferelli - Discente de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal – UFMS, ked_monteiro@hotmail.com

Camila de Godoy⁴ - Discente de Graduação em Zootecnia e Iniciação Científica - FAMEZ – UFMS, camiladegodoy-93@hotmail.com

Marina de Nadai Bonin Gomes - Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal – UFMS, marinabonin@hotmail.com

Luís Carlos Vinhas Ítavo - Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal – UFMS, luis.itavo@ufms.br

Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo – Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal – UFMS, camila.itavo@ufms.br

Autor correspondente: Mariana de Nadai Bonin - marianabonin@hotmail.com
– FAMEZ/UFMS - Av. Senador Filinto Müller, 2443 - Pioneiros, Campo Grande - MS, 79070-900, Brasil.

1 **Resumo:** Objetivou-se avaliar os efeitos da substituição de 50% da proteína
2 verdadeira do farelo de soja por ureia extrusada sobre o desempenho, qualidade
3 de carne e carcaça de cordeiros terminados em pastagem. Foram utilizados 20
4 cordeiros Texel distribuídos em dois tratamentos em função do peso corporal,
5 durante 90 dias de experimento. Foram avaliados o consumo de suplemento,
6 proteína bruta, farelo de soja e ureia extrusada, peso vivo médio inicial e ao
7 abate, escore de condição corporal inicial e final, ganho médio diário, peso,
8 comprimento e rendimento de carcaça quente, profundidade torácica, espessura
9 de gordura subcutânea e área de olho de lombo ao abate e através de
10 ultrassonografia in vivo, maturidade de carcaça, marmoreio da carne, textura da
11 carne e da gordura, força de cisalhamento da carne, pH da carne, perdas por
12 cozimento, cor da carne e da gordura. No soro sanguíneo foram avaliados AST,
13 GGT, albumina, creatinina, proteína total e ureia. Os dados foram
14 estatisticamente avaliados através de teste T a 0,05% de significância. Não
15 houve efeito de tratamento sobre o consumo de suplemento e consumo de
16 proteína bruta. Houve diferença para o peso corporal médio (34,0 vs. 35,2 kg),
17 ganho médio diário (242,1 vs. 264,6 g/dia), peso de abate (41,9 vs. 45,0 kg) e
18 peso de carcaça (18,9 vs. 20,1 kg). Não houve efeito de tratamento para Escore
19 de Condição Corporal inicial (2,0 vs. 2,0) e final (2,8 vs. 2,8), rendimento de
20 carcaça quente (2,8 vs. 2,8), comprimento de carcaça (66,9 vs. 66,0 cm),
21 profundidade torácica (28,0 vs. 29,7), espessura de gordura subcutânea na
22 carcaça (3,6 vs. 3,1 mm) e área de olho de lombo (14,1 vs. 14,6 cm²). O grupo
23 de animais que recebeu ureia extrusada apresentou carcaças de qualidade
24 superior para as características de acabamento de carcaça (99% vs. 66%),
25 maturidade (22% vs. 0%), marmoreio (55% vs. 33%), textura da carne (44% vs.
26 33%) e da gordura (66% vs. 22%). Não houve efeito significativo para maciez e
27 cor da carne e da gordura. Não houve alterações significativas no perfil
28 bioquímico do sangue (GGT, AST, albumina, creatinina, proteína total, ureia) dos
29 animais durante o experimento em ambos os tratamentos. Desta maneira,
30 indica-se a inclusão da ureia extrusada no suplemento para terminação de
31 cordeiros em pastagens e produção de carcaças de qualidade na substituição
32 de 50% da proteína do farelo de soja do suplemento.

34 **Palavras-chave:** amireia, *Brachiaria spp.*, composição de carcaça, nutrição,
35 ovinos, suplementação.

36

37 **Abstract:** The objective was to evaluate the effects of replacing 50% of the true
38 protein from soybean meal with extruded urea on the performance, meat quality
39 and carcass of lambs finished in pasture. Twenty Texel lambs were used,
40 distributed in two treatments according to body weight, during 90 days of the
41 experiment. The consumption of supplement, crude protein, soybean meal and
42 extruded urea, average initial live weight and at slaughter, initial and final body
43 condition score, average daily gain, weight, length and yield of hot carcass, chest
44 depth, thickness were evaluated of subcutaneous fat and rib eye area at
45 slaughter and through in vivo ultrasound, carcass maturity, meat marbling, meat
46 and fat texture, meat shear strength, meat pH, cooking losses, meat color and
47 fat. In blood serum, AST, GGT, albumin, creatinine, total protein and urea were
48 evaluated. The data were statistically evaluated using the T test at 0.05% of
49 significance. There was no treatment effect on supplement consumption and
50 consumption of crude protein. There was a difference for average body weight
51 (34.0 vs. 35.2 kg), average daily gain (242.1 vs. 264.6 g / day), slaughter weight
52 (41.9 vs. 45.0 kg) and carcass weight (18.9 vs. 20.1 kg). There was no treatment
53 effect for initial (2.0 vs. 2.0) and final (2.8 vs. 2.8) Body Condition Score, hot
54 carcass (2.8 vs. 2.8), length carcass (66.9 vs. 66.0 cm), chest depth (28.0 vs.
55 29.7), subcutaneous fat thickness in the carcass (3.6 vs. 3.1 mm) and rib eye
56 area (14.1 vs. 14.6 cm²). The group of animals that received extruded urea
57 showed superior carcasses for carcass finishing characteristics (99% vs. 66%),
58 maturity (22% vs. 0%), marbling (55% vs. 33%), texture meat (44% vs. 33%) and
59 fat (66% vs. 22%). There was no significant effect on the tenderness and color of
60 meat and fat. There were no significant changes in the blood biochemical profile
61 (GGT, AST, albumin, creatinine, total protein, urea) of the animals during the
62 experiment in both treatments. Thus, it is indicated the inclusion of extruded urea
63 in the supplement for finishing lambs in pastures and production of quality
64 carcasses in the replacement of 50% of the soybean protein in the supplement.

65

66 **Keywords:** amireia, *Brachiaria* spp., Carcass composition, nutrition, sheep,
67 supplementation.

68

69 **Introdução**

70

71 A terminação de ovinos em pastagens de *Brachiaria* spp., ainda que
72 pouco utilizada em sistemas intensivos, é uma alternativa ao confinamento
73 quando utilizada a suplementação proteico-energética para atender as
74 exigências de ganho de peso (Ítavo et al., 2019). A incorporação de ureia na
75 dieta de cordeiros é uma forma barata para melhorar a eficiência do consumo da
76 pastagem de baixa qualidade no período de seca e alcançar a exigência
77 nutricional da categoria, proporcionando ganho de peso satisfatório, já que
78 ruminantes possuem a capacidade de transformar fontes de nitrogênio não
79 proteico em proteína através do ciclo da ureia (Berchielli et al., 2006).

80 A ureia extrusada é o produto resultante da extrusão de uma mistura de
81 amido, ureia e enxofre, por meio de alta temperatura e pressão, levando à
82 gelatinização do amido. Nesse tipo de processamento, o grânulo de amido é
83 gelatinizado e a ureia modificada de uma estrutura cristalina para uma forma
84 não-cristalina, sendo a maior parte das estruturas não-cristalinas encontradas
85 dentro da porção gelatinizada, tornando-a mais palatável que misturas não
86 processadas de grão de ureia, propiciando que o alimento seja melhor aceito
87 pelos animais (Bartley & Deyoe, 1975; Teixeira et al., 1988).

88 Além disso, a taxa de fermentação do amido presente na ureia extrusada
89 pode influenciar a taxa de utilização da mesma pela alteração do suprimento de
90 energia para o crescimento microbiano (Russell et al., 1984). Estudos indicam
91 que o crescimento dos microrganismos é maximizado quando as taxas de
92 fermentação do amido e das proteínas estão sincronizadas (Firkins et al., 1996;
93 Russel et al., 1992).

94 A ureia extrusada funciona como um complexo de liberação lenta,
95 podendo reduzir a toxicidade potencial, e melhorando a aceitabilidade e
96 utilização de concentrados à base de ureia. A liberação gradual de amônia
97 proveniente da dieta e da reciclagem, permite aos microrganismos do rúmen

98 uma síntese lenta e contínua de proteína. Desta forma, otimiza-se parâmetros
99 importantes na avaliação do desempenho animal (Ferreira et al., 1998).

100 Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da
101 substituição de 50% da proteína verdadeira do farelo de soja por ureia extrusada
102 sobre o desempenho produtivo, qualidade de carne e carcaça de cordeiros
103 terminados em pastagem de *Brachiaria* spp.

104

105 **Material e métodos**

106

107 Este trabalho foi aprovado pela CEUA/UFMS - Protocolo n° 862/2017.

108

109 Local e animais

110 O experimento foi realizado na Fazenda Escola da Universidade Federal
111 de Mato Grosso do Sul, localizada em Terenos, Mato Grosso do Sul. Foram
112 utilizados 20 cordeiros cruzados SRD x Texel, contemporâneos, com 5 meses
113 de idade, com peso inicial médio de $29,9 \pm 6,17$ kg, entre diferentes tratamentos
114 contendo ureia extrusada ou não, em quatro piquetes com pastagem de
115 *Brachiaria* spp., em uma área total de 1,27 hectare, com taxa de lotação média
116 de 25,4 animais de 34,6 kg por hectare, durante 90 dias de experimento.

117

118 Composição da dieta:

119 O suplemento foi formulado para que os animais recebessem 2% do peso
120 corporal de suplemento e ganhos esperados de 200 g/dia, conforme as
121 exigências do NRC (2007).

122 O suplemento controle foi composto por fubá de milho (650 g/kg), farelo
123 de soja (300 g/kg) e núcleo mineral (50 g/kg). O suplemento com ureia extrusada
124 (NNP) era composto por fubá de milho (750 g/kg), farelo de soja (150 g/kg),
125 núcleo mineral (50 g/kg) e ureia extrusada (50 g/kg). O suplemento teste foi
126 formulado com objetivo de substituir 50% da proteína verdadeira do farelo de

127 soja por ureia extrusada. A ureia extrusada utilizada foi a Amireia-200® (Pajoara
128 Ind. e Comércio Ltda. Campo Grande - MS, Brasil).

129 Os animais foram distribuídos em módulos com piquetes formados por
130 *Brachiaria spp.*, em pastejo rotacionado de 15 dias por piquete, com lotação fixa,
131 sendo que todos os animais passaram por todos os piquetes. Os piquetes eram
132 providos de comedouros para suplementação e bebedouros com água à
133 vontade.

134 O suplemento foi fornecido todos os dias, uma vez ao dia, no período da
135 manhã, para que os animais consumissem ao longo do dia.

136 Coletas:

137 A cada 30 dias, colheram-se amostras de forragem pelo método de
138 pastejo simulado (Goes et al., 2003; Silveira et al., 2005), sendo evitadas as
139 áreas próximas à estrada, pontos de acúmulo de fezes, proximidades dos
140 cochos, bebedouros e áreas de escassez de forragem. Ao final de cada coleta,
141 amostras compostas pela forragem coletada pelos avaliadores da simulação de
142 cada piquete foram levadas ao Laboratório de Nutrição Aplicada da UFMS para
143 pesagem e posterior análise bromatológica (Tabela 1).

144

145 Tabela 1 - Análise química da forragem de *Brachiaria spp.* em função do mês de
146 utilização, Setor de Ovinocultura, Fazenda Escola da UFMS, Terenos, MS

	Junho	Julho	Agosto
MS (g/kg)	45,26	52,41	40,96
PB (g/kg MS)	6,87	5,18	7,81
FDN (g/kg MS)	58,92	59,66	58,92
FDA (g/kg MS)	37,11	36,90	36,19
NDT (g/kg MS) ¹	59,53	59,23	59,53

MS= Matéria seca, PB= Proteína bruta, FDN= Fibra em detergente neutro, FDA= Fibra em detergente ácido, NDT= Nitrogênio digestível total

¹ Valor estimado pela equação de Capelle et al. (2001): $NDT = 83,79 - 0,4117 * FDN$ ($r^2 = 0,82$; $P < 0,01$)

147 Os animais foram pesados no início do experimento e após 15 dias de
148 adaptação à dieta. Após este período, foram realizadas pesagens a cada 21 dias
149 para posterior determinação do ganho de peso e ajuste do fornecimento de
150 suplemento. Juntamente com cada pesagem foram realizadas as avaliações de

151 escore de condição corporal (ECC), por meio da palpação da região lombar,
152 conferindo-se nota de 1 a 5 (1 para pior e 5 para a melhor) (Russel et al., 1969).

153 O manejo para coleta sanguínea e a avaliação de carcaça por
154 ultrassonografia foram realizados a cada 30 dias. As coletas sanguíneas foram
155 feitas através de venopunção jugular, antes do fornecimento do suplemento,
156 com tubo para coleta sem anticoagulante e as amostras centrifugadas para
157 obtenção de soro, com o objetivo de avaliar os níveis séricos de aspartato
158 aminotransferase (AST), gama glutamiltransferase (GGT), albumina, creatina,
159 proteína total e ureia pelo aparelho Cobas C 111 da marca Roche com kits
160 comerciais específicos para o aparelho.

161 Ultrassonografia de carcaça *in vivo*

162 As avaliações de carcaça por ultrassonografia foram realizadas para
163 avaliação da deposição de tecido adiposo e desenvolvimento muscular, utilizando
164 um equipamento de ultrassom marca Aloka SSD-500, com transdutor linear de
165 12 cm e frequência de 3,5 MHz. As imagens foram salvas e posteriormente
166 interpretadas utilizando-se o Software Lince®.

167 Carne e carcaça:

168 O abate dos animais ocorreu ao final de 90 dias de experimento em
169 frigorífico comercial. Previamente ao abate, os animais permaneceram por 18
170 horas em dieta hídrica. As carcaças foram identificadas individualmente
171 conforme a ordem de abate. Ao final do abate as carcaças foram pesadas para
172 obtenção do peso de carcaça quente e o rendimento de carcaça (relação entre
173 o peso da carcaça quente e o peso vivo ao abate) e transferidas para câmara
174 frigorífica a 2°C, onde permaneceram por 24 horas. Ao final desse período, foram
175 obtidos o peso da carcaça fria e escores de acabamento de carcaça, distribuição
176 de traseiro, conformação e maturidade de carcaça, marmoreio e textura da carne
177 e da gordura.

178 A avaliação de carcaça foi feita conforme metodologia de Muller (1987),
179 enquanto a cor, a textura e a firmeza da carne e da gordura foram verificadas
180 conforme os padrões propostos pela AMSA (2001) e as análises de qualidade
181 da carne foram realizadas segundo procedimentos da AMSA (2016). Foram

182 considerados escores desejáveis para acabamento de carcaça (3 e 4),
183 conformação de carcaça (3 a 5), maturidade de carcaça (1), marmoreio da carne
184 (pouco a superior), textura da carne (2 e 3) e textura da gordura (1).

185 A escala utilizada L*a*b* do sistema CIELAB foi utilizada para avaliação
186 da cor da carne e da gordura, com ângulo de observação de 10° e iluminante
187 D65, utilizando um calorímetro Konica Minolta CR-400 previamente calibrado.
188 As amostras foram expostas ao oxigênio do ambiente durante 20 minutos para
189 blooming prévio às leituras. Os valores finais de L*a*b* foram a média de três
190 leituras.

191 A área de olho de lombo (AOL) e a espessura de gordura subcutânea
192 (EGS) na carcaça após o abate foram avaliadas no músculo *longissimus*, entre
193 12ª e 13ª costelas da meia carcaça direita. A primeira desenhada sobrepondo-
194 se papel vegetal sobre a secção do músculo e, posteriormente, calculada com
195 auxílio de uma grade transparente quadriculada, resultando na área em cm². A
196 EGS, em milímetros, foi obtida na mesma secção do *longissimus*, no terço final
197 do músculo, utilizando-se um paquímetro.

198 O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, a análise dos
199 dados realizada por meio de análises de variância, com as médias comparadas
200 por meio do teste F, ao nível de significância de 0,05%, utilizando-se o modelo
201 estatístico representado por:

$$202 \quad Y_{ij} = \mu + t_i + e_{ij}$$

203 em que μ = média geral; t_i = efeito de tratamento; $i = 1,2$; e_{ij} = erro aleatório
204 associado a observação Y_{ij}

205 **3. Resultados e Discussão**

206 **1. Consumo**

207 Não houve efeito de substituição do farelo de soja por ureia extrusada no
208 consumo de suplementos e de proteína bruta por ovinos mantidos em pastos de
209 *Brachiaria spp.* Esses resultados (Tabela 2) demonstram a aceitação da ureia
210 extrusada pelos ovinos, pela ausência de alterações no consumo e de sobras
211 nos cochos.

212

213 **Tabela 2 - Consumo de proteína de cordeiros suplementados com ureia**
 214 **extrusada**

Consumo	Tratamentos			P
	Controle	NNP	EPM	
Suplemento (g/animal/dia)	953,7	939,6	142,22	0,8265
Proteína Bruta (g/animal/dia)	210,3	207,2	31,37	0,8265
Farelo de Soja (g/animal/dia)	293,8	160,1	34,31	0,0001
Ureia Extrusada (g/animal/dia)	0,0	27,3	3,08	0,0001

215 EPM= Erro Padrão médio; P > 0,05

216 Segundo Owens et al. (1980), os complexos de liberação lenta de ureia
 217 podem reduzir a toxicidade potencial e melhorar a aceitabilidade dos animais à
 218 utilização de ureia nos suplementos. A ureia extrusada, além de ter uma ação
 219 tamponante no rúmen, de modo a manter o pH numa faixa mais adequada para
 220 a digestão da celulose, também altera o hábito alimentar no sentido de refeições
 221 mais frequentes, resultando em incremento na eficiência energética da dieta.

222 A ausência de efeito sobre o consumo de proteína bruta entre os
 223 tratamentos indica a eficiência na substituição da proteína verdadeira do farelo
 224 de soja por ureia extrusada. O consumo de 293,8 g/dia de farelo de soja pelo
 225 grupo controle contra apenas 160,1 g de farelo de soja e 27,3 g/dia de ureia
 226 extrusada do grupo NNP, destaca que esse resultado viabilizaria uma redução
 227 no custo de produção do suplemento para terminação de cordeiros em
 228 pastagens *Brachiaria spp.*

229

230 **2. Desempenho produtivo**

231 Houve diferença entre os tratamentos para o peso corporal médio, ganho
 232 médio diário, maior que o preconizado (200g/dia), peso de abate e peso de
 233 carcaça quente (Tabela 3).

234 Relatos na literatura de utilização de ureia extrusada para ovinos são
 235 escassos, desta maneira a comparação dos dados obtidos neste estudo ficam
 236 restritas a bovinos e outros ruminantes. Resultados semelhantes com bovinos,
 237 foram relatados por Gonçalves et al. (2003), em que bovinos recebendo dieta
 238 com ureia extrusada tiveram um melhor desempenho produtivo na época de
 239 seca.

240 O uso de ureia extrusada no suplemento para terminação de cordeiros é
 241 uma alternativa que traz vantagens nutricionais, visto que os animais recebem
 242 ambas formas de proteína (verdadeira e NNP), o que contribui para a

243 estabilidade ruminal, favorecendo o crescimento microbiano e, por conseguinte,
 244 refletindo no melhor desempenho dos animais, com ganhos diários superiores e
 245 maiores pesos ao abate e de carcaça. Desta maneira, ovinos alimentados com
 246 NNP atingiram o peso de abate mais precocemente, com aproximadamente 9%
 247 de superioridade no ganho diário, reduzindo riscos de perdas, custos e mão-de-
 248 obra, além de propiciar uma melhor qualidade de carne.

249

250 **Tabela 3 - Desempenho produtivo de cordeiros suplementados com e sem**
 251 **ureia extrusada**

	Tratamentos			
	Controle	NNP	EPM	P
Peso Vivo Médio Inicial (kg)	34,0	35,2	6,31	0,0001
Escore de Condição Corporal Inicial	2,0	2,0	0,30	0,9999
Escore de Condição Corporal Final	2,8	2,8	0,71	0,9999
Ganho Médio Diário (g/dia)	242,1	264,6	96,64	0,0001
Peso ao Abate (kg)	41,9	45,0	6,19	0,0001
Peso de Carcaça Quente (kg)	18,9	20,1	3,17	0,0001
Rendimento de Carcaça Quente (%)	45,0	44,7	0,02	0,7595
Comprimento de Carcaça (cm)	66,9	66,0	3,69	0,6171
Profundidade Torácica (cm)	28,0	29,7	2,54	0,1845
Espessura Gordura Subcutânea (mm)	3,6	3,1	1,07	0,3477
Área de Olho de Lombo (cm ²)	14,1	14,6	2,47	0,6460

252 EPM= Erro Padrão médio; P > 0,05

253

254 Não houve efeito da substituição do farelo de soja por ureia extrusada sobre
 255 a deposição dos tecidos musculares e gordura subcutânea na carcaça. Embora
 256 numericamente diferentes no início do experimento, se igualaram ao término,
 257 demonstrando que os tratamentos nutricionais não exerceram efeitos distintos
 258 sobre a deposição de tecidos na carcaça quando avaliados por ultrassonografia.

259

260 A idade dos animais pode ter auxiliado na uniformização dos parâmetros
 261 analisados, uma vez que área de olho de lombo é diretamente correlacionada
 262 com a taxa de crescimento dos animais (Batista et al., 2017). Portanto, a
 263 suplementação com diferentes fontes proteicas para cordeiros terminados a
 264 pasto não afetou o desenvolvimento muscular e deposição de gordura
 265 subcutânea.

266 Para as medidas realizadas após o abate, foi observado o mesmo
267 comportamento que quando previamente medidos por ultrassonografia, em que
268 EGS e AOL não apresentaram efeitos significativos entre os tratamentos (Tabela
269 3). Este resultado já era esperado, uma vez que a técnica de ultrassonografia
270 apresenta alta correlação (0,70 a 0,80) com as medidas realizadas após o abate,
271 pois ambas propiciam quantificações objetivas destas características (Orman et
272 al., 2010).

273 A avaliação subjetiva de acabamento é uma medida complementar para
274 a estimativa da quantidade de EGS na carcaça, baseados na avaliação visual da
275 distribuição de gordura na carcaça como um todo, o que não acontece com
276 medidas de EGS e AOL, tanto por ultrassonografia como diretamente na
277 carcaça, por exemplo, uma vez que ambas são avaliadas pontualmente entre a
278 12^a e 13^a costelas do animal (Pinheiro et al., 2010). Neste estudo, os animais
279 que receberam ureia extrusada apresentaram carcaças de qualidade superior
280 para acabamento (99% vs. 66%), indicando que para este grupo de animais, as
281 avaliações subjetivas foram mais eficazes para distinção do grau de deposição
282 de gordura nas carcaças.

283 O acabamento de carcaça refere-se à avaliação qualitativa da quantidade
284 e distribuição de gordura na carcaça, e o excesso ou escassez desta é
285 indesejável na produção de carne ovina (Pérez et al., 2000). Além disso protege
286 a carcaça da perda de líquidos, evita o encurtamento das fibras musculares e
287 escurecimento da carne durante o processo de resfriamento (Monteiro et al.,
288 2000).

289 **Qualidade de carne**

290 Nas avaliações subjetivas da qualidade da carne representadas por
291 maturidade, marmoreio, textura da carne e da gordura, os animais
292 suplementados com NNP apresentaram maiores proporções de carcaças com
293 escores desejáveis para as características citadas, com valores de 22% vs. 0%,
294 55% vs. 33%, 44% vs. 33% e 66% vs. 22%, respectivamente.

295 No entanto, nas avaliações objetivas de qualidade da carne não foram
296 observados efeitos da substituição do farelo de soja pela ureia extrusada com
297 valores médios de força de cisalhamento de 7,5 kg, pH 5,75, perdas por

298 cozimento 30,74%, L*, a* e b* da carne de 33,2, 16,2 e 8,3 respectivamente.
299 Estes resultados indicam que as diferenças de qualidade de carne evidenciadas
300 pelas avaliações subjetivas não foram confirmadas pelas avaliações objetivas da
301 qualidade da carne realizadas neste estudo. No entanto, sabe-se que a textura
302 da carne e da gordura não podem ser resumidas a componentes miofibrilares e
303 marmoreio, respectivamente, uma vez que fazem parte da composição dessas
304 características a quantidade e a solubilidade de colágeno, diâmetro de fibras
305 musculares e composição e perfil de ácidos graxos da carne. Dessa maneira,
306 estudos mais aprofundados da qualidade da carne de ovinos alimentados com
307 NNP devem ser realizados para elucidação desses possíveis efeitos.

308 A carne dos animais apresentou coloração vermelho púrpura (L* 33,24,
309 a* 16,20, b* 8,31), que está de acordo a descrição de Osório et al. (2009), em
310 que animais criados a pasto apresentam a coloração da carne mais escura,
311 embora o desejável pelos consumidores seja uma coloração vermelho-róseo. Já
312 a gordura destes animais apresentou coloração amarelo claro (L* 65,83, a* 4,05,
313 b* 10,69), que colabora para uma melhor aceitação por parte dos consumidores.

314

315 **3. Sangue**

316 Não houve efeito da substituição de 50% da proteína verdadeira por NNP
317 sobre as concentrações AST (98,3 UI/L), GGT (57,1 UI/L) (albumina (3,7 mg/dL),
318 creatinina (1,0 mg/dL), proteína total (7,1 mg/dL) e ureia (30,1 mg/dL) no soro
319 sanguíneo dos ovinos durante o período de terminação em pastagem (Figura 2).
320 Estes resultados estão em concordância com os valores referência (Kaneko et
321 al., 2008) para estes parâmetros sanguíneos de ovinos.

322 Avaliando a substituição do farelo de soja por ureia extrusada para
323 bovinos de corte, Oliveira Junior et al. (2004), também não encontrou diferenças
324 nos parâmetros sanguíneos dos animais em experimento.

325 As concentrações de ureia plasmática dos cordeiros que receberam
326 suplemento contendo farelo de soja foram similares às dos cordeiros que
327 receberam suplemento com ureia extrusada. Tal similaridade se justifica pelo
328 fato da solubilização ruminal do nitrogênio proveniente da ureia extrusada
329 ocorrer de forma gradativa, permitindo seu uso pelos microrganismos ruminais,
330 o que impediria o acúmulo de ureia plasmática. Moraes et al. (2019), em um

331 estudo com bovinos suplementados com ureia extrusada, também não
 332 encontraram efeito nos valores de proteínas totais, albumina, creatinina, ureia e
 333 AST.

334

335

336 Figura 1 - Perfil bioquímico do sangue de cordeiros suplementados com e sem
 337 ureia extrusada

338

339

340 Conclusões

341

342 A substituição de 50% da proteína verdadeira do farelo de soja por ureia
 343 extrusada em suplemento para terminação de ovinos melhora o desempenho,
 344 não afeta a qualidade da carne e não prejudica a saúde de cordeiros terminados
 345 em pastagem de *Brachiaria spp.*

346

347 **Agradecimentos:** O presente trabalho foi realizado com apoio da Universidade
348 Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS/MEC, do Conselho Nacional de
349 Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de
350 Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de
351 Financiamento 001, UFMS e Amireia Pajoara.

352

353 **Referências bibliográficas**

354

355 AMSA. (2001) Meat Evaluation Handbook. Am. Meat Sci. Assoc. Savoy, IL.

356 American Meat Science Association – AMSA. (2016) Research guidelines for
357 cookery, sensory evaluation, and instrumental tenderness measurements of
358 meat. Champaign, 2, 1.

359 Bartley, E.E.; Deyoe, C.W. (1975) Starea as a protein replace for ruminants.
360 Feedstuffs, Minneapolis, 47, 30, 42-44.

361 Batista, L.A. et al. (2017) Desempenho e características de carcaça de dois
362 biótipos de ovinos da raça Santa Inês terminados a pasto suplementados com
363 blocos multinutricionais. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, 18, 2,
364 313-326. <http://dx.doi.org/10.1590/s1519-99402017000200010>.

365 Bonagurio, S. et al. (2003) Qualidade da carne de cordeiros Santa Inês puros e
366 mestiços com Texel abatidos com diferentes pesos. Revista Brasileira de
367 Zootecnia, 32,6, 1981-1991. <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982003000800023>.

369 Capelle, E. R. et al. (2001) Estimativas do consumo e do ganho de peso de
370 bovinos, em condições brasileiras. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, 30,
371 6, 1857-1865. <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982001000700023>.

372 Cartaxo, F.Q. et al. (2017) Desempenho e características de carcaça de
373 cordeiros Santa Inês e suas cruzas com Dorper terminados em confinamento.
374 Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, 18, 2, 388-401.
375 <http://dx.doi.org/10.1590/s1519-99402017000200017>.

376 Cezar, M.F.; Sousa, W.H. (2007) Carcaças Ovinas e Caprinas: obtenção,
377 avaliação e classificação. Uberaba, MG: Agropecuária Tropical, 147 p.

378 Fernandes, M. A. M. et al. (2009) Composição tecidual e perfil de ácidos graxos
379 do lombo de cordeiros terminados em pasto com níveis de suplementação
380 concentrada. Ciência Rural, 39, 2485-2490. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782009005000200>.

382 Ferreira, M. A. et al. (1999) Consumo, Conversão alimentar, ganho de peso e
383 características de carcaça de bovinos F1 Simental e Nelore. Revista Brasileira
384 de Zootecnia, 28, 2, 352-360. <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35981999000200018>.

385

- 386 Firkins, J. L. (1996) Maximizing microbial protein synthesis in the rumen. Journal
387 of Nutrition. Bethesda, 126, 45, 1347-1354.
388 http://dx.doi.org/10.1093/jn/126.suppl_4.1347S.
- 389 Goes, R.H.T.B. et al. (2003) Avaliação da pastagem de capim TannerGrass
390 (*Brachiaria arrecta*), por três diferentes métodos de amostragem. Revista
391 Brasileira de Zootecnia, 32, 64-69. <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982003000100008>
- 393 Gonçalves, C. C. M.; et al. (2003) Desempenho de bovinos de corte no pasto
394 suplementados com misturas múltiplas contendo ureia e amireia. Ciência
395 Agrotécnica, Lavras, 28, 1, 174-181. <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-70542004000100023>
- 397 Monteiro, E. M. (2000) Influência da gordura em parâmetros sensoriais da carne.
398 In: Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária. Qualidade da carne e dos
399 produtos cárneos. [S.l.], p. 7-14.
- 400 Moraes, G. J. et al. (2019) Extruded urea could reduce true protein source in beef
401 cattle diets. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 103, 1283-1294.
402 <https://doi.org/10.1111/jpn.13140>
- 403 Müller, L. (1987) Normas para avaliação de carcaças e concurso de carcaça de
404 novilhos, Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2 ed., 31 p.
- 405 National Research Council - NRC. (2007) Nutrient requirements of small
406 ruminants. Washington, D.C.: National Academic Press, 384 p.
- 407 Oliveira Júnior, R.C.; Pires, A.V.; Susin, I. (2004) Digestibilidade de nutrientes
408 em dietas de bovinos contendo ureia ou amireia em substituição ao farelo de
409 soja. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 39, 173-178.
410 <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2004000200011>
- 411 Orman, A., Caliskan, G. U., Dikmen, S. (2010) The assessment of carcass traits
412 of Awassi lambs by real-time ultrasound at different body weights and sexes.
413 Journal of Animal Science, 88, 10, 3428-3438. <https://doi.org/10.2527/jas.2009-2431>
- 415 Owens, F.N., et al. (1980) Slow ammonia release from urea: rumen and
416 metabolism studies. Journal of Animal Science, 50, 3, 527-31.
417 <http://dx.doi.org/10.2527/jas1980.503527x>
- 418 Osorio, J. S.; Osorio, M. T. M.; Sanudo, C. (2009) Características sensoriais da
419 carne ovina. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, 38, 292-300.
420 <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982009001300029>.
- 421 Pérez, J. R. O.; Oliveira, M. V. M.; Martins, A. R. V. (2000) Peso dos órgãos
422 internos de cordeiros das raças Bergamácia e Santa Inês alimentados com
423 dejetos de suínos. In: Anais Reunião Anual Da Sociedade Brasileira De
424 Zootecnia, Viçosa: UFV, 37, 470-472.
- 425 Pinheiro, R. S. B.; Jorge, A. M.; Yokoo, M. J. (2010) Correlações entre medidas
426 determinadas in vivo por ultrassom e na carcaça de ovelhas de descarte. Revista
427 Brasileira de Zootecnia, Viçosa, 39, 5, 1161-1167.
428 <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982010000500030>.

- 429 Russel, A. J. F.; Doney, J. M.; Gunn, R. G. (1969) Subjective assessment of body
430 fat in live sheep. *Journal Agricultural Science*, 72, 451-454.
- 431 Russel, J. A.; Sniffen, C. J.; Van Soest, P. J. (1984) Effect of carbon-4 and
432 carbon-5 volatile fatty acids on growth of mixed rumen bacteria in vitro. *Journal*
433 *of Dairy Science*, Champaign, 67, 5, 987-994.
434 [http://dx.doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(84\)81397-1](http://dx.doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(84)81397-1)
- 435 Russell, J. B. et al. (1992) A net carbohydrate and protein system for evaluation
436 cattle diets: ruminal fermentation. *Journal of Animal Science*, 70, 12, 3551-3581.
437 <http://dx.doi.org/10.2527/1992.70113551x>
- 438 Sena, L. S. et al. (2016) Associação entre características de carcaça e tamanho
439 corporal em ovinos Santa Inês. *Revista Brasileira Científica de Produção Animal*,
440 18, 84-92. <http://dx.doi.org/10.5935/2176-4158/rcpa.v18n2p84-92>.
- 441 Silveira, V.C.P. et al. (2005) Qualidade da pastagem nativa obtida por diferentes
442 métodos de amostragem e em diferentes solos na Apa do Ibirapuitã, Brasil.
443 *Ciência Rural*, 35, 582-588. [http://dx.doi.org/10.1590/S0103-](http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782005000300014)
444 [84782005000300014](http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782005000300014).
- 445 Teixeira, J.C. et al. (1988) Use of amirea in rabbits as nitrogen source in partial
446 substitution for soybean meal. *Journal of Animal Science*, Champaign, 66, 337-
447 338.
- 448 Zapata, J.F.F. et al. (2000) Estudo da qualidade da carne ovina no Nordeste
449 brasileiro: propriedades físicas e sensoriais. *Ciência e Tecnologia dos Alimentos*,
450 20, 2, 274-277. <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-20612000000200025>.
- 451

452 **EFICIÊNCIA DA VACINA ANTI-GnRH PARA CASTRAÇÃO DE CORDEIROS**
453 **DESTINADOS À TERMINAÇÃO EM PASTAGEM**
454

455 Mariana de Nadai Bonin - Discente de Mestrado do Programa de Pós-
456 Graduação em Ciência Animal – UFMS, marianabonin@hotmail.com

457 Marina de Nadai Bonin Gomes - Docente do Programa de Pós-Graduação em
458 Ciência Animal – UFMS, marinabonin@hotmail.com

459 Breno Fernandes Barreto Sampaio - Docente do Programa de Pós-Graduação
460 em Ciência Animal – UFMS, breno.sampaio@ufms.br

461 Kedma Leonora Silva Monteiro Ferelli - Discente de Doutorado do Programa de
462 Pós-Graduação em Ciência Animal – UFMS, ked_monteiro@hotmail.com

463 Lucy Mery Surita - Discente de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em
464 Ciência Animal – UFMS, lucymerysurita@hotmail.com

465 Luís Carlos Vinhas Ítavo - Docente do Programa de Pós-Graduação em
466 Ciência Animal – UFMS, luis.itavo@ufms.br

467 Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo – Docente do Programa de Pós-
468 Graduação em Ciência Animal – UFMS, camila.itavo@ufms.br

469

470 **Autor correspondente:** Mariana de Nadai Bonin - marianabonin@hotmail.com
471 – FAMEZ/UFMS - Av. Sen. Filinto Müller, 2443 - Pioneiros, Campo Grande - MS,
472 79070-900, Brasil.

473 **Resumo:** O objetivo foi avaliar a eficiência da vacina anti-GnRH quanto às
474 características de desempenho produtivo e seminais, tamanho e histologia dos
475 testículos de cordeiros submetidos à imunocastração. Foram avaliados 20
476 cordeiros contemporâneos cruzados SRD x Texel, dos quais 10 animais
477 receberam duas doses de 1 mL de vacina anti-GnRH e 10 receberam duas doses
478 de 1 mL de soro fisiológico, com intervalo de 30 dias entre doses. As variáveis
479 analisadas foram concentração espermática, motilidade, vigor, turbilhonamento
480 e volume de ejaculado para o sêmen, peso e corte histológico para os testículos,
481 peso ao abate, ganho de peso total, ganho médio diário, consumo médio de
482 suplemento e conversão alimentar para o desempenho produtivo e GGT, AST,
483 albumina, creatinina, proteínas totais e ureia para o sangue. A cada 30 dias foi
484 realizado o acompanhamento andrológico para verificação do efeito da vacina
485 sobre características seminais e testiculares dos animais. Durante os 90 dias de
486 duração do experimento, os animais foram mantidos a pasto de *Brachiaria spp.*,
487 com suplementação diária, sendo abatidos ao final deste período. Houve
488 diferença entre animais imunocastrados e inteiros respectivamente, para o peso
489 ao abate (44,3 vs. 48,3 kg), ganho de peso total (9,9 vs 10,3 kg), ganho médio
490 diário (104,5 vs. 108,9 g/dia) e conversão alimentar (5,83 vs. 5,97). Houve efeito
491 significativo para motilidade (4,5 vs. 61,0%), vigor (0,40 vs. 3,00), volume (0,09
492 vs. 0,74 mL) e turbilhonamento (0,20 vs. 2,70) na terceira colheita de sêmen, que
493 foi 30 dias após a segunda dose da vacina. Houve efeito significativo para peso
494 dos testículos (0,09 vs. 0,35 g). No perfil bioquímico do sangue dos animais não
495 houve alterações significativas durante o experimento em ambos os tratamentos.
496 Portanto, a imunocastração através de duas doses de 1 mL de vacina anti-GnRH
497 com 30 dias de intervalo entre as doses, causa infertilidade em ovinos e pode
498 ser adotada sem prejudicar o desempenho e a saúde de cordeiros terminados a
499 pasto.

500

501 **Palavras-chave:** avaliação andrológica, características seminais,
502 imunocastração, ovinos.

503

504 **Abstract:** The objective was to evaluate the efficiency of the anti-GnRH vaccine
505 regarding the characteristics of productive and seminal performance, size and
506 histology of the testicles of lambs submitted to immunocastration. Twenty
507 contemporary lambs SRD x Texel were evaluated, of which 10 animals received
508 two doses of 1 mL of anti-GnRH vaccine and 10 received two doses of 1 mL of
509 saline, with an interval of 30 days between doses. The analyzed variables were
510 sperm concentration, motility, vigor, swirling and volume of ejaculate for semen,
511 weight and histological cut for the testicles, slaughter weight, total weight gain,
512 average daily gain, average supplement consumption and feed conversion for
513 the productive performance and GGT, AST, albumin, creatinine, total proteins
514 and urea for blood. Andrological monitoring was carried out every 30 days to
515 check the effect of the vaccine on seminal and testicular characteristics of the
516 animals. During the 90 days of the experiment, the animals were kept on pasture
517 of *Brachiaria* spp., With daily supplementation, being slaughtered at the end of
518 this period. There was a difference between immunocastrated and whole
519 animals, respectively, for slaughter weight (44.3 vs. 48.3 kg), total weight gain
520 (9.9 vs. 10.3 kg), average daily gain (104.5 vs. 108.9 g / day) and feed conversion
521 (5.83 vs. 5.97). There was a significant effect on motility (4.5 vs. 61.0%), vigor
522 (0.40 vs. 3.00), volume (0.09 vs. 0.74 mL) and swirling (0.20 vs. 2 , 70) in the
523 third semen collection, which was 30 days after the second vaccine dose. There
524 was a significant effect on testicle weight (0.09 vs. 0.35 g). In the biochemical
525 profile of the animals' blood, there were no significant changes during the
526 experiment in both treatments. Therefore, immunocastration through two doses
527 of 1 mL of anti-GnRH vaccine with a 30-day interval between doses, causes
528 infertility in sheep and can be adopted without impairing the performance and
529 health of lambs finished on pasture.

530

531 **Keywords:** andrological evaluation, seminal characteristics, immunocastration,
532 sheep.

533 **Introdução**

534 A castração cirúrgica é realizada com o objetivo de reduzir o efeito
535 anabólico da testosterona e aumentar a deposição de gordura na carcaça, além
536 de diminuir o comportamento de macho promovido por este hormônio, reduzindo
537 a atividade física e gasto de energia em brigas por dominância e sodomia
538 (Machado et al., 2018). Porém, a técnica de castração cirúrgica é um método
539 cruento de esterilização, que não valoriza os preceitos de bem-estar animal,
540 além de poder causar diversas complicações pós-operatórias, como inflamações
541 e miíases na ferida, sendo até mesmo causa de morte, acarretando gastos com
542 medicamentos e prejuízos econômicos (Price et al., 2003; Bolado-Sarabia et al.,
543 2018).

544 A alteração no comportamento dos machos castrados também ocasiona
545 uma maior docilidade para manejo e a redução das disputas entre os animais,
546 levando a um menor número de lesões de carcaça e, conseqüentemente,
547 problemas na qualidade da carne (Amatayakul-Chantler et al., 2013).

548 Além de danos à carcaça, o *off flavour* ou sabor desagradável da carne
549 ovina, que apesar de ainda não estar completamente compreendido, leva a
550 formação de compostos voláteis responsáveis por alterações no sabor e aroma
551 da carne, e em alguns casos, são associados com mudanças hormonais como
552 a elevação da testosterona em animais púberes (Costa et al., 2009; Lents et al.
553 2018). Portanto, a produção de animais castrados e abatidos precocemente
554 pode ser uma ferramenta para eliminar parte dos fatores que influenciam
555 negativamente a qualidade da carne, promovendo uma maior aceitação do
556 produto pelos consumidores

557 Como forma de superar grande parte das desvantagens causadas pela
558 castração cirúrgica, criou-se a imunocastração, uma forma de esterilização
559 imunológica através de uma vacina anti-GnRH. A vacina funciona como um
560 supressor do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), que tem papel na
561 regulação central na função sexual, resultando na supressão da secreção das
562 gonadotrofinas LH e FSH na hipófise anterior, e conseqüente redução na
563 produção de testosterona nas gônadas masculinas (Zanella et al., 2009).

564 A castração através de vacina anti-GnRH já foi validada em estudos com
565 diversas espécies animais como bovinos, suínos, equinos e animais selvagens
566 (Janett et al., 2012).

567 O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da vacina anti-GnRH em
568 ovinos quanto ao desempenho produtivo, características seminais e
569 características histológicas dos testículos de cordeiros submetidos à
570 imunocastração.

571 **Material e Métodos**

572 Este experimento foi aprovado pela comissão de ética CEUA/UFMS -
573 Protocolo nº 862/2017.

574 Animais e Local

575 O experimento foi realizado na Fazenda Escola da Universidade Federal
576 de Mato Grosso do Sul, localizada em Terenos, Mato Grosso do Sul e teve
577 duração total de 90 dias. Foram utilizados 20 cordeiros Texel, contemporâneos,
578 com cinco meses de idade, com peso inicial médio de 34,6 ($\pm$ 6,17) kg. O
579 delineamento experimental foi inteiramente casualizado, e os tratamentos
580 consistiam em animais vacinados e animais controle.

581 Dieta

582 Os animais foram distribuídos nos tratamentos utilizando-se o peso
583 corporal como critério. Foram alocados em módulos formados por *Brachiaria*
584 spp., com lotação fixa, nos quais permaneceram em pastejo rotacionado por 15
585 dias em cada piquete. Todos os piquetes eram providos de comedouros para
586 suplementação e bebedouros com água à vontade. O suplemento foi
587 formulado para consumo de 2% em relação ao peso corporal e ganhos
588 esperados de 200 g/dia, conforme as exigências do NRC (2007). Os animais
589 imunocastrados e controle foram subdivididos em mais dois grupos, onde 10
590 animais imunocastrados recebiam suplemento com ureia extrusada e 10 animais
591 controle recebiam suplemento sem ureia extrusada.

592 Os animais foram pesados no início do experimento e após 15 dias de
593 adaptação à dieta. Após este período, foram realizadas pesagens a cada 21 dias
594 para a determinação do ganho de peso e ajuste do fornecimento de suplemento.

595 Imunocastração

596 O manejo para imunocastração dos animais consistiu na aplicação de 1
597 mL da vacina anti-GnRH (BoPriva®) por via subcutânea na região axilar dos
598 animais tratados, aos 30 e 60 dias de experimento. Nas mesmas datas, os
599 animais controle receberam 1 mL de solução fisiológica por via subcutânea em
600 região axilar, para que passassem pelo estresse da aplicação da vacina.

601 A colheita de sêmen de todos os animais foi feita por eletroejaculação, no
602 dia da primeira e da segunda doses da vacina e 30 dias após (90 dias de
603 experimento). As características avaliadas foram: concentração espermática (x
604 10^9 mL, volume seminal (mL), turbilhonamento, motilidade (%) e vigor dos
605 espermatozoides. Os procedimentos de colheita, avaliação física e morfológica
606 do sêmen foram realizados segundo o CBRA (2013).

607 Sangue

608 O manejo para colheita sanguínea ocorreu a cada 30 dias, antes do
609 fornecimento do concentrado no período da manhã, através de venopunção
610 jugular, sendo as amostras centrifugadas para obtenção de soro visando
611 avaliação dos níveis séricos de aspartato aminotransferase (AST), gama glutamil
612 transferase (GGT) , albumina, creatina, proteínas totais e ureia pelo aparelho
613 Cobas C 111, da marca Roche, com kits comerciais específicos para o aparelho.

614 Abate

615 O abate dos animais ocorreu ao final de 90 dias de experimento em
616 frigorífico comercial. Previamente ao abate, os animais permaneceram por 18
617 horas em dieta hídrica.

618 Histologia

619 Durante o abate, colheu-se os testículos pesando-os individualmente e
620 fixando uma amostra de cada animal em formol 10% para posterior análise
621 histopatológica. Para tal, procedeu-se ao processamento com desidratação e
622 inclusão em parafina e coloração pela técnica hematoxilina-eosina (HE), para
623 evidenciar os componentes teciduais, examinando em microscópio de luz. Os
624 materiais foram processados rotineiramente para exame histopatológico
625 realizando-se desidratação com concentrações crescentes de álcool etílico,

626 seguida de diafanização com xilol e impregnação em parafina. Em seguida, os
627 tecidos foram incluídos em parafina e posteriormente cortados em micrótomo na
628 espessura de 4 micrometros para confecção das lâminas que foram coradas pela
629 técnica de hematoxilina e eosina, conforme a rotina do Laboratório de Anatomia
630 Patológica da UFMS, analisadas e documentadas fotograficamente.

631 Análise estatística

632 A análise dos dados foi realizada por meio de análises de variância e as
633 médias comparadas por meio do teste F, com nível de significância de 0,05 e
634 modelo estatístico representado por:

$$635 Y_{ij} = \mu + t_i + e_{ij}$$

636 em que μ = média geral; t_i = efeito de tratamento; $i = 1,2$; e_{ij} = erro aleatório
637 associado a observação Y_{ij}

638

639 Resultados e discussão

640

641 1. Características seminais

642 Na primeira colheita de sêmen, que ocorreu concomitantemente à
643 aplicação da primeira dose da vacina, não foram alcançados valores satisfatórios
644 conforme os valores estabelecidos pelo CBRA (1998) para utilização de
645 reprodutores ovinos nas características andrológicas avaliadas devido a
646 condição sexual dos animais, que aos cinco meses de idade ainda não estavam
647 púberes (Tabela 1). Segundo Souza et al. (2019), a ejaculação de
648 espermatozoides viáveis, indicativa de início da puberdade, ocorre entre quatro
649 a seis meses de idade em ovinos, quando o peso corporal dos cordeiros
650 corresponde a 40-60% do animal adulto.

651 Aos 30 dias de experimento, na aplicação da segunda dose da vacina e
652 da segunda colheita de sêmen, houve maior concentração espermática, volume
653 de ejaculado e motilidade dos espermatozoides (Tabela 1), isto porque, naquele
654 momento, os animais estavam com seis meses de idade e, portanto,
655 encontravam-se próximos à puberdade. Neste momento, mesmo decorridos 30
656 dias da aplicação da primeira dose da vacina anti-GnRH não foi possível verificar
657 alterações nas características seminais (Tabela 1), o que era esperado, uma vez

658 que os animais seriam considerados efetivamente castrados após 30 dias da
659 aplicação da segunda dose da vacina.

660 Na terceira colheita de sêmen, aos 90 dias, os animais controle
661 apresentaram sêmen de boa qualidade, visto que, naquele momento, estavam
662 com sete meses de idade e encontravam-se mais próximos a maturidade sexual.
663 Já para os animais imunocastrados, apesar de ainda existir produção
664 espermiática, o sêmen era inviável à reprodução devido à baixa motilidade, vigor,
665 turbilhonamento e volume (Tabela 1), corroborando os resultados do estudo de
666 Lents et al. (2018) com caprinos imunocastrados, que tiveram azoospermia e
667 valores de turbilhonamento, vigor, motilidade e concentração abaixo dos
668 preconizados pelo CRBA, 60 dias após a aplicação da segunda dose da vacina
669 anti-GnRH.

670 Sendo assim, aos 30 dias pós-aplicação da segunda dose da vacina, os
671 animais provaram resposta positiva ao tratamento, estando inaptos à
672 reprodução, ou seja, castrados. Resultados semelhantes foram relatados nos
673 estudos de Janett et al. (2012) com bovinos e Lugar et al. (2017) com caprinos,
674 em que os animais vacinados apresentaram uma espermatogênese incompleta
675 ou nenhuma produção de espermatozoides após a aplicação da segunda dose
676 da vacina.

677 Em um experimento com suínos imunocastrados, Andreo et al. (2018)
678 afirmam que há variação individual nos títulos de anticorpos gerados pela vacina
679 entre os animais devido a fatores como genética, estado nutricional, idade e
680 estresse no momento da aplicação, o que explica o fato de no presente estudo
681 os animais apresentarem respostas diferentes ao tratamento.

682 O peso dos testículos dos animais tratados foi significativamente menor
683 que o peso dos animais controle. Sendo que a média de peso total foi de 90 g
684 para os animais imunocastrados e 350 g para os animais controle. O testículo
685 direito teve média de 50 g nos animais imunocastrados e 170 g nos animais
686 controle, já o testículo esquerdo teve média de 50 g para imunocastrados e 180
687 g para animais inteiros. Os pesos dos testículos dos animais imunocastrados
688 comparado aos animais controle tiveram uma redução de 25,71%, corroborando
689 os estudos de Gogic et al. (2019) com suínos, que encontrou uma redução de

690 28,9 a 54,4% dos volumes e pesos dos testículos de animais imunocastrados
 691 em relação aos animais controle. Segundo Lents et al. (2018) estas reduções
 692 dos volumes testiculares podem ser atribuídas a redução dos diâmetros dos
 693 túbulos seminíferos e da reduzida capacidade mitótica das espermatogônias
 694 após a aplicação da vacina anti-GnRH.

695

696 Tabela 1. Características seminais de cordeiros inteiros e imunocastrados

	Tratamento		EPM	P
	Imunocastrados	Controle		
Concentração espermática (x10 ⁹ /mL)				
1 ^a colheita	13,95	23,05	6,10	0,0037
2 ^a colheita	24,10	25,40	6,90	0,6788
3 ^a colheita	17,65	26,25	7,78	0,0238
Motilidade (%)				
1 ^a colheita	12,50	18,50	21,38	0,5439
2 ^a colheita	44,00	51,00	33,77	0,6486
3 ^a colheita	4,50	61,00	17,50	0,0001
Vigor				
1 ^a colheita	0,90	1,50	1,14	0,2546
2 ^a colheita	2,30	2,60	1,67	0,6935
3 ^a colheita	0,40	3,00	0,95	0,0001
Volume (mL)				
1 ^a colheita	0,27	0,56	0,47	0,1850
2 ^a colheita	0,58	0,90	0,48	0,1566
3 ^a colheita	0,09	0,74	0,40	0,0023
Turbilhonamento				
1 ^a colheita	0,0	0,0	-	-
2 ^a colheita	0,0	0,0	-	-
3 ^a colheita	0,20	2,70	0,93	0,0001

697 EPM= Erro Padrão médio; P > 0,05

698

699

700 2. Características histológicas dos testículos de animais inteiros e 701 imunocastrados

702 Ao comparar-se o aspecto do testículo de um animal inteiro, que
 703 apresentou espermatogênese completa (espermatogônias, espermatócitos I,
 704 espermatócitos II, espermatídes e espermatozoides) no lúmen dos túbulos
 705 seminíferos, ao aspecto do testículo de um animal que recebeu as doses da
 706 vacina anti-GnRH (Figura 1), nota-se que os animais que foram imunocastrados
 707 desenvolveram uma fibrose no interior dos túbulos seminíferos e perderam

708 grande parte da espermatogênese, causando uma ausência parcial ou total na
709 produção de espermatozoides (Tabela 1).

710 Este resultado vai de encontro ao de Zanella et al. (2009) que ao realizar
711 estudo sobre imunocastração com a espécie bovina, também encontrou
712 degeneração testicular, descamação do epitélio seminífero e ausência da
713 produção de espermatozoides. Needham et al. (2019) e Xingfa Han et al. (2015),
714 ambos em experimentos com ovinos, afirmam que os animais imunocastrados
715 tiveram uma redução nos diâmetros dos túbulos seminíferos e uma redução do
716 número de células germinativas e de cada estágio de desenvolvimento.

717 No estudo de Earl et al. (2006) com ovinos da raça Suffolk, observaram
718 que os animais imunocastrados apresentaram espessamento da parede do
719 túbulo seminífero, aumento da membrana basal, vasos pequenos, células
720 intersticiais mal definidas e tecido conjuntivo espessado, enquanto os animais
721 controle apresentavam gerações sucessivas de células espermáticas a partir da

722 lâmina basal até o lúmen tubular, indo de encontro aos resultados encontrados
723 no presente estudo.

724

A

725

B

726

727 Figura 1 – Características histológicas dos testículos dos animais controle (A) e
728 imunocastrado (B).

729

730 3. Desempenho produtivo

731 Os animais controle tiveram um maior peso ao abate, maior ganho de
732 peso total e diário, porém uma pior conversão alimentar que os animais
733 imunocastrados (Tabela 2), demonstrando que desempenho dos ovinos
734 imunocastrados foi inferior ao dos animais inteiros. Para o objetivo deste trabalho
735 é um resultado positivo, pois significa que a vacina teve o mesmo efeito de uma
736 castração convencional, na qual animais castrados geralmente têm menor
737 desempenho que inteiros devido, principalmente, a menor deposição muscular

738 e maior deposição de gordura propiciadas pela menor ação anabólica muscular
739 e lipolítica da testosterona (Luchiari Filho, 2000). Andreo et al. (2013), utilizando
740 bovinos imunocastrados e não castrados em confinamento, observaram
741 diferença significativa entre os tratamentos para peso final e ganho de peso
742 diário.

743 Contrariamente, Cook et al. (2000) trabalhando com bovinos
744 imunocastrados e não castrados, não observaram diferença no ganho médio
745 diário dos animais durante a fase de recria. Entretanto, na fase de terminação, o
746 ganho de peso médio diário foi maior para os animais não castrados, em relação
747 aos imunocastrados. Essa diferença pode estar relacionada ao fato de que,
748 durante a recria, os animais encontravam-se em fase pré-púbere ou ainda não
749 haviam atingido a maturidade reprodutiva, não havendo, portanto, significativa
750 interferência da testosterona na deposição de tecido muscular e adiposo na
751 carcaça. Já na fase de terminação, momento em que os animais estavam em
752 idade cronológica mais avançada e, conseqüentemente, mais maduros
753 sexualmente, o efeito da testosterona pode ter se pronunciado, refletindo na
754 maior deposição de músculos na carcaça de animais inteiros frente aos
755 castrados, o que resultou em maiores ganhos médios diários. Animais inteiros
756 possuem, na composição do ganho, maior deposição muscular que animais
757 castrados, estes últimos voltando parte da energia ingerida para a deposição de
758 tecido adiposo, devido à ausência da testosterona. A deposição de tecido
759 muscular na carcaça é mais eficiente energeticamente que a deposição de tecido
760 adiposo, justificando o porquê de animais castrados apresentarem menor ganho
761 de peso comparado aos animais inteiros, sob mesma idade e condições de
762 criação e manejo (Gómez et al., 2017).

763 Restle et al. (2000) observaram em bovinos confinados, que os animais
764 inteiros consumiram 6,6% menos alimento que os castrados para ganhar 1 kg
765 no peso vivo, demonstrando a importância da testosterona produzida pelos
766 testículos não só no ganho de peso, mas também na eficiência alimentar.

767 Os animais não-castrados têm um maior peso ao abate, maior ganho de
768 peso total e maior ganho de peso médio diário devido à maior concentração

769 sanguínea de testosterona, esteroide que proporciona um efeito anabólico,
770 promovendo a hipertrofia muscular dos animais (Machado et al., 2018).

771 Corroborando os estudos de Janett et al. (2012) com bovinos, no presente
772 estudo os animais tratados tiveram uma carcaça semelhante aos animais
773 controle, porém, animais controle tiveram uma melhor conversão alimentar.

774

775 Tabela 2 - Desempenho de cordeiros terminados em pastagem em função da
776 imunocastração

	Tratamento		EPM	P
	Imunocastrados	Controle		
Peso ao Abate (kg)	44,3	48,3	0,745	0,0001
Ganho de Peso Total (kg)	9,9	10,3	0,742	0,1200
Ganho Médio Diário (g/dia)	104,5	108,9	0,781	0,1200
Consumo médio suplemento (g/dia)	608,8	642,7	12,644	0,0001
Conversão Alimentar	5,83	5,97	0,536	0,4325

777 EPM= Erro Padrão médio; P > 0,05

778

779 4. Sangue

780

781 Houve diferença para os valores de GGT entre os tratamentos com
782 animais imunocastrados entre 55,9 UI/L e 58,9 UI/L, e para os animais controle,
783 entre 55,8UI/L e 57,8 UI/L, valor pouco superior aos valores referência fornecidos
784 por Kaneko et al. (2008) para ovinos (20 – 52 UI/L), não sendo significativo em
785 vista da evolução de ambos os tratamentos.

786 Houve decréscimo no valor do AST dos animais do início ao final do
787 experimento, reduzindo de 101,1 UI/L para 87,9 UI/L nos animais
788 imunocastrados. O mesmo comportamento foi observado nos animais inteiros,
789 diminuindo de 104,2 UI/L para 92,9 UI/L. Nas colheitas realizadas aos 30 e aos
790 60 dias, os valores corroboraram com os valores referência de 98-278 UI/L,
791 descrito por Kaneko et al. (2008). No entanto, na colheita realizada aos 90 dias
792 os valores encontrados foram abaixo dos valores referência. Esta redução pode
793 ser explicada por Franciscato et al. (2006), que afirmaram que em todas as
794 espécies domésticas a atividade da AST é alta no fígado, portanto, nem sempre
795 indica uma lesão hepática aguda ou crônica.

796 Visto que em ambos os tratamentos não houve diferença significativa
 797 entre os valores, pode-se afirmar então que não houve prejuízos na atividade
 798 hepática e na fisiologia em geral dos animais controle em relação aos animais
 799 inteiros.

800

801 Tabela 3 - Perfil bioquímico de animais imunocastrados e controle (médias do
 802 grupo)

	Tratamentos		EPM	P
	Imunocastrados	Controle		
GGT 30 dias	55,9	55,8	9,557	0,9628
GGT 60 dias	58,9	57,8	10,956	0,6285
GGT 90 dias	58,9	56,5	11,526	0,3527
AST 30 dias	101,1	104,2	20,944	0,5059
AST 60 dias	101	102,6	14,057	0,6011
AST 90 dias	87,9	92,9	13,099	0,0937
Albumina 30 dias	33,8	34,7	4,481	0,3719
Albumina 60 dias	36,1	38,0	3,350	0,0132
Albumina 90 dias	39,3	41,5	3,3453	0,0056
Creatinina 30 dias	0,93	0,89	0,145	0,2210
Creatinina 60 dias	0,96	0,92	0,119	0,1395
Creatinina 90 dias	1,02	0,98	0,099	0,0753
Proteínas Totais 30 dias	63,99	64,61	4,453	0,5354
Proteínas Totais 60 dias	70,07	75,41	3,061	0,0001
Proteínas Totais 90 dias	74,23	75,31	4,555	0,2923
Ureia 30 dias	17,79	16,65	4,840	0,2955
Ureia 60 dias	28,73	33,49	6,440	0,0014
Ureia 90 dias	38,4	45,49	12,537	0,0135

803 EPM= Erro Padrão médio; P > 0,05

804

805 **Conclusão**

806

807 Animais submetidos a imunocastração com vacina anti-GnRH tiveram
 808 menor desempenho produtivo que animais inteiros e apresentaram
 809 características seminais e histológicas compatíveis a animais inférteis.

810

811 **Agradecimentos:** O presente trabalho foi realizado com apoio da Universidade
 812 Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS/MEC, do Conselho Nacional de
 813 Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de

814 Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de
815 Financiamento 001, UFMS.

816

817 **Referências bibliográficas**

818

819 Amatayakul-Chantler, S. et al. (2013) Effects on performance and carcass and
820 meat quality attributes following immunocastration with the gonadotropin
821 releasing factor vaccine Bopriva or surgical castration of Bos indicus bulls raised
822 on pasture in Brazil. Meat Science, 95, 78–84.
823 <http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2013.04.008>

824 Andreo, N., et al. (2018) Immunocastration and its effects on carcass and meat
825 traits of male pigs. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, 39, 2531-2540.
826 <http://dx.doi.org/10.5433/1679-0359.2018v39n6p2531>

827 Andreo, N. et al. (2013) Influência da imunocastração (Bopriva®) no ganho de
828 peso, características de carcaça e qualidade da carne de bovinos Nelore.
829 Semina: Ciências Agrárias, 34, 2, 4121-4131. <http://dx.doi.org/10.5433/1679-0359.2013v34n6Supl2p4121>

831 Colégio Brasileiro de Reprodução Animal – CBRA. (2013) Manual para exame
832 andrológico e avaliação de sêmen animal. 2.ed. Belo Horizonte: CBRA, 54p.

833 Cook, R. B. et al. (2000) The effects of active immunization against GnRH on
834 testicular development, feedlot performance, and carcass characteristics of beef
835 bulls. Journal of Animal Science, 78, 2778-2783.
836 <http://dx.doi.org/10.2527/2000.78112778x>

837 Costa, R. G. et al. (2009) Características Sensoriais da Carne Ovina: Sabor e
838 Aroma. Revista Científica de Produção Animal, 11, 2, 157-171.
839 <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982009001300029>

840 Earl, E. R. et al. (2006) Evaluation of two GnRH-I based vaccine formulations on
841 the testes function of entire Suffolk cross ram lambs. Vaccine, 24, 3172–3183.
842 doi: 10.1016/j.vaccine.2006.01.041

- 843 Gogić, M. et al. (2019) Effect of immunocastration on sex glands of male
844 Mangulica (Swallow-bellied Mangalitsa) pigs. R. Bras. Zootec., 48.
845 <https://doi.org/10.1590/rbz4820180286>
- 846 Gómez, J. F. M., et al. (2017) Effects of immunocastration on the performance
847 and meat quality traits of feedlot-finished *Bos indicus* (Nellore) cattle. Animal
848 Production Science. <https://doi.org/10.1071/AN17102>
- 849 Ham X. et al. (2019) Mechanistic insight into the role of immunocastration on
850 eliminating skatole in boars. Theriogenology, 131, 32-40.
851 <https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2019.03.017>
- 852 Janett, F. et al. (2012) Vaccination against gonadotropin-releasing factor (GnRF)
853 with Bopriva significantly decreases testicular development, serum testosterone
854 levels and physical activity in pubertal bulls. Theriogenology, 78, 182-188.
855 <http://dx.doi.org/10.1016/j.theriogenology.2012.01.035>
- 856 Kaneko, J. J.; Harhey, I. W.; Bruss, M. L. (2008) Clinical biochemistry of domestic
857 animal. 6. ed., San Diego: Academic Press. 928p.
- 858 Luchiari Filho, A. (2000) Pecuária da carne bovina. 1 ed. São Paulo: A. Luchiari
859 Filho. 134 p.
- 860 Lugar, D. W. et al. (2017) Immunological castration temporarily reduces testis
861 size and function without long-term effects on libido and sperm quality in boars.
862 Animal, 11, 4, 643-649. <http://dx.doi.org/10.1017/S1751731116002081>
- 863
- 864 Machado, D. S. et al. (2018) Meta-analysis of the immunocastration technique
865 (anti-GnRH) for male bovines in the finishing phase. Pesquisa agropecuária
866 brasileira, 53, 961-969. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2018000800011>
- 867 Moraes, J. C. F. (1997) A avaliação andrológica do carneiro. Revista Brasileira
868 de Reprodução Animal. 21, p. 10-19.
- 869 National Research Council - NRC. (2007) Nutrient requirements of small
870 ruminants. Washington, D.C.: National Academic Press, 384.
- 871 Needham, T. et al (2019) Extending the interval between second vaccination and
872 slaughter: Effects on growth, scrotal size and stress responses of

873 immunocastrated ram lambs. *Animal*, 13:9, p 1952–1961. doi:
874 <http://dx.doi.org/10.1017/S1751731118003592>

875 Price, E. O., Adams, T. E., Huxsoll, C. C., Borgwardt, R. E. (2003) Aggressive
876 behavior is reduced in bulls actively immunized against gonadotropin-releasing
877 hormone. *Journal of Animal Science*, 81, 411-415.
878 <http://dx.doi.org/10.2527/2003.812411x>

879 Restle, J.; Alves Filho, D.C.; Neumann, M. (2000) Eficiência na terminação de
880 bovinos de corte. In: RESTLE, J. Eficiência na produção de bovinos de corte.
881 Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, p. 277-303.

882 Souza, M. I. L. et al. (2019) Manejo Reprodutivo. In: *Viva Ovinocultura*. 1. ed.
883 Campo Grande: Editora UFMS, p. 239-299.

884 Zanella, R. et al. (2009) Características testiculares de touros imunizados com
885 vacina anti-hormônio liberador do hormônio luteinizante. *Pesquisa Agropecuária*
886 *Brasileira*, 44, 10, 1359-1363. [https://dx.doi.org/10.1590/S0100-](https://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2009001000021)
887 [204X2009001000021](https://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2009001000021)

888

889 Considerações finais

890

891 Com os resultados deste estudo, podemos concluir que a suplementação
892 com ureia extrusada para terminação de cordeiros em pastagem é uma
893 alternativa eficiente para produzir animais com maior ganho de peso, maior peso
894 ao abate e melhores características de carcaça.

895 Além disso, a imunocastração em ovinos mostrou-se uma técnica eficaz
896 para a esterilização de cordeiros, que não gera prejuízos a saúde dos animais.
897 Porém é fundamental que mais estudos sejam realizados para a aperfeiçoar a
898 técnica para a espécie ovina, visto que neste estudo inicial foi empregado um
899 protocolo utilizado para a espécie bovina.